

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones Informe 1998

SECRETARÍA DE SALUD

Primera edición, 1998

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite la fuente

ISBN 968-811-632-7

Secretaría de Salud
<http://www.ssa.gob.mx>

Dirección General de Epidemiología
<http://www.epi.org.mx>
Francisco de P. Miranda núm. 177
Col. Unidad Lomas de Plateros
Del. Álvaro Obregón, C.P.01480
México, D.F.

SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Julio Frenk Mora

Secretario de Salud

Dr. Enrique Ruelas Barajas

Subsecretario de Innovación y Calidad

Dr. Roberto Tapia Conyer

Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud

Dr. Roberto Castañón Romo

Subsecretario de Relaciones Institucionales

Lic. Ma. Eugenia de León-May

Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Óscar Velázquez Monroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Pablo Kuri Morales

Director General de Epidemiología

COORDINACIÓN NACIONAL

Dr. Roberto Tapia Conyer
Dr. Pablo Kuri Morales
Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Blanca Estela Fernández García

ÁREA OPERATIVA Y SUPERVISIÓN

Lic. Maria De Lourdes Salazar Estrada
Dr. Juan Manuel Hernández Sánchez
Lic. Sara Eugenia Quiroz
Lic. Maricela Mendoza Morales
Dr. Armando Amezcua Jiménez
Lic. Ma. Del Carmen Reyes

ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMÁTICA

C. Mario Chávez Fuentes
Psic. Blanca Estela Jiménez Vargas
C. Gerardo Ávalos Téllez
C. Carlos Ortiz Mondragón
C. A. Rene Martínez Cázares
C. Hortencia Martínez Mancera

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

Dra. Patricia Cravioto Q.
Dra. Esperanza García Rodríguez
Lic. Fernando Galván Castillo
Dra. Blanca de la Rosa Montaña
Dr. Benjamín Acosta Cázares
Biol. Mario Cortés Ramírez

Instituciones Participantes

Secretaría de Salud
Centros de Integración Juvenil A.C.
Centros No Gubernamentales de Tratamiento en Drogas
Servicio Médico Forense
Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores
Fundación Casa Alianza México I.A.P.
Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas de la
Procuraduría General de la República
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal
Hospital General Balbuena
Hospital General "Rubén Leñero"
Hospital General de Xoco
Centro de Atención Toxicológico de Xochimilco
Centro de Atención Toxicológico de Venustiano Carranza

Entidades Participantes

Instituto de Salud de Aguascalientes
Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California
Servicios de Salud de Chihuahua
Secretaría de Salud de Durango
Secretaría de Salud de Guanajuato
Secretaría de Salud de Jalisco
Secretaría de Salud de Nuevo León
Servicios de Salud de San Luis Potosí
Secretaría de Salud de Sinaloa
Secretaría de Salud de Sonora
Secretaría de Salud de Tamaulipas
Secretaría de Salud de Yucatán

Coordinadores Locales del SISVEA

AGUA PRIETA, SONORA
Dr. Oscar Torres Fiel
Coordinador de la Unidad de Desintoxicación

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Dr. Gerardo Macías López
Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
T.S. Margarita Olivas Payán
Encargada del Programa de Adicciones

CULIACÁN, SINALOA
Psic. Evangelina Aguilar Soto
Responsable del Programa de Salud Mental

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Lic. Taurit Gastélum Santillán
Coordinador de Impacto Social del CAAD

DISTRITO FEDERAL
Biol. Mario Cortés Ramírez
Supervisor Operativo Nacional

DURANGO, DURANGO
Lic. Aída Escarzaga Ayala
Coordinador del SISVEA

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Dr. Rodolfo Raya Hernández
Responsable del Programa de Adicciones

GUADALAJARA, JALISCO
Dr. Javier Robles Arellano
Coordinador del SISVEA

LEÓN, GUANAJUATO
Lic. Lilia Ruth Moreno Macías
Responsable del Programa de Salud Mental

MATAMOROS, TAMAULIPAS
Lic. Laura Betancourt
Coordinadora del SISVEA

MÉRIDA, YUCATÁN
Dr. Juan Bautista Pacheco Catzin
Responsable del Programa de Salud Mental

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Dra. Dora Alicia Rodríguez Vizcaíno
Coordinadora del SISVEA

MONTERREY, NUEVO LEÓN
Dr. Juan José Roque Segovia
Responsable del Programa de Salud Mental

NOGALES, SONORA
Dr. Gregorio Moreno Contreras
Coordinador del SISVEA

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Psic. Guadalupe Caballero Gutiérrez
Coordinador del SISVEA

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO
Dr. Gabriel Landeros Ramírez
Coordinador del SISVEA

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
Dr. Marco Aurelio Gambá
Epidemiólogo Estatal

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Lic. Ma. Antonieta Olvera Nájera
Responsable del Programa de Salud Mental

CONTENIDO

Introducción

Estadísticas Nacionales

- Centros de Integración Juvenil
- Centros de tratamiento no gubernamentales
- Salud mental
- Alcohol
- Tabaco
- Urgencias
- Forense
- Delitos contra la salud
- Consejo Tutelar de Menores
- Consumo de drogas en oficiales del transporte
- Conclusiones

Estadísticas por ciudad

- Aguaprieta
- Aguascalientes
- Culiacán
- Chihuahua
- Distrito Federal
- Durango
- Ensenada
- Guadalajara
- Ciudad Juárez
- León
- Matamoros
- Mérida
- Mexicali
- Monterrey
- Nogales
- Nuevo Laredo
- San Francisco del Rincón
- San Luis Potosí
- Tijuana

INTRODUCCIÓN

La excesiva concentración poblacional en las grandes urbes origina problemas sociales como consecuencia del desempleo, marginación y el estrés ciudadano, factores que condicionan el uso y abuso de sustancias nocivas como el tabaco, alcohol y otras drogas psicoactivas. Estas prácticas predisponen una serie de daños tanto individuales como colectivos que afectan la salud mental y los entornos familiar y laboral, pues facilitan la incidencia de accidentes, lesiones, además de contribuir a la génesis y desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como cirrosis hepática, úlcera péptica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infarto del miocardio.

En México, como en otros países, los hallazgos crean la necesidad de disponer de un instrumento para medir la magnitud de esta problemática, así como la de un registro adecuado de prevalencia e incidencia del consumo de tabaco, alcohol y diversas drogas psicoactivas.

El problema del uso y abuso de drogas no ha podido ser abatido a pesar de los esfuerzos invertidos en dinero y trabajo en la lucha contra este fenómeno social. Uno de los métodos señalados más enfáticamente por instituciones responsables de la Salud Pública Nacional e Internacional para su estudio es la Vigilancia Epidemiológica (VE), definida como la recolección sistemática de información con análisis e interpretación en salud, y considerada como una herramienta esencial para planear, implementar y evaluar prácticas de salud pública. Así mismo, la difusión y utilización oportuna de los datos constituyen elementos básicos para la toma de decisiones.

Para poder profundizar en las características que presenta este problema de salud, se ha desarrollado e implementado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), instrumento que nos permite conocer las características sociodemográficas de los usuarios, su patrón de consumo, el tipo de drogas usadas con mayor frecuencia, enfermedades somáticas, psicológicas y psiquiátricas, así como los delitos cometidos y muertes relacionadas con el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.

En el ámbito mundial se han desarrollado diversos sistemas de reporte sobre consumidores de drogas, que proporcionan información mensual relativa al patrón y perfil de los usuarios atendidos en instituciones o agencias dedicadas al tratamiento. El objeto de estos sistemas es generar información disponible al público en general y para las instancias decisoras con respecto a las intervenciones en el abuso de drogas.

Todos estos sistemas se basan en el reporte de “eventos”, tales como el tratamiento de consumidores de drogas, el registro de muertes asociadas al consumo. Algunos cuantifican únicamente el número de hospitalizaciones, arrestos, casos de VIH/SIDA y de hepatitis B relacionados al consumo de drogas, aunque el número total de estos eventos excede el de los individuos en contacto con las instituciones que los reportan en un tiempo determinado, toda vez que el mismo individuo puede ser tratado más de una vez por el mismo problema y ser contactado por más de una agencia, con lo que puede ser cuantificado en diversos reportes de evento en un periodo específico; por consiguiente, los reportes de “EVENTO” reportan únicamente éstos, sin revelar el número de individuos involucrados.

Alternativamente existen los sistemas contruidos para unir diferentes eventos del mismo individuo; por ejemplo dos hospitalizaciones para una persona en una institución de reporte dada, representa únicamente *un caso*. Sin embargo, si el mismo individuo fuese reportado por dos instituciones de notificación se consideraría como *dos casos*. A los sistemas

capaces de sumar eventos del mismo individuo en la misma institución se les conoce como sistemas de Reporte de Caso; pueden describir tanto eventos como casos, en comparación con los sistemas de Reporte de Evento, que no pueden ir más allá de consignar eventos únicos. Así, los registros de caso tienen mayor flexibilidad y capacidad analítica.

Existe otro sistema que es el de Reporte Agregado o de Conjunto, que utiliza la información a partir de todas las fuentes de datos disponibles en una área, incluyendo hospitalizaciones, muertes, reportes de caso y de evento.

Actualmente el SISVEA opera mediante el sistema de Reporte de Evento, y en un futuro funcionará a través del de Reporte de Caso.

El objetivo del SISVEA es mantener un diagnóstico actualizado y periódico de los indicadores de salud relacionados directa o indirectamente con el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas psicoactivas, a fin de consolidar un sistema de vigilancia local, estatal y nacional que retroalimente los programas de planeación y prevención, así como el establecimiento de indicadores susceptibles de ser comparados y compartidos con sistemas de vigilancia internacionales. Se basa en la Norma Oficial Mexicana para las adicciones y en el programa de cómputo EPIADICCIONES.

El SISVEA es un sistema en constante evolución conformado por cinco indicadores que han cambiado desde la creación del sistema al adaptarse a las necesidades que demanda la sociedad actual:

1. Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas.
2. Enfermedades y lesiones de causa externa.
3. Mortalidad en individuos usuarios de drogas.
4. Delitos contra la salud.
5. Consumo de alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas analizadas en la población general y en grupos de riesgo.

El SISVEA se sustenta operativamente en tres niveles de responsabilidad: local, estatal y central. El nivel local cuenta con un coordinador dependiente de la SSA, quien tiene como función contactar cada una de las fuentes de información existentes en la comunidad, reproducir y distribuir las cédulas, para posteriormente recabarlas, codificarlas, capturarlas y analizarlas. Si este coordinador no cuenta con recursos de informática, envía dichas cédulas al nivel estatal de la SSA, donde la responsabilidad recae en el jefe de departamento de salud mental o en el responsable de salud mental en el estado, quien procesará la información a través del programa EPIADICCIONES, para retroalimentar a los coordinadores locales, instituciones participantes y los responsables de la prevención de la farmacodependencia. Envía asimismo una copia de la base de datos a la Coordinación Nacional del SISVEA, quien realiza los informes general y específico y da a conocer los resultados a las instituciones responsables de los programas nacionales de prevención y control.

El presente informe comprende un análisis descriptivo nacional de las fuentes primarias para mostrar sus particularidades y permite realizar comparaciones entre cada una de ellas. El análisis se realizó tomando como base la droga de mayor impacto, definida ésta como la que el paciente identifica con mayor capacidad para producirle efectos negativos (de salud, familiares, laborales, etc.) y que lo motiva a solicitar atención médica.

Es importante resaltar el papel del coordinador en el desarrollo operativo del sistema y su capacidad de analizar e interpretar la información recabada, así como la oportunidad en la notificación a los responsables de programas preventivos y las fuentes originales de información.

El SISVEA proporciona el diagnóstico acerca de adicciones que requieren las autoridades en salud, pues brinda asesoría respecto al consumo, morbilidad, mortalidad y delincuencia asociados al uso de drogas; sirve asimismo como plataforma para proyectos de investigación; contribuye a la capacitación de multiplicadores de programas preventivos y de control; retroalimenta a centros de tratamiento acerca de las tendencias en el consumo de drogas y permite la identificación de nuevas sustancias.

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL (CIJ)

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ), localizados en ciudades SISVEA, proveen información sobre el consumo de drogas de las personas que acuden a tratamiento. Al comparar los resultados anuales de 1994 a 1997 se hace evidente que los usuarios inician preferentemente con marihuana. No obstante, se observó un decremento de 5.9 puntos porcentuales en el periodo citado, lo que no significa que su uso haya disminuido, pues la cantidad de consumidores reportada es ascendente, sino que otras drogas están siendo más utilizadas. Al analizar los perfiles sociodemográficos de estos años, se observó que no hay variación en las características: continúa predominando en el sexo masculino (89%), en solteros (63%), y casi la mitad de los usuarios reportaron haber cursado hasta la secundaria (45%). La frecuencia de consumo diario se elevó durante 1997 hasta 45%, mientras que la edad de inicio se mantiene de 15 a 19 años. Con relación al tiempo que tardan los usuarios en acudir a tratamiento desde la primera vez que usaron alguna droga, dos terceras partes (68%) de los jóvenes asistieron dentro de los primeros 8 años. Por otra parte, el periodo que transcurrió entre el uso de la primera y la segunda droga fue de un año o menos para el 62.5%.

Durante 1998 se obtuvo información de 10,985 pacientes, principalmente del sexo masculino (89.2%), lo cual establece una razón hombre-mujer de 8:1. Al momento de solicitar tratamiento, el 32.4% de los usuarios tenían de 15 a 19 años y el 24.1% entre 20 y 24 años. En cuanto al nivel académico, poco menos de la mitad (49%) refirió tener estudios de secundaria; dos terceras partes eran solteros (66.5%), y el nivel socioeconómico medio-bajo fue el más reportado (52.9%). La mayoría inició su consumo de 15 a 19 (46.1%) y de 10 a 14 años (40.5%). Poco menos de la tercera parte utilizaron marihuana como primera droga (29.2%).

<i>Droga actual</i>	
Cocaína	40.4%
Marihuana	14.1
Inhalables	13.0
Alcohol	8.1
Otras	24.4

El análisis por droga de uso actual, de acuerdo con los CIJ, muestra que la más utilizada durante 1998 fue cocaína, que alcanzó el 40.4% de la población atendida (4,438 casos). De estos consumidores, el 92.6 % son varones con una razón hombre-mujer de 12:1. Los grupos de edad más reportados fueron de 20 a 24 (28.4%) y de 15 a 19 (26.2%) años, la mayoría alcanzó el nivel escolar de secundaria (48.4%) y manifestaron ser solteros más de la mitad (58.9%). De acuerdo a los hábitos de consumo, la frecuencia de uso diario (34.6%) fue la más utilizada, la edad de inicio se ubicó, de 15 a 19 años (50.2%) y poco menos de un tercio de los consumidores de cocaína reportó que inició el consumo de drogas con alcohol (31.1%) (*cuadros 1 y 2*).

El segundo sitio como droga de uso actual lo obtuvo la mariguana, con 14.1% (1,548 casos), prevalece en el sexo masculino (88.7%), con una razón hombre mujer de 8:1. La edad actual registrada al acudir a tratamiento fue de 15 a 24 años (62.2%), manifestando contar con secundaria el 47.9%, y más de dos terceras partes de la población consumidora estaba soltera (72.5%). El patrón de consumo se caracterizó por una frecuencia de uso diario (43.4%), la edad de inicio de 15 a 19 (49.1%) y de 10 a 14 (38.2%) años. Por lo que respecta a las drogas con la cual se inició el consumo, en el 29.9 % fue la misma mariguana, seguida por el alcohol (27.3%) (*cuadros 1 y 2*).

La tercera droga de mayor consumo entre esta población fue el grupo de inhalables, con 1,435 casos (13.0%). Los hombres alcanzaron el 85.4%, presentando una razón hombre-mujer de 6:1. El 45.3% de los sujetos tenía de 15 a 19 años cuando solicitaron tratamiento y más de la mitad con estudios de secundaria (57.6%); la mayoría eran solteros (84.5%) y presentaban consumo diario (29.9%), reconociendo que la mitad iniciaron el consumo de drogas cuando tenía entre 10 y 14 años (54.0%) y que en similar proporción la droga con la cual empezaron a usar sustancias adictivas fueron los inhalables (40.4%) (*cuadros 1 y 2*).

<i>Droga de inicio</i>	
Mariguana	29.2%
Alcohol	26.3
Inhalables	17.3
Cocaína	12.9
Otras	14.3

Entre los que iniciaron con mariguana (3,148 casos), el 85.4% pasó a una segunda droga; en ellos la cocaína (32.8%) fue la de preferencia, seguida por inhalables (21.5%) y el alcohol (19.9%). Quienes consumieron a una tercera droga (1,195) prefirieron continuar con cocaína (30.4%), siguiéndole los inhalables (14.8%) (*diagrama 1*). Dos terceras partes de la población que inició con mariguana, tardó en acudir a tratamiento entre 1 y 6 años (en el primer año lo hace sólo el 25.0%).

De acuerdo a la historia natural del consumo de alcohol, se observó que de aquellos que iniciaron con esta droga (2851) sólo el 4.8% se mantuvo como monousuario. El resto pasó a una segunda sustancia (2,714), siendo la mariguana la de mayor consumo (39.1%), seguida por la cocaína (26.4%). Entre los que pasaron a una tercera droga, lo hicieron principalmente con cocaína (36.7%), mariguana (28.6%) e inhalables (12.2%) (*diagrama 1*). Del total de pacientes que acudieron al CIJ, poco más de la mitad dejaron pasar de 1 a 6 años para decidirse a solicitar ayuda. Llama la atención que durante el primer año sólo lo hizo el 12.7%.

Cuando el consumo se inició con inhalables (1,874), una tercera parte (30.8%) permaneció monousuaria. Aquellos que pasaron a una segunda droga (1,295), lo hicieron

con marihuana (57.4%) y alcohol (17.5%). Los que reportaron consumo de una tercera droga (943 pacientes) prefirieron cocaína (33.8%), y marihuana (20.0%) (*diagrama 1*). De acuerdo con el tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, dos terceras partes (61.9%) lo hicieron durante los primeros dos años.

Con relación al consumo de cocaína como droga de inicio (1,413 casos), fue mayor el porcentaje que permaneció monousuario (56.9%); los que consumieron una segunda droga (609) mostraron preferencia por marihuana (40.6%), y sólo el 31.0% se inclinó por alcohol. Aquellos que reportaron una tercera droga utilizaron preferentemente alcohol (22.7%), siguiéndole la marihuana e inhalables con 21.1% y 13.4% respectivamente (*diagrama 1*). Para estos usuarios fue menor el tiempo transcurrido entre el inicio y el momento de solicitar atención, ya que en un año acudió la mitad (51.3%) de los pacientes adictos a esa droga.

CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONG)

Los Centros de Tratamiento no Gubernamentales (ONG), localizados en ciudades SISVEA, proveen información sobre el consumo de drogas de las personas que acuden a ellos. Al comparar los resultados anuales de 1994 a 1997 se hace evidente que la marihuana y el alcohol son las drogas de preferencia para iniciar el consumo. Al analizar los perfiles socio-demográficos de estos años, se observa que no ha habido variación en las características, predominando el sexo masculino (90.0%), los solteros (56.0%) y el nivel escolar de secundaria (44.0%); sin embargo, se encontró que la frecuencia de uso diario ha aumentado 9 puntos porcentuales durante el periodo, pasando de 49.0% en 1994 a 58.0% en 1997. La edad de inicio se ha mantenido entre los 10 y 19 años.

De acuerdo a estos centros, tuvo que transcurrir un lapso de uno a dieciséis años para que dos terceras partes (67.1%) del total de pacientes decidieran acudir a tratamiento. De los que pasaron a una segunda droga, el 66.1% lo hizo en el transcurso de cuatro años o menos. La droga de impacto -que es la sustancia que origina la consulta- se registró como tal hasta este año, predominando heroína (23.9%), cocaína (9.5%) y marihuana (8.5%).

Durante 1998 se obtuvo información de 5,878 pacientes; de los cuales 92.5% fue de sexo masculino, encontrándose una razón hombre-mujer de 12:1. Al momento de solicitar tratamiento, los usuarios tenían 35 o más y de 20 a 24 años el 24.2% y 21.6% respectivamente; poco menos de la mitad (42.4%) refirió tener estudios de secundaria; poco más de la mitad son solteros (53.8%) y acudieron a tratamiento por amigos o familiares (40.4%). La frecuencia de consumo actual más reportada fue diaria (72.0%); la mayoría inició su consumo entre 10 y 14 años (43.1%) y entre 15 y 19 años (38.9%) y utilizó marihuana (38.0%) y alcohol (26.4%) como primeras drogas de uso.

Al analizar la población de acuerdo al tipo de droga de impacto, la más utilizada durante este año fue la heroína, que representó el 33.0% (1940) del total. De esta población consumidora el 96.5% son hombres, con una razón hombre-mujer de 28:1 (*cuadros 3 y 4*).

La edad de los pacientes que acudieron a tratamiento se concentró en la población de 30 años en adelante (54.8%), con una escolaridad de secundaria (48.6%); manifestaron estar solteros (48.0%). La mitad acudieron a tratamiento por amigos o familiares (51.1%). Entre quienes la frecuencia de uso de drogas es diaria (98.4%), la edad de inicio de consumo fue

entre 15 y 19 años con 39.0%. Poco menos de la mitad de esta población reportó que inició su consumo de drogas con marihuana (54.3%) (*cuadros 3 y 4*).

La segunda droga de uso de impacto fue la cocaína (835), con el 13.8% de la población total, prevaleciendo en el sexo masculino (91.5%), con una razón hombre mujer de 11:1. La edad de estos pacientes cuando acudieron a tratamiento fue entre 20 y 24 y entre 15 y 19 años con 25.4% y 21.3% respectivamente. La mayoría presentó un nivel de enseñanza media (38.4%). Más de la mitad de la población consumidora es soltera (53.4%), acudió en forma voluntaria a los centros de tratamiento (49.3%) y su frecuencia de uso es diaria (75.3%). Iniciaron el consumo de drogas entre los 15 y 19 años el 32.0% y entre 20 y 24 el 23.7%. Las drogas con las cuales comenzaron el uso fueron alcohol (42.0%) y marihuana (23.8%) (*cuadros 3 y 4*).

La tercera droga de mayor consumo entre esta población fue la marihuana (382), que representa el 6.6%. Los hombres representaron la mayoría (92.1%), arrojando la razón hombre mujer 12:1 (*cuadros 3 y 4*). Poco más de un tercio de los sujetos se encontraba entre 15 y 19 años cuando solicitaron tratamiento (36.4%) y dos tercios de la población era solteros (68.2%). El 49.7% tenía estudios de secundaria. Los pacientes que acudieron a estos centros lo hicieron por amigos o familiares (39.5%). La mayoría refirió consumo diario (85.9%). Cuando iniciaron el consumo, la mayoría tenía entre 10 y 19 años (80.2%); asimismo mencionan que fue la misma droga con la que iniciaron su consumo (41.4%) (*cuadros 3 y 4*).

<i>Droga de inicio</i>	
Mariguana	38.0%
Alcohol	26.4
Inhalables	10.3
Cocaína	6.0
Otras	19.3

En relación al consumo de cocaína como droga de inicio (350), la mitad de la población permaneció monousuaria (50.0%). Los que consumieron una segunda droga (175), mostraron preferencia por marihuana (25.7%) y alcohol (17.7%). Aquellos que reportaron una tercera droga utilizaron preferentemente heroína (22.4%), siguiendo alcohol (20.0%) y marihuana (18.8%) (*diagrama 2*). Para estos usuarios fue menor el tiempo transcurrido entre el inicio en el consumo y la solicitud de atención: pasaron 7 años para que dos terceras partes (68.0%) de los pacientes adictos a esa droga se decidieran a solicitar ayuda a esta Institución. El 32.9% pasó a una segunda droga en un año o menos.

La mayoría de los que iniciaron con marihuana (2,217) pasó a una segunda droga (88.0%); de éstas, la heroína (19.4%) fue la de mayor preferencia, seguida por cocaína (17.3%) e inhalables (15.5%). Entre los que pasaron a una tercera droga (1,356) la heroína fue la de mayor consumo (32.6%), eligiendo como segunda opción la cocaína (20.7%) (*diagrama 2*). Las dos terceras partes del total de la población que acudió a tratamiento lo hizo entre 1 y 15 años de consumo, ya que en el primer año lo hace sólo el 5.6%. Las dos terceras partes de los que pasaron a la segunda droga, lo hicieron en su mayoría durante los cuatro primeros años.

De acuerdo a la historia natural del consumo de alcohol, de aquellos que iniciaron el consumo con esta droga (1,559) sólo el 21.3% se quedó como monousuario. El resto pasó a una segunda droga (1230), siendo la marihuana la de mayor consumo (45.0%), seguida de cocaína (20.3%). Entre los que pasaron a una tercera droga, lo hicieron principalmente con

cocaína (29.0%) y mariguana (21.6%) (*diagrama 2*). Del total de pacientes, dos terceras partes que acudieron a ONG, dejaron pasar de 1 a 19 años para decidirse a solicitar ayuda. Solo el 3.6% lo hizo durante el primer año. El 66.9% decidieron pasar a una segunda droga en el transcurso de siete años o menos.

Cuando el consumo se inició con inhalables (585), sólo el 13.4 permaneció monousuario. Aquellos que pasaron a una segunda droga (508), lo hicieron con mariguana (61.3%) y alcohol (14.7%). Los que reportaron tres o más drogas (427 pacientes) prefirieron cocaína (18.0%) seguida de mariguana (14.5%) (*diagrama 2*). De acuerdo con el tiempo transcurrido entre el inicio del consumo y la solicitud de tratamiento, la mayoría lo hizo dentro de los primeros doce años (69.1%). Más de dos terceras partes de la población (70.3%) se inclinaron por el consumo de una segunda droga en el lapso de tres años o menos.

SALUD MENTAL

Con la incorporación de la cédula-cuestionario para hospitales psiquiátricos desde 1995, se ha obtenido información que permite al SISVEA identificar el perfil de las personas que acuden a solicitar tratamiento psiquiátrico e investigar así la asociación entre el diagnóstico médico y el consumo de drogas, con el objeto de determinar la magnitud y modo de uso de cada una de las diferentes sustancias. Es importante mencionar que por medio de la cédula-cuestionario, además de obtener las características demográficas, se busca identificar si el consumo de droga es el motivo principal que origina la consulta o es causa adicional a otro trastorno.

A través de los años se ha observado variaciones tanto en el aumento del número de personas atendidas -de 722 en 1995 a 3,869 en 1998-, como en la distribución en el número de personas con padecimientos asociados al consumo de drogas y un incremento del número de hospitales psiquiátricos participantes.

De acuerdo con las características demográficas de la población observada en los cuatro años de vigilancia, se sabe que predominan los hombres, aunque las mujeres han tenido mayor participación año con año. La mayoría reconoció ser soltero ($\geq 46\%$) y contar con edad mayor a los 35 años. En cuanto a la educación formal, predominó la población con estudios de primaria incompleta, aparentemente sustituyéndose cada año por un mayor nivel educativo.

Es importante tener en cuenta que el tipo de trastorno que se reporta durante estos cuatro años fue diferente. En 1995 prevaleció el de tipo mental orgánico, con 290 pacientes, y 257 específicamente por sustancias. En 1996 el trastorno más frecuente fue el caracterológico con 715 pacientes, y en 1997 el trastorno psicótico superó a los demás padecimientos al presentarse en 1,339 pacientes, aunque en la categoría de trastorno mental orgánico se atendió únicamente a 990 pacientes por uso de sustancias. Finalmente, en 1998 el trastorno de mayor frecuencia fue el caracterológico con 2,404 pacientes y por uso de sustancias 1,131.

Antes del tratamiento psiquiátrico, las primeras drogas utilizadas en 1995 fueron alcohol (27.1%) e inhalables (17.9%); en 1996, mariguana (39.1%) y alcohol (30.5%); para 1997, alcohol (33.5%) y mariguana (24.8%) y en 1998 alcohol (23.3%) y mariguana (16.1%). Entre los que estaban en tratamiento en el mismo periodo, se observó el uso de drogas

médicas (barbitúricos, anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos) en más de la mitad de los casos. Una vez concluido el tratamiento se observó que la droga preferida de 1995 a 1997 fue el alcohol, y para 1998 la mayoría consumió Drogas Médicas (17.9).

Durante el año de 1998, la información de Salud Mental se obtuvo de ocho ciudades SISVEA a través de la aplicación de cédulas-cuestionario a la población registrada en hospitales psiquiátricos. En este año se reportaron 3,869 personas; de ellas, dos terceras partes fueron llevadas al servicio médico por amigos y familiares (68.5%), la mitad de la población ya había sido hospitalizada (57.3%); y de estos, el 74.9% había tenido de 1 a 5 ingresos. Como en años anteriores, la mayoría de los pacientes fueron hombres (70.5%), estableciéndose una razón hombre mujer de 3:1; casi la mitad eran solteros (45.8%) y más de la tercera parte de 40 años y más de edad (36.8%). La escolaridad más reportada fue primaria incompleta (24.4%). Los principales diagnósticos registrados fueron los trastornos caracterológico (2,404) y el psicótico (1,846) (*cuadro 5*).

La droga de inicio antes del tratamiento psiquiátrico entre la población total fue el alcohol (23.3%) y también por tipo de trastorno diagnosticado. La droga más utilizada durante el tratamiento fueron las drogas médicas (17.5%) de manera global y por diagnóstico específico; al concluir el tratamiento, la droga de consumo actual fue de forma global el rubro de drogas médicas (17.9%). Por padecimiento, se observó que además de drogas médicas también se utilizaron las drogas ilícitas (alucinógenos, *bazucos*, otros psicotrópicos) (*cuadro 6*).

Es posible, gracias al SISVEA, conocer el perfil de los pacientes que acudieron a hospitales psiquiátricos por consumo de drogas y diagnóstico mental específico. La mayoría de las personas diagnosticadas resultaron con trastorno por uso de sustancias (1,131). En 1998 predominó el sexo masculino en todas las patologías con porcentaje mayor de 66.7%; la mayoría tenían 40 y más años de edad, con porcentajes superiores a 28.6%. En cuanto al nivel de estudios tenemos que la población que concluyó la primaria tenía diagnósticos como depresivo (21.7%) y depresión mayor (18.8%). Sólo las personas con retardo mental no estudiaron (38.5%) y aquellas diagnosticadas como limítrofes (24.3%) cursaron la secundaria pero no la concluyeron (*cuadro 7*).

Del total de pacientes que acudieron, el 22.2% habían sido hospitalizados; y la droga preferida fue el alcohol y marihuana; observando un aumento de ésta con respecto a los años anteriores en trastornos como depresión mayor (36.4%), bipolar (21.4%), orgánico (33.6%), limítrofe (61.3%), retardo mental (53.8%) y traumático (25.0%) (*cuadro 7*).

ALCOHOL

La información obtenida de Grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) desde 1994 ha mostrado año con año pequeños cambios en su comportamiento: Más del 90.0% pertenece al sexo masculino; en 1994 y 1995 se reportaron edades de más de 40 años, en tanto que en 1997 y 1998 el grupo de edad más frecuente de la población fue de 35 a 39 años (71.7%). Referente a la escolaridad, predomina en todos los años la primaria incompleta (>25.0%); el estado civil preponderante en los años de 1994 y 1995 fue el de soltero (41.4% y 39.3% respectivamente), mientras que en 1997 y 1998 el grupo mayoritario fue el de casados (52.1% y 61.2%, respectivamente). El 65% acudió a consulta por amigos o familiares.

Respecto al patrón de consumo, en 1994 y 1995 la edad de inicio por uso de alcohol era de antes de los 14 años, a diferencia de los siguientes periodos, en que iniciaron entre los 15 y 19 años. Con respecto al tipo de bebida, se observa una similitud de consumo de destilados en todos los años (>32.0%). En 1994 y 1995 el consumo era diario (>32.0%) y en 1998 es de 1 a 3 veces por semana (35.6%). En cuanto a la cantidad de copas consumidas, en 1995 fue de 6 a 10 copas y en 1998 se toman de 16 o más copas por ocasión (51.7%). De aquellos individuos que manifestaron experiencias con otras drogas se registraron el 43.8% en 1994 y en 1998 disminuyó al 13.2%, siendo la cocaína la droga que combinan con más frecuencia (2.3%).

De acuerdo con lo reportado por los individuos que consumen alcohol en forma habitual hay algunas variaciones que se observan año con año, en cuanto a los aspectos individuales por el uso de esta sustancia. Los predominantes de 1994 a 1998 han sido beber una copa a la mañana siguiente de la borrachera para “curarse la cruda”, despertar sudoroso o con temblores por falta de alcohol y el consumo de las bebidas alcohólicas interfirió con las actividades familiares.

Durante 1998 se obtuvo información de 702 pacientes que acudieron a Grupos de AA; de los cuales el 95.1% son de sexo masculino, de 35 a 39 años (71.7%), y poco más de la cuarta parte (28.0%) cuenta con escolaridad de primaria incompleta; más de la mitad menciona ser casado (61.2%), el 80.9% acude al Grupo llevado por amigos o familiares. Con respecto al patrón de consumo, el 47.0% inició el consumo entre los 15 y 19 años de edad, siendo los destilados la bebida de mayor preferencia (56.8%), con un consumo de 1 a 3 veces por semana (35.6%), de 16 o más copas (51.7%). El 13.2% mencionó tener experiencia con otras drogas, siendo la cocaína (2.3%) la droga que más combinan, seguida de marihuana 2.0% (*cuadro 8*).

Las características que se mencionan con más frecuencia en los individuos que consumen alcohol habitualmente, han variado año con año y se observa que en 1998 el 92.2% bebe una copa a la mañana siguiente para “curarse la cruda”, el 87.7% tiene problemas para dejar de beber a pesar de habérselo propuesto; el 86.5% se ha despertado sudoroso o tembloroso por falta de alcohol. También están los que han tenido temblores al dejar de tomar (81.3%) y los que el consumo de alcohol ha interferido en sus actividades familiares 80.3% (*cuadro 9*).

TABACO

La información obtenida de las clínicas de tabaco a través de los años no ha presentado variación significativa. Predomina el sexo femenino, con edad de 40 y más años, casados, y con escolaridad a nivel licenciatura. Esto no significa que sean más mujeres las que consumen tabaco, sino que son las que acuden con más frecuencia a estas clínicas con la finalidad de dejar de fumar, a diferencia de los hombres que son quienes se muestran más renuentes a dejar la adicción.

Durante 1998, se obtuvo información sobre el consumo de tabaco de 524 pacientes que acudieron a clínicas de tabaquismo, en la que predomina el sexo femenino (54.8%); el grupo de edad mayoritario entre hombres y mujeres es de 40 años y más (61.5%), y el 63.7% son casados. Respecto a la escolaridad, el 35.2% cursó licenciatura o posgrado,

acudiendo en forma voluntaria a tratamiento (86.9%). Al investigar si habían probado algún tipo de droga diferente al tabaco se encontró que el 32.5% lo había hecho, siendo el alcohol (13.8%) el más frecuente (*cuadro 10*).

Para 1998, en el patrón de consumo de fumadores se observa la edad de inicio entre 15 y 19 años (43.8%); la edad en la cual consumen 5 ó más cigarros es la misma en 45.5%; la frecuencia de uso mayor fue diaria (96.1%), y es más de la mitad quienes fuman 16 o más cigarrillos por día (58.3%). Al indagar el tipo de cigarrillo que usan se encontró una preferencia por los cigarrillos con filtro (92.5%) y siempre se tiene el hábito de *darle el golpe* (83.6%) (*cuadro 11*).

Finalmente en los criterios de dependencia en los fumadores se observó que casi una tercera parte manifestó no tener dificultad de abstenerse de fumar en lugares prohibidos (32.4%); el 39.0% empieza a hacerlo dentro de los primeros cinco minutos al despertar; el 41.0% mencionó fumar más por las mañanas; el 50.8% sigue fumando a pesar de estar enfermo. Al preguntar cuál es el cigarro más difícil de dejar, el 36.2% mencionó el primero de la mañana. La mayoría de los pacientes ha intentado dejar de fumar (78.8%) (*cuadro 12*).

URGENCIAS

Los Servicios de Urgencias nos brindan la oportunidad de conocer la asociación entre el uso de drogas y la morbilidad, debido a que estas áreas constituyen la fuente primaria de tratamientos a padecimientos y lesiones que requieren atención médica de emergencia.

Durante el periodo de 1994 a 1998 se ha establecido el perfil de la población que acude a las unidades de urgencias médicas estando bajo los efectos de alguna droga o los que las consumen de manera habitual. Se ha podido observar que en estos años de vigilancia han predominado las personas del género masculino (>65.0%) que llegan tanto por influjo como los de uso habitual. En el caso de influjo de sustancia predominan los solteros, de 15 a 24 años de edad, y las personas de consumo habitual son principalmente casados con edades de 40 o más. La escolaridad se ha mantenido constante durante todos estos años, y es la primaria incompleta la que ha predominado tanto en pacientes bajo influjo (>30%) como en usuarios habituales (>20%).

De 1994 a 1998, en los individuos que llegaron bajo el influjo de alguna sustancia a solicitar tratamiento, predominó el padecimiento de psicosis por alcohol y drogas (>17%). El patrón de distribución fue variable para cada año, siendo las drogas más frecuentes alcohol, inhalables y cocaína.

Las lesiones registradas por tipo de droga consumida, en 1994 y 1995 fueron caídas, golpes y lesiones con arma punzocortante; en 1996 y 1997, envenenamientos, golpes y lesiones con arma punzocortante y en 1998 fueron las heridas con arma blanca, golpes y envenenados, en las que el alcohol, marihuana e inhalables juegan un papel importante en su desencadenamiento (*gráfica 1*).

El SISVEA, con la participación de doce ciudades, logró estudiar 3,932 individuos que asistieron a dichos servicios durante 1998, de los cuales 562 (14.3%) llegan bajo influencia de una droga y 1,810 (46.0%) consumen habitualmente alguna sustancia adictiva.

De aquellos individuos que ingresan bajo el influjo de drogas, el 85.7% corresponden al género masculino, solteros (55.6%) con edades de entre 20 y 24 años (22.3 %) y con escolaridad de primaria incompleta (35.9 %). La mayoría ingresa consciente (94.4 %), siendo la primera vez que acuden al servicio (70.9%). Más de la mitad de los pacientes son dados de alta (58.7%) (*cuadro 13*).

En los individuos que consumen habitualmente una sustancia, predominan los del sexo masculino (73.4%) con escolaridad de primaria incompleta (24.5%). Se observa en el 26.6% de estos consumidores edades de 40 años y más y que generalmente están casados (45.4%). Asimismo predominan los ingresos en estado de consciencia (96.4 %), de primera vez (77.6 %) y que son dados de alta por mejoría (63.4%) (*cuadro 13*).

Fueron 191 pacientes los que acudieron al servicio por una patología al influjo de una sustancia. La mayoría se presentó por psicosis por alcohol y drogas (77), asociado principalmente al consumo de alcohol y mariguana. Las siguientes enfermedades de mayor frecuencia fueron cirrosis y gastritis, a las que el alcohol (16.4%) estuvo generalmente relacionado, y por último urgencias quirúrgicas, atención que demandaron principalmente los usuarios de mariguana e inhalables (*cuadro 14*).

Fueron 335 los pacientes que solicitaron atención debido a lesiones padecidas bajo el influjo de una sustancia. El 34.4% y 23.3% se presentan por heridas de arma blanca asociado a mariguana e inhalables, respectivamente; el 33.6% y 30.8% presentaron golpes asociados al consumo de alcohol y cocaína. Es interesante notar que la mayoría de los pacientes que usaron mariguana (28.1%) e inhalables (27.9%) resultaron con golpes (*gráfica 1*).

FORENSE

La mortalidad asociada al uso de drogas durante el periodo 1994-1998 ha mostrado un incremento de siete puntos porcentuales debido principalmente al consumo de alcohol, que fue la sustancia reportada con mayor frecuencia en los cinco años (>85.0%).

Durante este periodo, entre la población que falleció bajo el efecto de alguna sustancia, el 91.5% era del sexo masculino, con una relación hombre-mujer de 10:1, observándose a través de los años mayor participación de las mujeres en el consumo de sustancias adictivas, ya que en 1994 la relación fue 12:1. El grupo de edad donde se observó el porcentaje más alto de personas que fallecieron fue de 40 y más años (44.7%).

En lo concerniente al tipo de muerte, en primer lugar se han mantenido los accidentes automovilísticos (atropellados y choque de vehículo), encontrándose por arriba del 40% (1994, 43.1%; 1998, 43.8%). Los homicidios ocuparon el segundo lugar, siendo el arma de fuego la más utilizada. Sin embargo, se observa una disminución en la proporción de homicidios a través de los años, pues en 1998 el porcentaje fue de 20.0%, mientras que en 1994 había sido de 37.0%.

Durante 1998, en 12 ciudades SISVEA se reportaron 6,377 casos de muertes, de los cuales 1,211 se encontraban bajo el influjo de alguna droga (19.0%).

De los individuos que fallecieron bajo el efecto de alguna droga, el 91.5% eran del sexo masculino, la puntuación más alta fue alcanzada por los mayores de 40 años con 44.7%. Los grupos de edad de 20 a 24 y de 25 a 29 años presentaron una puntuación homogénea, 14.1% y 14.4% respectivamente. En cuanto a la causa de muerte, las que presentaron

mayores porcentajes fue por arma de fuego con 15.1% y atropellados con 13.4%, siendo el hogar (33.6%) y la vía pública (32.9%) el lugar donde ocurren con mayor frecuencia (*cuadro 15*).

Respecto a las muertes relacionadas al consumo de drogas, los accidentes (505) ocuparon el primer lugar; de estos, el 91.6% fueron del sexo masculino, la edad de los fallecidos fue de 40 o más años (43.3%); atropellados (28.8%) y por choque de vehículo (28.0%) fueron las causas de muerte que presentaron mayor proporción, siendo la vía pública (40.8%) y las áreas de tránsito (30.6%) los lugares en donde ocurrió el deceso (*cuadro 15*).

En segundo lugar encontramos los homicidios (230), de los cuales el 92.4% eran del sexo masculino, los grupos de edad con mayor registro fueron de 40 años o más (28.0%) y de 20 a 24 años (24.0%), la causa origen principal fue por arma de fuego (47.1%) y arma punzo cortante (18.9%), siendo la vía pública el lugar con mayor porcentaje (56.3%) (*cuadro 15*).

En cuanto a los suicidios (151), el 92.0% fueron del sexo masculino de 40 años o más (26.9%), las causas principales fueron por arma de fuego con (43.0%) y por asfixia con 26.5%, es de resaltar que el 80.0% de las muertes ocurrió en el hogar (*cuadro 15*).

La sustancia reportada con mayor frecuencia como asociada con las muertes fue el alcohol (1,076), el 91.8% fueron hombres entre 40 y más años (45.6%); arma de fuego (14.9%) y atropellados (14.2%) fueron las principales causas, siendo la vía pública (34.3%) y el hogar (33.1%) los lugares donde ocurrieron la mayor parte de los eventos (*cuadro 16*).

La marihuana (54) fue la segunda droga asociada. El 90.7% resultaron hombres de más de 40 años (26.9%), el arma de fuego (32.1%) fue la causa de muerte principal que ocurrió en el hogar (38.8%) (*cuadro 16*).

La tercera droga reportada fueron los opioides (9), todos de sexo masculino, y con edad de más de 40 años (33.4%); las causas de muerte reportadas fueron intoxicación (50.0%) y arma de fuego (25.0%), siendo la vía pública (37.5%) el sitio de ocurrencia (*cuadro 16*).

DELITOS CONTRA LA SALUD

La información nacional sobre delitos contra la salud es proporcionada al SISVEA por el Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas, de la Procuraduría General de la República, a través de informes mensuales que proporciona desde 1991. Con esta información complementamos el diagnóstico de adicciones al conocer las cantidades incautadas a nivel Nacional y Estatal por tipo de droga.

En estos últimos años la droga de mayor decomiso ha sido la marihuana, mostrando un incremento en cantidad. En los últimos dos años se han superado las 1,000 toneladas. Los estados de los cuales se han obtenido las mayores cantidades de esta droga son Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California (*cuadro 17*).

La segunda droga en volumen decomisado fue la cocaína, observándose similares montos de 1994 a 1996 y una franca disminución para 1997, año en el cual se recogieron 16,530 kg. En 1998 el decomiso de esta droga fue de 22,597 kg. Los estados de la República que destacan por las cantidades decomisadas en su territorio son Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y el Distrito Federal (*cuadro 17*).

Respecto a los opiáceos se observa un ligero incremento en la cantidad de heroína y goma de opio decomisados, así como en la erradicación de plantíos de amapola a nivel

Nacional, destacando las incautaciones en entidades federativas como el Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa y Baja California (*cuadro 17*).

De este modo, las acciones de aseguramiento y erradicación permitieron que no llegaran al mercado de consumo, para este año, 673,493,255 dosis de marihuana; 45,195,253 dosis de cocaína y 140,709,553 dosis de opiáceos (*cuadros 18a y 18b*).

CONSEJO TUTELAR DE MENORES

A partir de 1994 se incorporó al SISVEA el estudio de la delincuencia juvenil asociada a las drogas, que permite conocer a los usuarios de drogas remitidos al Consejo Tutelar de Menores (CTM). Su perfil específico se caracteriza por tener entre 15 y 18 años de edad al ingresar a los consejos, un nivel escolar predominante de primaria (>30%), ninguna ocupación en 1994 y de 1995 a 1998 se mantiene el subempleo como la actividad más desempeñada y en un nivel socioeconómico bajo.

El sentido de pertenencia e integración a grupos sociales se manifiesta en estos jóvenes mediante la pertenencia a bandas y el poseer tatuajes corporales, tratando de equilibrar la desintegración familiar en la que se desarrollan y en ocasiones la disfunción interna de los miembros. Con respecto a la personalidad se ha notado que predominan los extrovertidos, dependientes y sociables.

Los individuos que ingresan a los consejos se han caracterizado por cometer delitos en la vía pública, hacer uso habitual de drogas, ser poliusuarios y haber utilizado una arma (>13%), ya sea de fuego o punzo cortante (>15%). Los delitos más frecuentes, de acuerdo al orden de importancia, son el robo, que han realizado estando bajo los efectos de una droga en >20%, los delitos contra la salud y el consumo de drogas.

Las drogas de preferencia de estos jóvenes han registrado cambios año con año: En 1994 fueron tabaco, alcohol y marihuana; en 1995 y 1996 fueron la marihuana, inhalables y alcohol y en 1997 y 1998 fueron marihuana, inhalables y cocaína, observándose un desplazamiento del alcohol y tabaco por la cocaína en estos dos últimos años. La edad de inicio más frecuente se ubica de 10 a 14 años de edad.

En 1998, la información de los CTM se obtuvo de 12 ciudades SISVEA a través de entrevista directa a jóvenes infractores que ingresan a estos centros, con el propósito de conocer el patrón de consumo de diferentes drogas y la asociación con el delito realizado por esta población. Durante este año se reportan 6,228 casos, cifra menor que en 1995 (7,686).

Sobresale, como en años anteriores, la ciudad de Guadalajara con el mayor número de casos reportados por estos centros (48.8%) y el Distrito Federal (19.1%).

Esta población se caracteriza por pertenecer en su mayoría al sexo masculino (91.7%), y muestra una relación hombre-mujer de 11:1. Setenta y cuatro de cada cien jóvenes infractores tienen una edad de 15 a 18 años y cuentan con grado máximo de estudios de primaria incompleta (31.5%). Como en años anteriores, la tercera parte de ellos desempeñan actividades de subempleo (31.4%),

Del total de jóvenes registrados, el 30.4% presentaron tatuajes en alguna parte del cuerpo; al investigar sobre la pertenencia a bandas, sólo el 13.0% respondió positivamente.

En cuanto al estatus socioeconómico, la mayoría pertenecen a un nivel bajo (71.8%); la conformación familiar se observó de tipo nuclear en más de la mitad (51.6%), pero disfuncional en el 72.2% de los casos. En lo referente a la personalidad, destacan como principales características el ser extrovertido (66.3%), sociable (65.5%), dependiente (56.9%) y pasivo (54.7%). Así mismo, una tercera parte se identificaron con rasgos de ansiedad (34.6%).

Por lo que respecta a la frecuencia del consumo, el 47.6% hace uso diario de alguna droga y más de tres quintas partes de la población (64.0%) refieren haberlo iniciado entre los 10 y 14 años.

Analizando las infracciones cometidas por estos jóvenes, se encontró que para el 68.0% fue su primer ingreso; de éstos, el 14.3% reporta haber usado una arma para cometer el delito, en el 48.4% de los casos de tipo punzo cortante. El 22.3% delinquirió bajo los efectos de alguna sustancia, entre los que predomina el robo (53.2%), los delitos contra la salud (11.7%) y portar arma (5.3%).

Mariguana

La droga que durante los tres últimos años se ha mantenido en la preferencia de los jóvenes infractores es la mariguana, registrándose para este año 2,189 casos (35.1%); de los cuales el 95.5% pertenecen al género masculino; el grado máximo de estudios es primaria incompleta (39.2%) y la actividad económica reportada por ellos es el subempleo (36.5%). Refieren pertenecer a una familia extensa (53.3%), de tipo disfuncional en más de la mitad de los casos (87.3%). El tipo de personalidad predominante fue extrovertido (71.2%), dependiente (56.5%) y agresivo (55.0%).

Cerca de la mitad presenta tatuajes en alguna parte del cuerpo (48.1%) y sólo el 22.2% es miembro de una banda. En esta población prevalece el consumo diario desde 1994 a la fecha (50.5%). La edad en que iniciaron el consumo va de 10 a 14 años (64.5%); para un poco más de la mitad es su primer ingreso (52.2%). Se observa que efectúan la infracción con armas en el 15.4%; de éstas, las punzo cortantes representaron el 63.3%. El delito bajo el efecto de alguna sustancia se lleva a cabo por el 36.0%. Las transgresiones cometidas con más frecuencia son el robo (50.3%) y los delitos contra la salud (21.9%) (*cuadro 19*).

Inhalables

El uso de los inhalables por estos jóvenes durante el año de 1994 ocupaba el cuarto lugar de preferencia, pero desde 1995 se mantiene en el segundo sitio. Para este año se registraron 1,423 casos (22.8%), en su mayoría de varones (93.3%), con grado máximo de estudios de primaria incompleta (47.9%), que refieren tener actividad económica de subempleo (37.5%). Proviene de una familia extensa en más de la mitad de los casos (57.2%), de tipo disfuncional (90.1%). Con respecto a la personalidad, se observó extrovertido (74.4%), agresivo (54.0%) y antisocial (53.4%).

Casi la mitad de los usuarios de inhalables refiere tener tatuajes en el cuerpo (48.5%) y el 26.8% pertenecer a una banda. El consumo de estas sustancias es diario (34.1%); la edad de

inicio reportada es de 10 a 14 años (72.1%). Con relación al número de ingresos, para el 51.5% se trató del primero de ellos. La sexta parte de estos jóvenes reconoció haber hecho uso de alguna arma cuando cometió el delito (14.1%), de tipo punzo cortante en el 68.5%. El 47.2 cometió el delito bajo el influjo de alguna sustancia, siendo los delitos más frecuentes el robo (51.8%) y delitos contra la salud (15.2%) (cuadro 19).

Cocaína

Para este año los usuarios de cocaína se han incrementado. Mientras que para 1994 se reportó un 9.4% de la población detenida, ahora se reportó el 16.9% (1,054 casos). En su mayoría pertenecen al género masculino (93.4%), el grado escolar promedio es primaria incompleta (33.4%), provienen de una familia nuclear (50.2%), aunque disfuncional (84.8%). El tipo de personalidad que destacó fue el extrovertido (75.2%), dependiente (52.8%) y el antisocial (51.5%).

La actividad económica desempeñada por esta población es empleado (38.3%). Casi la mitad de los usuarios reporta tener tatuajes (44.8%) y sólo el 18.1% pertenece a una banda. Con relación a la frecuencia del consumo de cocaína, la mayoría la usa de 1 a 3 veces al mes (41.7%) y la edad de inicio se encuentra entre los 10 a 14 años de edad (51.3%). Para más de la mitad fue su primer ingreso a los CTM (56.9%). El 17.6% de los jóvenes usó un arma, en su mayoría punzocortante (67.3%). El 34.0% se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia al cometer el ilícito. Los delitos reportados con mayor frecuencia son el robo (52.5 %) y los delitos contra la salud (19.6%) (cuadro 19).

Alcohol

En 1994 los usuarios de alcohol representaban el 47.6% , el segundo lugar, y para 1998 se ubicaron en el quinto lugar, con 242 casos que representa el 3.9%. Corresponden al género masculino (93.4%), con un grado máximo de estudios de secundaria incompleta (30.7%) y la actividad económica es el subempleo (39.9%). El tipo de familia es nuclear en un 57.9%, pero disfuncional (60.2%). El tipo de personalidad que predominó fue sociable (77.0%), dependiente (72.0%) y agresivo (66.7%).

En el momento de ser detenidos, una tercera parte de los infractores presentó tatuajes en alguna parte del cuerpo (31.5%) y el 11.9% manifestó pertenencia a alguna banda. El consumo de alcohol manifestado es de 1 a 3 veces al mes (40.1%), la edad referida como inicio en el consumo es de 10 a 14 años (51.9%). Para más del 64.6% fue su primer ingreso y sólo el 18.2 % hace uso de alguna arma para amedrentar a la víctima (arma de fuego en el 40.5% de los casos), el 38.0% realiza el delito bajo los efectos de alguna sustancia y como delitos más frecuentes destacan el robo (51.2%) y daños (8.7%) (cuadro 19).

Tabaco

Finalmente, en 1998 la droga que reporta el cuarto lugar de preferencia es el tabaco, con 302 casos, que representan el 4.8%. De esta población, nueve de cada diez pertenecen al sexo masculino (90.0%), el grado escolar obtenido con mayor frecuencia es de primaria incompleta (29.7%), con actividades de subempleo (42.3%). La conformación familiar es nuclear (61.0%) pero disfuncional en más de la mitad de los casos (69.5%). Destacan la

personalidades de sociable (79.2%) agresivo (60.4%) y el introvertido (53.1%). La frecuencia de consumo reportada es diaria en 74.8% de los casos registrados.

Al momento del delito sólo una tercera parte presenta tatuajes en el cuerpo (32.6%) y el 13.5% es miembro de alguna banda; iniciaron el consumo entre los 10 y 14 años de edad (62.2%). Poco menos de una quinta parte utilizó algún tipo de arma para cometer el delito (15.6%); la mayoría, de fuego (40.5%). Sólo el 26.1% de esta población llevó a cabo el ilícito bajo los efectos de alguna sustancia y los cometidos con mayor frecuencia son el robo (56.6%) y portación de arma (7.3%) (*cuadro 19*).

Heroína

A partir de este año se reporta la heroína, pues se ha observado un incremento en su consumo entre los jóvenes infractores. Para 1998 se registraron 52 casos: el 88.2% pertenece al género masculino, el grado escolar promedio es de primaria incompleta (33.3%) y el 53.1% proviene de familia extensa y disfuncional (73.5%).

Por otro lado, el tipo de personalidad que sobresalió fue dependiente con 85.4%, introvertido 72.9% y agresivo 63.4%. La actividad económica que desempeñan estos jóvenes es el subempleo (42.0%), más de la mitad reportó tener tatuajes en alguna parte del cuerpo (62.2%) y sólo el 21.2% pertenece a alguna banda.

En cuanto a la frecuencia de consumo de heroína, el 55.8% reportó uso diario y el 73.1% la edad de inicio entre 15 y 18 años.

El 58.8% de estos jóvenes ha tenido de 2 a 4 ingresos en el Consejo Tutelar; el 24.0% usó arma para amenazar a su víctima, en su mayoría punzocortante (63.6%); más de la mitad (59.6%) se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia al cometer el ilícito, y el delito reportado con mayor frecuencia es el robo (65.4%) (*cuadro 19*).

Niños y jóvenes de la calle

En nuestro país, el crecimiento demográfico y otros factores de índole socioeconómica han generado un fenómeno de urbanización acelerado, la migración de la población de áreas rurales a urbanas se ha incrementado en los últimos años y han derivado en que la familia como sistema se vea afectada por esta situación, conduciéndola a una dinámica no funcional compleja, limitando el desarrollo físico, mental y afectivo del grupo familiar.

La pobreza y la pérdida de valores morales y culturales dentro de la familia han conducido al maltrato infantil, lo que ha obligado a muchos niños y jóvenes a abandonar la escuela y a vivir en la calle. Este contexto social constituye terreno

fértil para que el niño de la calle se convierta en usuario de drogas, lo cual genera problemas de salud tanto físicos como mentales, así como accidentes y violencia, además de favorecer actos delictivos como el robo o involucrarse en prostitución.

Es importante diferenciar a los niños que están en la calle en dos grupos: niños *de* la calle y niños *en* la calle. Dentro del primer grupo se encuentran aquellos que no tienen hogar ni relación familiar. El segundo está formado por los niños que, aún contando con un hogar o familia, deciden salir a la calle por razones diversas, pero mantienen el contacto con la familia.

El SISVEA, como sistema de vigilancia epidemiológica de adicciones, ha incorporado a partir del segundo semestre de 1998 un cuestionario para conocer el consumo de drogas en niños *de* la calle y *en* la calle en la Ciudad de México, que incluye datos sociales, demográficos y relativos al consumo de drogas, con el fin de identificar el perfil de este grupo vulnerable, y proporcionar información a los responsables de centros de tratamiento y programas preventivos.

Para efectuar un estudio de factibilidad se realizaron 431 entrevistas, encontrándose que el 80.2% pertenecen al sexo masculino y el 19.8% al sexo femenino. La distribución por grupo de edad fue la siguiente: de 10 a 14 años, el 42.2%; de 15 a 18 años, el 49.1% y de 19 años y más, el 7.8%. Del total de niños y jóvenes entrevistados, el 46.7% cuenta con primaria incompleta, el 16.9% sí la completó, el 16.4% alcanzó el nivel de secundaria incompleta y sólo el 5.8% terminó el ciclo medio. Destaca el hecho de que el 13.3% no cuenta con escolaridad alguna.

De la población estudiada, el 95.4% declaró ser soltera y ante la pregunta de si tienen hijos, el 9.3% contestó afirmativamente. En cuanto a su situación laboral se encontró que el 64.0% pide dinero como actividad principal, siguiendo el rubro de servicios (limpia parabrisas, limpia coches o payasos), y con 25.3% el comercio con 17.9% (venta de dulces, flores, billetes de lotería o fruta de temporada).

Su lugar de trabajo se encuentra preponderantemente en lugares públicos abiertos, con el 69.6% (calle, terminales de autobuses, metro, mercados). En relación a su origen sólo el 10.6% reportó ser indígena.

Los niños *en* la calle -los que tienen algún contacto con su familia- representan el 40.6% del total de entrevistados y el 59.4% que no guardan ningún vínculo familiar pertenecen al otro grupo.

Las principales razones para salir de su hogar y vivir en la calle fueron: maltrato físico, 53.8%; el 22.7%, por la necesidad de sentirse libres y el 17.2% por la situación de haber un padre sustituto.

En lo que se refiere a los apoyos que tiene el niño o joven, el 46.2% acude a sus amigos cuando tiene problemas y el 2.1% no solicita ninguna ayuda.

Por lo que respecta al tiempo de vivir en la calle, se encontró que el 21.5% ha permanecido fuera de su hogar menos de un año, el 31.2% tiene de 1 a 3 años y el 47.3% de cuatro a más años.

El 68.0% ha tenido en alguna ocasión responsabilidades en actividades escolares y su rasgo de personalidad más sobresaliente es la comunicación para adaptarse a situaciones diversas (45.5%).

La mayoría utiliza drogas por razones emocionales, principalmente por distracción; el 29.2%; por curiosidad, con 25.1% para evadir conflictos, fundamentalmente en el seno de la familia.

El 81.2% reportó sensaciones agradables al consumirla. El 63.7% de los niños o jóvenes acudieron en forma voluntaria al centro de tratamiento y el 6.2% fueron llevados por amigos o familiares. El 43.3% declaró haber recibido en algún momento algún tipo de tratamiento con el fin de abandonar su consumo, y el 60.4% tienen una opinión favorable del centro al que acudieron. En relación a la vía de administración, el 92.5% declaró que no ha usado drogas por vía intravenosa y que el tipo de consumo más frecuente es el experimental con un 36.9%, lo que significa que el niño o joven acude a la droga por exploración, curiosidad o búsqueda de identidad, lo cual plantea un patrón de consumo variable. En segundo término se encuentra el tipo funcional con 30.9%, en el que la droga cumple un objetivo más específico, el niño sabe cuándo y dónde consumirla, pero no tiene percepción del daño y, en tercer término, el 20.6% pertenece al tipo dependiente, que se expresa por poco control de consumo y sin reglas para conseguir la droga.

En relación al patrón de consumo de drogas entre niños y jóvenes *de* y *en* la calle, las que aparecen con mayor frecuencia son las sustancias que se inhalan, con el 81.9%; la mariguana con el 48.3%; la cocaína con el 25.5%; el tabaco con el 17.6% y en quinto lugar el alcohol con el 8.1% (*cuadro 20*).

CONSUMO DE DROGAS EN OFICIALES DEL TRANSPORTE 1994-1998

Durante el periodo 1994-1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó exámenes psicofísicos integrales a operadores del transporte. Al analizar los resultados por tipo de transporte, se observa que el carretero presenta la mayor proporción de operadores no aptos con un 80% en promedio durante el periodo analizado; aunque se observa una caída en esta proporción durante 1995, pues llegó al 57.6%, y un pico máximo en 1998, de 83%. El segundo lugar lo ocupó el personal del transporte marítimo con 9% (*gráfica 2* y *cuadro 21*).

Respecto al tipo de droga detectada entre 1994 y 1998, la mariguana ocupa el primer lugar de uso con un 38.3 % en promedio, observándose el porcentaje más alto en 1995 a pesar de que el número total de casos fue el menor de los 5 años. En orden de importancia, las anfetaminas y la cocaína ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente (38.9% y 31.5%), apreciándose un incremento considerable en el reporte de anfetaminas, que se colocaron en 1998 como las drogas más consumidas entre esta población alcanzando un registro récord de 39% (*gráfica 3* y *cuadro 22*).

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n= 10985	Mariguana n= 1548	Inhalables n= 1435	Alcohol n= 888	Tabaco n= 341	Tranquilizantes n= 396	Cocaína n= 4438	Heroína n= 301	Cristal n= 292	Rohypnol n= 329	Refractil n= 29	D. Médicas* n= 228	D. Ilícitas** n=618
Sexo													
Masculino	89.2	88.7	85.4	87.5	90.6	76.3	92.6	94.0	89.4	91.5	69.0	82.0	84.4
Femenino	10.8	11.3	14.6	12.5	9.4	23.7	7.4	6.0	10.6	8.5	31.0	18.0	15.6
Edad													
14 años o menos	7.9	9.8	24.0	10.0	12.9	6.3	2.7	0.3	3.5	7.0	13.8	4.4	3.9
15 - 19 años	32.4	40.2	45.3	37.2	38.1	30.1	26.2	16.7	20.4	30.4	41.4	23.7	34.6
20 - 24 años	24.1	22.0	15.3	20.4	18.5	21.2	28.4	28.0	24.9	26.7	27.6	24.1	26.6
25 - 29 años	17.0	11.7	7.8	14.4	13.2	15.9	21.9	26.0	27.3	20.1	13.8	16.7	13.5
30 - 34 años	9.8	6.9	3.8	8.8	10.6	9.1	12.1	15.3	15.6	7.6	3.4	13.6	11.2
35 años o más	8.8	9.4	3.8	9.2	6.7	17.4	8.7	13.7	8.3	8.2	0.0	17.5	10.2
Escolaridad													
Primaria	20.8	23.7	24.5	22.5	28.3	22.2	16.8	32.0	24.5	24.1	10.3	18.9	17.6
Secundaria	49.0	47.9	57.6	48.7	47.3	46.0	48.4	45.2	43.1	46.3	65.6	45.8	46.2
Preparatoria	21.1	20.2	12.4	20.1	15.1	19.0	24.4	14.3	25.5	22.3	24.1	20.3	25.9
Técnico	4.3	3.8	3.0	3.4	5.7	6.5	4.9	4.4	3.1	3.7	0.0	5.3	4.8
Profesional	4.3	3.8	1.8	4.6	3.0	5.7	5.2	3.4	3.1	3.0	0.0	9.7	5.3
Analfabeta	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.2	0.7	0.7	0.6	0.0	0.0	0.2
Otro	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	66.5	72.5	84.5	69.7	75.4	63.4	58.9	57.4	53.2	70.4	79.3	57.5	69.4
Casado	19.8	16.4	7.4	17.7	12.9	21.7	26.4	16.6	21.1	15.1	6.9	24.3	16.9
Divorciado	1.3	0.8	0.5	1.0	1.5	1.5	1.3	2.7	3.9	2.2	0.0	3.1	1.3
Viudo	0.2	0.3	0.0	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5
Unión libre	8.5	7.3	5.3	7.8	6.9	8.2	9.3	17.9	15.1	7.4	10.3	9.7	7.2
Otro	3.7	2.7	2.3	3.3	3.3	4.9	4.0	5.4	6.7	4.6	3.5	5.4	4.7
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	26.6	25.7	13.7	23.7	31.6	30.5	25.9	41.1	45.8	27.5	18.2	35.5	34.9
Medio bajo	52.9	50.7	61.0	54.1	49.1	48.9	55.7	40.2	34.1	54.1	63.6	43.0	44.4
Medio	7.4	8.3	5.7	7.5	5.8	6.1	8.0	3.7	5.6	5.1	9.1	8.4	10.6
Bajo	13.1	15.3	19.6	14.7	13.5	14.5	10.4	15.0	14.5	13.3	9.1	13.1	10.1
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


Características	Global n= 10985	Mariguana n= 1548	Inhalables n= 1435	Alcohol n= 888	Tabaco n= 341	Tranquilizantes n= 396	Cocaína n= 4438	Heroína n= 301	Cristal n= 292	Rohypnol n= 329	Refractil n= 29	D. Médicas* n= 228	D. Ilícitas** n= 618
Frecuencia actual													
Diario	44.4	43.4	29.9	13.1	67.5	45.2	34.6	83.5	43.3	31.4	66.6	54.4	33.4
2-3 veces por semana	12.0	12.6	14.7	8.5	7.7	12.1	16.7	4.9	17.4	10.1	6.7	7.4	7.7
1 vez por semana	20.9	14.5	19.3	34.5	9.5	10.1	23.2	3.1	12.4	21.9	6.7	8.8	10.5
1-3 veces por mes	19.5	23.2	26.5	39.5	13.6	22.1	21.3	7.6	18.4	28.7	13.3	23.5	35.96
1-11 veces por año	3.2	6.3	9.6	4.4	1.7	10.5	4.2	0.9	8.5	7.9	6.7	5.9	12.5
Edad de inicio													
9 años o menos	2.8	2.1	2.8	3.8	3.9	1.8	2.3	3.0	3.8	2.2	3.6	4.5	5.8
10-14 años	40.5	38.2	54.0	40.6	38.3	43.2	34.6	49.6	49.7	47.7	53.6	37.8	45.1
15-19 años	46.1	49.1	39.6	42.0	48.1	38.2	50.2	41.6	39.6	44.2	35.7	42.8	42.1
20-24 años	6.8	7.3	2.52	8.6	5.7	6.2	8.6	4.1	5.6	3.1	7.1	7.2	3.7
25-29 años	2.1	2.2	0.6	2.4	2.5	3.6	2.5	0.7	1.0	1.9	0.0	4.1	2.4
30-34 años	0.9	0.8	0.4	1.3	0.6	2.3	1.2	0.3	0.0	0.9	0.0	1.8	0.2
35 años o más	0.8	0.3	0.1	1.3	0.9	4.7	0.6	0.7	0.3	0.0	0.0	1.8	0.7
Droga de inicio													
Alcohol	26.3	27.3	18.3	15.4	25.2	25.7	31.1	22.9	30.2	25.8	10.3	27.3	24.3
Mariguana	29.2	29.9	24.6	30.7	33.3	25.7	27.8	41.3	30.8	35.4	17.2	29.4	33.2
Inhalables	17.3	18.3	40.4	17.1	18.2	13.8	11.5	10.6	6.8	17.9	24.2	6.2	15.9
Alucinógenos	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.2
Heroína	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2
Opio-Morfina y deriv.	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	2.6	0.0
Cocaína	12.9	10.3	4.8	20.0	13.8	3.3	18.3	5.3	6.2	8.5	0.0	6.2	7.6
Tranquilizantes	1.3	0.3	0.6	1.4	0.9	16.1	0.6	1.7	0.7	0.3	6.9	2.6	1.0
Barbitúricos	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
Anfetaminas	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.2
Anticolinérgicos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2
Tabaco	9.8	11.5	8.5	11.5	4.7	10.4	8.8	14.6	19.5	7.6	13.8	14.0	8.9
Antidepresivos	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.8	0.0
Otros psicotrópicos	1.0	0.5	1.2	1.0	1.2	2.0	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	7.1
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Cristal	0.3	0.4	0.1	0.6	0.6	0.0	0.1	0.3	4.8	0.0	0.0	1.3	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.0	3.3	6.9	0.4	0.2
Crack	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Refractil ofteno	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	20.7	0.0	0.3

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil. 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales,

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

Características	Global n=5878	Mariguana n= 382	Inhalables n= 299	Alcohol n=498	Tabaco n= 38	Tranquilizantes n=61	Cocaína n= 835	Heroína n= 1940	Cristal n= 212	Rohypnol n=24	Refractil n=1	D. Médicas* n=53	D. Ilícitas** n=70
Sexo													
Masculino	92.5	92.1	94.6	84.5	71.1	83.6	91.5	96.5	90.1	69.6	100.0	67.9	85.7
Femenino	7.5	7.9	5.4	15.5	28.9	16.4	8.5	3.5	9.9	30.4	0.0	32.1	14.3
Edad													
14 años o menos	3.0	3.1	16.8	2.2	21.1	3.3	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	5.7	8.6
15 - 19 años	18.6	36.4	43.0	9.1	44.7	34.4	21.3	6.3	28.3	20.8	0.0	5.7	24.2
20 - 24 años	21.6	26.2	22.7	12.7	7.9	21.3	25.4	18.3	30.7	41.7	0.0	15.1	15.7
25 - 29 años	17.2	11.0	8.4	12.1	7.9	8.2	19.4	20.6	19.3	16.7	0.0	11.3	12.9
30 - 34 años	15.4	12.0	5.7	12.1	7.9	14.8	17.7	21.1	8.5	12.5	0.0	15.1	15.7
35 años o más	24.2	11.0	3.4	51.8	10.5	18.0	14.9	33.7	11.8	8.3	100.0	47.1	22.9
Escolaridad													
Primaria incompleta	14.1	10.8	26.0	11.3	7.9	9.8	6.3	12.2	14.6	16.7	0.0	11.3	2.9
Primaria completa	19.3	17.9	23.3	13.3	21.1	26.3	12.1	22.3	17.9	16.7	100.0	9.4	16.2
Secundaria incompleta	21.0	25.2	28.4	11.5	31.5	21.3	17.3	22.8	25.0	20.8	0.0	11.3	19.1
Secundaria completa	21.4	24.5	15.1	17.6	23.7	21.3	21.1	25.8	23.1	33.3	0.0	13.2	29.4
Preparatoria incompleta	12.4	10.3	3.1	11.9	13.2	11.5	21.6	12.0	15.6	4.2	0.0	9.4	16.2
Preparatoria completa	2.8	3.4	0.3	3.7	2.6	1.6	6.6	1.7	1.4	0.0	0.0	7.5	4.4
Profesional	6.5	4.7	2.1	25.6	0.0	6.6	14.0	1.1	0.0	0.0	0.0	34.1	10.3
Analfabeta	2.5	3.2	1.7	5.1	0.0	1.6	1.0	2.1	2.4	8.3	0.0	3.8	1.5
Estado civil													
Soltero	53.8	68.2	80.9	40.3	73.0	75.5	53.4	48.0	61.2	47.9	0.0	32.1	49.3
Casado	25.4	17.9	5.6	42.6	16.2	19.7	28.6	22.0	24.6	13.0	0.0	45.2	27.7
Divorciado	3.7	2.6	0.7	5.1	2.7	1.6	3.7	4.8	1.9	4.3	100.0	17.0	4.6
Viudo	0.7	0.5	0.3	1.8	0.0	1.6	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	10.6	7.1	9.4	5.3	2.7	1.6	9.5	14.3	8.5	30.5	0.0	3.8	16.9
Otro	5.8	3.7	3.1	4.9	5.4	0.0	4.7	9.9	3.3	4.3	0.0	1.9	1.5
Acudió													
En forma voluntaria	38.6	37.5	39.9	38.2	38.9	45.9	49.3	44.2	25.0	37.5	0.0	26.9	27.4
Por amigos o familia	40.4	39.5	38.9	51.1	36.1	39.4	36.8	51.1	65.5	33.3	100.0	65.4	46.8
Por indicación legal	16.7	18.2	14.4	8.1	22.2	9.8	8.8	1.5	1.9	12.5	0.0	5.8	22.6
Por indicación médica	0.7	0.8	1.0	0.6	0.0	0.0	1.5	0.2	0.5	12.5	0.0	1.9	0.0
Otros	3.6	4.0	5.8	2.0	2.8	4.9	3.6	3.0	7.1	4.2	0.0	0.0	3.2

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 4. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


Características	Global n=5878	Mariguana n= 382	Inhalables n= 299	Alcohol n=498	Tabaco n= 38	Tranquilizantes n=61	Cocaína n=835	Heroína n=1940	Cristal n=212	Rohypnol n= 24	Refractil n=1	D. Médicas* n=53	D. Ilícitas** n=70
Frecuencia actual													
Diario	72.6	85.9	79.9	76.5	80.0	86.9	75.3	98.4	89.5	87.0	100.0	78.5	68.8
2 - 3 veces por semana	9.4	7.8	8.0	10.8	0.0	4.9	10.9	0.7	3.8	8.7	0.0	7.8	13.1
1 vez por semana	9.7	3.6	3.4	6.9	0.0	3.3	5.9	0.6	4.8	4.3	0.0	3.9	4.9
1 - 3 veces por mes	7.1	1.9	7.2	4.9	20.0	0.0	5.4	0.2	1.4	0.0	0.0	3.9	6.6
1 - 11 veces por año	1.2	0.8	1.5	0.9	0.0	4.9	2.5	0.1	0.5	0.0	0.0	5.9	6.6
Edad de inicio													
9 años o menos	4.8	0.6	4.5	3.8	21.7	1.8	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0
10 - 14 años	43.1	30.7	44.2	25.2	52.3	27.2	7.0	6.9	11.7	13.0	0.0	10.0	16.9
15 - 19 años	38.9	49.5	37.2	36.4	17.4	40.0	32.0	39.0	41.2	43.6	100.0	12.0	35.6
20 - 24 años	7.9	9.6	8.3	8.4	4.3	7.3	23.7	25.9	23.8	26.1	0.0	24.0	13.6
25 - 29 años	2.7	3.9	2.9	4.5	0.0	7.3	15.2	14.8	8.7	4.3	0.0	2.0	11.9
30 - 34 años	1.6	3.3	1.7	3.8	4.3	5.5	11.5	8.0	9.2	8.7	0.0	16.0	3.4
35 años o más	1.0	2.4	1.2	17.9	0.0	10.9	10.5	5.4	4.4	4.3	0.0	34.0	18.6
Droga de inicio													
Alcohol	26.4	30.9	15.1	79.3	13.2	27.9	42.0	11.0	12.7	25.0	0.0	35.9	35.7
Mariguana	38.0	41.4	24.1	5.0	7.9	27.9	23.8	54.3	51.5	25.0	100.0	18.9	27.1
Inhalables	10.0	13.4	46.4	3.4	0.0	11.5	6.0	8.2	4.2	29.1	0.0	7.5	8.6
Alucinógenos	0.4	0.5	2.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Heroína	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0
Cocaína	6.0	0.8	0.7	1.2	2.6	1.6	15.0	2.4	5.2	4.2	0.0	0.0	2.9
Tranquilizantes	0.7	0.3	0.7	0.2	0.0	21.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4
Barbitúricos	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0
Anfetaminas	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	9.2	11.0	10.7	9.7	76.3	8.2	11.0	3.5	7.5	12.5	0.0	7.5	8.6
Antidepresivos	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	1.9	0.0
Otros psicotrópicos	1.5	0.3	0.3	0.8	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Cristal	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.2	0.0	1.9	0.0
Crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

• Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 2. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales,

CUADRO 5. Perfil sociodemográfico de la población que acudió a tratamiento psiquiátrico

<i>Características</i> Número	<i>General</i> n =3869	<i>Neurosis</i> <i>sintomática</i> n =1612	<i>Trastorno</i> <i>afectivo</i> n =563	<i>Trastorno</i> <i>psicótico</i> n =1846	<i>Trastorno</i> <i>caracterológico</i> n =2404	<i>Trastorno</i> <i>mental orgánico</i> n =1292
Sexo	Masculino 70.5	Masculino 70.2	Femenino 57.4	Masculino 67.8	Masculino 63.7	Masculino 89.3
Edad	40 y más 36.8	40 y más 41.2	40 y más 43.0	40 y más 38.6	40 y más 39.4	40 y más 32.4
Escolaridad	Prim incom. 24.4	Prim incom. 23.2	Licen. 20.9	Prim incom. 28.9	Prim incom. 25.0	Prim incom. 24.7
Estado civil	Soltero 45.8	Casado 46.8	Casado 46.5	Soltero 54.3	Soltero 46.2	Soltero 50.0
Acudió	Por amigos 68.5	Por amigos 67.0	Por amigos 65.9	Por amigos 76.8	Por amigos 79.2	Por amigos 67.4
Hospitalizado	Sí 57.3	Sí 52.3	Sí 64.9	Sí 67.4	Sí 62.6	Sí 56.4
Frecuencia	1 a 5 veces 74.9	1 a 5 veces 75.6	1 a 5 veces 79.8	1 a 5 veces 73.4	1 a 5 veces 74.5	1 a 5 veces 73.1

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 6. Porcentaje de consumo de drogas entre la población que acudió a tratamiento psiquiátrico según diagnóstico en las ciudades SISVEA

<i>Características</i> Número	<i>Total</i> 3869	<i>Neurosis sintomática</i> 1612	<i>Trastorno afectivo</i> 563	<i>Trastorno psicótico</i> 1846	<i>Trastorno caracterológico</i> 2404	<i>Trastorno mental orgánico</i> 1292
Droga de inicio antes de tratamiento						
Alcohol	23.3	24.3	8.5	15.0	18.3	35.4
Mariguana	16.1	13.0	5.2	11.8	10.6	27.9
Inhalables	7.4	4.8	0.7	7.9	5.2	15.2
Cocaína	13.2	13.0	4.3	6.6	8.2	21.3
Heroína	3.4	2.1	0.2	0.4	0.9	3.7
Tranquilizantes	4.4	4.3	1.4	2.2	2.3	7.1
Drogas médicas	1.2	0.9	0.4	0.9	1.0	1.7
Drogas ilícitas	4.9	2.7	0.5	4.1	3.3	8.0
Droga utilizada durante tratamiento						
Alcohol	3.0	3.3	0.7	2.2	3.0	4.5
Mariguana	1.1	0.7	0.5	1.1	1.0	2.4
Inhalables	0.7	0.4	0.2	0.9	0.7	1.6
Cocaína	1.0	0.6	0.2	0.8	0.7	2.5
Heroína	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5
Tranquilizantes	9.5	14.5	6.3	8.1	11.9	8.0
Drogas médicas	17.5	17.4	19.7	25.1	24.1	11.3
Drogas ilícitas	16.9	14.7	22.4	23.8	21.8	13.0
Droga de consumo actual						
Alcohol	6.9	6.8	1.6	3.5	4.2	12.6
Mariguana	5.0	4.7	1.6	2.6	2.2	8.3
Inhalables	1.8	1.3	0.4	1.6	1.2	3.4
Cocaína	4.5	3.9	1.6	1.4	1.7	7.1
Heroína	3.1	1.6	0.2	0.3	0.4	2.6
Tranquilizantes	9.6	13.6	6.4	6.4	11.0	8.1
Drogas médicas	17.9	12.4	16.2	24.5	24.0	11.7
Drogas ilícitas	17.8	10.5	16.5	24.1	21.3	13.2

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 7. Perfil de pacientes que acude a tratamiento psiquiátrico por consumo de drogas, 1998

Características	Núm.	Sexo	%	Edad	%	Escolaridad	%	Estado civil	%	Hospita- lizado	%	Tipo de droga	%
Neurosis sintomática													
a) Ansiógena	432	M	92.5	40 y más	37.5	Prim. incompl.	22.4	Casado	43.4	Sí	53.0	Alcohol	21.5
b) Fóbica	3	M	66.7	35 - 39	66.7	Prim. incompl.	33.3	Casado	100.0	Sí	66.7	Alcohol	66.7
c) Depresiva	194	M	92.5	40 y más	41.1	Prim. compl.	21.7	Casado	52.1	Sí	50.8	Alcohol	41.2
Trastorno afectivo													
a) U. maniáco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Dep. mayor	33	M	87.9	20 -24	30.3	Prim. compl.	18.8	Casado	53.1	Sí	31.6	Marig.	36.4
c) Bipolar	14	M	83.3	40 y más	28.6	Prim. compl.	42.9	Soltero	50.0	Si	44.4	Marig.	21.4
Trastorno psicótico													
a) Esquizofrenia	72	M	90.0	40 y más	30.6	Prim. incompl.	26.1	Soltero	64.8	Sí	58.8	Alcohol	37.5
b) Orgánico	366	M	92.4	40 y más	33.4	Prim. incompl.	27.5	Soltero	55.4	Sí	63.2	Marig.	33.6
c) Otra funcional	128	M	93.9	40 y más	37.9	Prim. incompl.	26.2	Soltero	44.5	Sí	50.5	Alcohol	35.2
Trastorno caracterológico													
a) Neurótico	287	M	93.8	40 y más	40.0	Prim. incompl.	18.8	Casado	46.1	Sí	66.0	Alcohol	27.9
b) Limítrofe	75	M	82.4	25 - 29	24.0	Sec. incompl.	24.3	Soltero	55.4	Sí	27.1	Marig.	61.3
c) Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno mental orgánico													
a) Retardo mental	13	M	92.3	20 - 24	30.8	No estudio	38.5	Soltero	84.6	Sí	22.2	Marig.	53.8
b) Traumático	8	M	85.7	40 y más	37.5	Prim. incompl.	50.0	Soltero	37.5	Sí	83.3	Marig.	25.0
c) Por sustancias	1131	M	92.3	40 y más	32.6	Prim. incompl.	23.4	Casado	38.9	Sí	54.9	Alcohol	38.8

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos

CUADRO 8. Características demográficas y patrón de consumo en individuos de alcohólicos anónimos*

<i>Características</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Patrón de Consumo</i>	<i>Porcentaje</i>
Sexo		Edad de inicio	
Masculino	95.1	15 a 19	47.0
Edad		Tipo de Bebida	
35 a 39	71.7	Destilados	56.8
Escolaridad		Frecuencia de consumo	
Primaria incompleta	28.0	1 a 3 por semana	35.6
Estado civil		Cantidad de consumo	
Casado	61.2	16 o más	51.7
Acudió		Experiencia con otra droga	
Por amigos	80.9	Si	13.2
Droga de combinación habitual			
Mariguana	2.0		
Cocaína	2.3		

* Población total: Individuos

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos. 1998.

N=702

CUADRO 9. Aspectos Relevantes de individuos con consumo habitual de Alcohol

<i>Aspectos</i>	<i>Porcentaje</i>
Se ha despertado por las noches sudoroso o tembloroso por falta de alcohol	86.5
Ha estado borracho durante varios días	77.1
Una vez que empieza a tomar, le es difícil detenerse antes de sentirse borracho	60.5
Ha bebido una copa a la mañana siguiente para "curarse la cruda"	92.2
Por estar bebiendo deja de comer	53.8
Ha notado cambios en los hábitos de consumo de alcohol	69.7
Toma siempre igual, sin importar que día de la semana es	56.1
Ha bebido tanto que al día siguiente no puede recordar lo que dijo o hizo	61.9
Ha tenido temblores al dejar de tomar	81.3
Ha dejado de trabajar debido al consumo de alcohol	71.4
Su consumo de bebidas alcohólicas ha interferido en actividades familiares	80.3
Cuando siente la necesidad de una copa, no puede concentrarse en otra cosa	70.2
Tiene problemas para dejar de beber, a pesar de habérselo propuesto	87.7
Ha tratado de reducir el consumo, pero no puede	67.6
Ha tenido que tomar más para sentir los mismos efectos que antes	71.4

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=702

CUADRO 10. Características sociodemográficas de fumadores

<i>Características</i>	<i>General n=524</i>	<i>D. F. n=286</i>	<i>Guadalajara n=197</i>	<i>Culiacán n= 31</i>	<i>Aguascalientes n=10</i>
Sexo	Femenino 54.8	Femenino 52.4	Femenino 56.9	Femenino 54.8	Femenino 70.0
Edad	40 y más 61.5	40 y más 71.6	40 y más 54.3	40 y más 38.7	40 y más 40.0
Estado civil	Casado 63.7	Casado 49.5	Casado 73.3	Casado 64.5	Casado 60.0
Escolaridad	Lic o posgrado 35.2	Lic o posgrado 38.4	Primaria incom 20.0	Lic o posgrado 51.6	Lic o posgrado 44.4
Acudió	Voluntaria 86.9	Voluntaria 89.1	Voluntaria 83.3	Voluntaria 87.1	Voluntaria 100.0
Consumo de otras drogas	Sí 32.5	Sí 28.4	Sí 42.3	Sí 12.9	Sí 10.0
Drogas que ha probado	Alcohol 13.8	Mariguana 19.8	Alcohol 23.4	Mariguana 9.7	Mariguana 10.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 11. Patrón de consumo de fumadores

<i>Características</i>	<i>General n= 524</i>	<i>D.F. n= 286</i>	<i>Guadalajara n= 197</i>	<i>Culiacán n=31</i>	<i>Aguascalientes n= 10</i>
Edad de inicio	15 a 19 43.8	15 a 19 43.7	15 a 19 43.1	15 a 19 35.5	15 a 19 50.0
Edad en la cual fumó 5 o más cigarros	15 a 19 45.5	15 a 19 46.1	15 a 19 44.2	15 a 19 41.9	15 a 19 70.0
Frecuencia de consumo	diario 96.1	diario 98.7	diario 97.4	diario 66.7	diario 100.0
Cuantos cigarros fuma al día	16 o más 58.3	16 o más 67.3	16 o más 52.8	1 a 5 46.7	16 o más 50.0
Tipo de cigarro	con filtro 92.5	con filtro 89.9	con filtro 93.4	con filtro 87.5	con filtro 100.0
Le da el golpe al cigarro	siempre 83.6	siempre 82.5	siempre 85.7	siempre 54.8	siempre 80.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 12. Criterios de dependencia en fumadores

<i>Criterios</i>	<i>General n= 470</i>	<i>D. F. n= 232</i>	<i>Guadalajara n= 197</i>	<i>Culiacán n=31</i>	<i>Aguascalientes n=10</i>
Abstención en lugar prohibido	32.4	35.3	30.4	16.1	40.0
Tiempo transcurrido entre despertar y fumar (menos de 5 minutos)	39.0	43.0	36.8	10.3	20.0
Fuma más por las mañanas	41.0	45.0	39.1	29.0	20.0
Fuma enfermo	50.8	64.3	40.7	19.4	30.0
Cuál es el cigarro más difícil de dejar (el primero de la mañana)	36.2	45.7	33.2	22.6	40.0
Ha intentado dejar de fumar	78.8	82.7	74.7	80.6	60.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 13. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias, 1998

<i>Influencia de drogas</i> N=562		<i>Uso habitual de drogas</i> N=1810	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
20 a 24	22.3	40 y más	26.6
Sexo		Sexo	
Masculino	85.7	Masculino	73.4
Escolaridad		Escolaridad	
Primaria incompleta	35.9	Primaria incompleta	24.5
Estado civil		Estado civil	
Soltero	55.6	Casado	45.4
Consciente		Consciente	
Sí	94.4	Sí	96.4
Primera vez		Primera vez	
Sí	70.9	Sí	77.6
Destino		Destino	
Alta	58.7	Alta	63.4

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.
 N=3932

CUADRO 14. Población bajo influjo por patología y drogas

<i>Patologías</i>	<i>Número</i>	<i>Número</i> 191	<i>Mariguana</i> N=18	<i>Inhalables</i> n=30	<i>Alcohol</i> n=96	<i>Tabaco</i> n=2	<i>Tranquilizantes</i> n=4	<i>Cocaína</i> n=22	<i>Heroína</i> n=3	<i>Cristal</i> n=0	<i>Rohypnol</i> n=0	<i>Refractil</i> n=0	<i>*D.Médicas</i> n=9	<i>**D.Ilícitas</i> n=7
Bronquitis/enfisema/asma	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA de tráquea/bronquios/pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. Isquémica del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensión	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Enf. cerebrovascular	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otra afección neurológica	10	1	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Cirrosis/gastritis	21	2	2	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sangrado de tubo digestivo	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urgencias quirúrgicas	18	3	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicosis alcohólica/drogas	77	7	8	37	0	2	14	1	0	0	0	0	3	5
Afección gineco-obstétrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección osteo-muscular	8	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Afección dermatológica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes Mellitus	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sida	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras	42	4	6	21	1	0	3	1	0	0	0	0	4	2

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.


FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

Servicios Médicos de Urgencias

GRÁFICA 1. Lesiones asociadas al consumo de drogas



N=3931



Fuente: SISVEA - Servicios de Urgencias/1998

CUADRO 15. Distribución por causa de muertes violentas producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Global n=1211</i>	<i>Accidentes n=505</i>	<i>Homicidios n=230</i>	<i>Suicidios n=151</i>
Sexo				
Masculino	91.5	91.6	92.4	92.0
Femenino	8.5	8.4	7.6	8.0
Edad				
14 años o menos	0.8	1.0	1.3	0.7
15-19 años	5.3	6.9	5.8	6.2
20-24 años	14.1	12.7	24.0	22.8
25-29 años	14.4	14.7	18.2	23.4
30-34 años	11.0	11.7	12.4	12.4
35-39 años	9.7	9.7	10.3	7.6
40 o más	44.7	43.3	28.0	26.9
Causa de muerte				
Atropellado	13.4	28.8	4.5	0.0
Choque en vehículo	12.2	28.0	1.4	0.0
Caída	4.4	9.9	0.0	1.3
Electrocutado	0.4	0.4	0.5	0.7
Quemado	0.5	1.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	3.2	0.8	14.9	0.7
Asfixia	7.4	5.2	5.0	26.5
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	15.1	0.8	47.1	43.0
Arma punzocortante	4.4	0.8	18.9	1.3
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	10.1	6.8	0.5	7.3
Envenenado	0.1	0.0	0.0	0.0
Otros	28.8	17.5	7.2	19.2
Lugar				
Tránsito	15.3	30.6	7.6	2.0
Hogar	33.6	14.1	16.5	80.0
Vía pública	32.9	40.8	56.3	6.0
Baños públicos	0.2	0.2	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	2.9	2.2	8.0	0.7
Trabajo	1.8	2.8	1.8	0.0
Área de servicio	2.8	1.2	1.8	2.0
Hospital	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	10.5	8.1	8.0	9.3

N = 6377

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 16. Distribución de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Alcohol n=1076</i>	<i>Opioides n=9</i>	<i>Mariguana n=54</i>
Sexo			
Masculino	91.8	100.0	90.5
Femenino	8.2	0.0	9.3
Edad			
14 años o menos	0.6	0.0	1.9
15-19 años	4.9	11.1	13.5
20-24 años	14.1	22.2	23.1
25-29 años	13.6	0.0	21.2
30-34 años	11.6	11.1	1.9
35-39 años	9.6	22.2	11.5
40 o más	45.6	33.4	26.9
Causa de muerte			
Atropellado	14.2	0.0	7.5
Choque en vehículo	13.6	0.0	3.8
Caída	4.8	12.5	0.0
Electrocutado	0.4	0.0	0.0
Quemado	0.5	0.0	0.0
Golpe por objeto	3.2	0.0	5.7
Asfixia	7.3	0.0	1.9
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	14.9	25.0	32.1
Arma punzocortante	4.1	0.0	17.0
Violación	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	9.7	50.0	3.8
Envenenado	0.1	0.0	0.0
Otros	27.2	12.5	28.2
Lugar			
Tránsito	16.4	0.0	6.1
Hogar	33.1	25.0	38.8
Vía pública	34.3	37.5	30.6
Baños públicos	0.1	12.5	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	2.6	0.0	0.0
Trabajo	1.3	12.5	2.0
Área de servicio	2.8	0.0	2.0
Hospital	0.0	0.0	0.0
Otros	9.4	12.5	20.5

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 17. Aseguramiento y erradicación de enervantes en las ciudades

Concepto	Nacional	Aguas- calientes	Baja California	Chihuahua	Distrito Federal	Durango	Guanajuato	Jalisco	Nuevo León	San Luis Potosí	Sinaloa	Tamaulipas	Yucatán
Sem. Marihuana*	4948.74	0	7.98	272.80	0.15		471.40	0	466.7	2.37	801.84	8.70	0.06
Sem Amapola*	702.55	0	0	45.56	0	75.10	0	15.62	0	0	59.01	0	0
Marihuana*	1062143.98	3107.32	14266.98	82475.66	1396.26	108809.11	604.46	49394.38	22753.99	49918.87	151143.51	87819.52	33.
Goma de Opio*	149.6414	0	0	6.5860	17.8000	7.4560	0	2.9800	0	0	22.8175	00	0
Morfina*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heroína*	120.8961	0.0250	1.4748	0.4621	18.6454	1.8019	0	5.3063	0	0.2500	55.5206	0.9112	0
Cocaína*	22597.6267	0.5704	216.8707	633.3341	1139.6583	857.2330	33.7015	1121.3835	665.2517	449.8206	5602.6307	2458.5709	4.7367
Psicotrópicos**	1484.078	3.068	1.065	491	711	875	153	9.773	1.410	128	3.798	13.219	181
Otras drogas*	96.01	0	33.01	0	0	0.11	0	0	0	5.45	11.76	0	0
Erradicación													
Plantíos de marihuana	297.652	27	392	48.667	0	32.525	35	25.953	23	40	67.260	12	0
Hectáreas	23928.32	3.16	33.96	3954.98	0	2557.57	1.72	2173.26	2.86	1.69	6248.14	3.36	0
Plantíos de amapola	201.303	0	1	28.146	0	30.376	1	200	7	14	21.774	0	0
Hectáreas	17449.09	0	0.40	2220.35	0	2489.08	0.09	16.17	0.55	1.11	2107.51	0	0

* Kilogramos

** Unidades

FUENTE: Procuraduría General de la República, 1998.

CUADRO 18a. Dosis que se evitó llegara al mercado consumidor en las ciudades

<i>Concepto</i>	<i>Nacional</i>	<i>Aguascalientes</i>	<i>Baja California</i>	<i>Chihuahua</i>	<i>Distrito Federal</i>	<i>Durango</i>	<i>Guanajuato</i>
Mariguana	673493.255	187.825	3035.955	108215.293	56.542	71828.824	65.981
Cocaína	45195.253	1.141	433.741	1266.668	2279.317	1714.466	67.403
Opiodes	140709.553	200	14.998	17773.087	166.963	19934.473	720

FUENTE: Procuraduría General de la República, 1998.

CUADRO 18b . Dosis que se evitó llegara al mercado consumidor en las ciudades

<i>Concepto</i>	<i>Jalisco</i>	<i>Nuevo León</i>	<i>San Luis Potosí</i>	<i>Sinaloa</i>	<i>Tamaulipas</i>	<i>Yucatán</i>
Mariguana	59599.981	834.706	1708.938	171655.242	3016.936	1.114
Cocaína	2242.767	1330.503	899.641	11205.261	4917.142	9.473
Opiodes	174.802	4.400	10.880	17327.041	7.290	0

FUENTE: Procuraduría General de la República, 1998.

CUADRO 19. Características sociales y tipo de delito cometido por menores infractores consumidores de drogas

<i>Global</i> N =6228 %	<i>Mariguana</i> n =2189 %	<i>Inhalables</i> n =1423 %	<i>Alcohol</i> n =242 %	<i>Cocaína</i> n =1054 %	<i>Tabaco</i> n =302 %	<i>Heroína</i> n =52 %
Masculino 91.7	Masculino 95.5	Masculino 93.3	Masculino 93.4	Masculino 93.4	Masculino 90.0	Masculino 88.2
Primaria incompleta 31.5	Primaria incompleta 39.2	Primaria incompleta 47.9	Secundaria incompleta 30.7	Primaria incompleta 33.4	Primaria incompleta 29.7	Primaria incompleta 33.3
Abandono de escuela Desinterés 56.8	Abandono de escuela Desinterés 66.4	Abandono de escuela Desinterés 82.4	Abandono de escuela Desinterés 41.3	Abandono de escuela Desinterés 42.4	Abandono de escuela Desinterés 42.4	Abandono de escuela Desinterés 51.0
Subempleado 31.4	Subempleado 36.5	Subempleado 37.5	Subempleado 39.9	Empleado 38.3	Subempleado 42.3	Subempleado 42.0
Usa tatuajes 30.4	Usa tatuajes 48.1	Usa tatuajes 48.5	Usa tatuajes 31.5	Usa tatuajes 44.8	Usa tatuajes 32.6	Usa tatuajes 62.2
Pertenece a banda 13.0	Pertenece a banda 22.2	Pertenece a banda 26.8	Pertenece a banda 11.9	Pertenece a banda 18.1	Pertenece a banda 13.5	Pertenece a banda 21.2
Tipo de familia Nuclear 51.6	Tipo de familia Extensa 53.3	Tipo de familia Extensa 57.2	Tipo de familia Nuclear 57.9	Tipo de familia Nuclear 50.2	Tipo de familia Nuclear 61.0	Tipo de familia Extensa 53.1
Disfuncional 72.2	Disfuncional 87.3	Disfuncional 90.1	Disfuncional 60.2	Disfuncional 84.8	Disfuncional 69.5	Disfuncional 73.5
Personalidad Extrovertido 66.3	Personalidad Extrovertido 71.2	Personalidad Extrovertido 74.4	Personalidad Introverso 56.0	Personalidad Extrovertido 75.2	Personalidad Introverso 53.1	Personalidad Introverso 72.9
Dependiente 56.9	Dependiente 56.5	Independiente 51.2	Dependiente 72.0	Dependiente 52.8	Dependiente 72.2	Dependiente 85.4
Sociable 65.5	Antisociable 52.1	Antisociable 53.4	Sociable 77.0	Antisociable 51.5	Sociable 79.2	Sociable 57.8
Pasivo 54.7	Agresivo 55.0	Agresivo 54.0	Agresivo 66.7	Agresivo 50.0	Agresivo 60.4	Agresivo 63.4
Ansioso 34.6	Ansioso 46.1	Ansioso 43.1	Ansioso 38.0	Ansioso 45.7	Ansioso 34.8	Ansioso 42.3
Frec. de consumo diario 47.6	Frec. de consumo diario 50.5	Frec. de consumo diario 34.1	Frec. de consumo 1 a 3 veces al mes 40.1	Frec. de consumo 1 a 3 veces al mes 41.7	Frec. de consumo diario 74.8	Frec. de consumo diario 55.8
Edad de inicio 10 a 14 64.0	Edad de inicio 10 a 14 64.5	Edad de inicio 10 a 14 72.1	Edad de inicio 10 a 14 51.9	Edad de inicio 10 a 14 51.3	Edad de inicio 10 a 14 62.2	Edad de inicio 15 a 18 73.1
Núm. de ingresos 1 vez 68.0	Núm. de ingresos 1 vez 52.2	Núm. de ingresos 1 vez 51.5	Núm. de ingresos 1 vez 64.6	Núm. de ingresos 1 vez 56.9	Núm. de ingresos 1 vez 57.5	Núm. de ingresos 2-4 veces 58.8
Uso de arma 14.3	Uso de arma 15.4	Uso de arma 14.1	Uso de arma 18.2	Uso de arma 17.6	Uso de arma 15.6	Uso de arma 24.0
Tipo de arma Punzo-cortante 48.4	Tipo de arma Punzo-cortante 63.3	Tipo de arma Punzo-cortante 68.5	Tipo de arma Fuego 40.5	Tipo de arma Punzo-cortante 67.3	Tipo de arma Fuego 40.5	Tipo de arma Punzo-cortante 63.6
Delito bajo efecto 22.3	Delito bajo efecto 36.0	Delito bajo efecto 47.2	Delito bajo efecto 38.0	Delito bajo efecto 34.0	Delito bajo efecto 26.1	Delito bajo efecto 59.6
Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes
Robo 53.2	Robo 50.3	Robo 51.8	Robo 51.2	Robo 52.5	Robo 56.6	Robo 65.4
Contra la salud 11.7	Contra la salud 21.9	Consumo/drogas 6.9	Portación de arma 5.8	Contra la salud 19.6	Contra la salud 5.6	Portación de arma 9.6
Portación de arma 5.3	Portación de arma 5.8	Contra la salud 15.2	Contra la salud 8.3	Portación de arma 5.4	Portación de arma 7.3	Homicidio 7.7
Lesiones 4.8	Lesiones 3.8	Portación de arma 5.2	Daños 8.7	Lesiones 3.9	Daños 6.0	Consumo/drogas 9.6

FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

CUADRO 21. Examen toxicológico positivo por tipo de transporte en "No aptos permanentes" para el periodo 1994 - 1998

Transporte	Año 1994		1995		1996		1997		1998		Totales	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Carretero	200	80.6	64	57.7	177	72.0	208	75.9	1262	83.2	1911	83.2
Marítimo	37	14.9	37	33.3	40	16.3	52	19.0	45	3.0	211	8.8
Ferrovionario	10	4.0	8	7.2	20	8.1	10	3.6	76	5.0	124	5.2
Aéreo	1	0.4	2	1.8	9	3.7	4	1.5	28	1.8	44	1.8
otros									105	6.9	105	4.4
Totales	248	100.0	111	100.0	246	100.0	274	100.0	1516	100.0	2395	100.0


FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994-1998

Cuadro 22. Principales drogas detectadas en operadores "No aptos" con examen toxicológico positivo, periodo 1994 - 1998

Droga	Año 1994		1995		1996		1997		1998		Totales	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mariguana	144	58.1	78	70.3	142	57.7	133	48.5	420	27.7	917	27.7
Cocaína	28	11.3	16	14.4	55	22.4	96	35.0	478	31.5	673	31.5
Anfetaminas	40	16.1	17	15.3	46	18.7	45	16.4	589	38.9	737	38.9
Otros	36	14.5	0	0.0	3	1.2	0	0.0	29	1.9	68	2.8
Totales	248	100.0	111	100.0	246	100.0	274	100.0	1516	100.0	2395	100.0


FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994-1998

Gráfica 2
Consumo de drogas entre oficiales de transporte "no aptos permanentes"
por tipo de consumo de drogas



Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994-1998

Gráfica 3
Proporción de exámenes toxicológicos positivos entre "No Aptos permanentes"
por tipo de transporte y año



Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1994-1998

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos durante 1998, la marihuana continua siendo la sustancia de mayor uso como droga de inicio, no obstante haberse presentado una importante reducción en este año, sustituida en este rubro por un incremento en la cocaína, sin que ésta la supere.

La heroína como droga de impacto resulta la principal sustancia que motiva la solicitud de atención en centros de tratamiento no gubernamentales, y nuevamente la cocaína fue la droga de uso actual más reportada en instalaciones del Centro de Integración Juvenil. Lo anterior marca un sustancial cambio en las drogas de consumo actual entre los individuos que acuden a tratamiento. Hace cinco años el predominio lo tenían drogas como marihuana, alcohol e inhalables, mientras que en la actualidad cocaína y heroína son las más reportadas. En este año el uso de cocaína ha mostrado un mayor incremento en ciudades SISVEA del centro y sur del país que el observado en aquellas de la franja fronteriza. También mostró mayor presencia entre los jóvenes delincuentes que son remitidos al Consejo Tutelar de Menores.

Por si fuera poco, día tras día se hace más evidente el uso de drogas médicas como el flunitrazepam y del tipo de los anticolinérgicos, como el refractil ofteno, los cuales aún presentan proporciones bajas pero en incremento constante. También el uso de drogas sintéticas como la metanfetamina (éxtasis), ha mostrado presencia preocupante como droga de impacto, e incluso como droga de inicio, lo cual debe tenerse presente cuando se planifiquen programas preventivos y de control.

Por otro lado, de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se ha observado un cambio sustancial de las drogas reportadas entre los oficiales de transporte “no aptos permanentes”, a los que se les ha negado o retirado su licencia: en años anteriores la marihuana era la más reportada y en 1998 las anfetaminas obtuvieron el mayor porcentaje.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


Características	Global n=117	Mariguana n= 3	Inhalables n= 1	Alcohol n=4	Tabaco n=1	Tranquilizantes n= 0	Cocaína n= 8	Heroína n= 1	Cristal n= 0	Rohypnol n=0	Refractil n=0	D. Médicas* n=2	D. Ilícitas** n=2
Sexo													
Masculino	85.5	66.7	100.0	100.0	100.0	0.0	87.5	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Femenino	14.5	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Edad													
14 años o menos	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	20.5	66.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
25 - 29 años	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	16.2	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
35 años o más	38.5	33.3	0.0	75.0	100.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Escolaridad													
Primaria incompleta	20.5	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria completa	21.4	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria incompleta	17.9	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Secundaria completa	19.7	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Preparatoria incompleta	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Preparatoria completa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	6.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analfabeta	4.2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Estado civil													
Soltero	42.8	66.7	100.0	25.0	0.0	0.0	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Casado	33.3	0.0	0.0	25.0	100.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Divorciado	5.1	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	1.7	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	14.5	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Otro	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	77.1	100.0	0.0	75.0	100.0	0.0	75.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Por amigos o familia	16.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Por indicación legal	4.6	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Por indicación médica	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

<i>Características</i>	<i>Global n=117</i>	<i>Mariguana n= 3</i>	<i>Inhalables n= 1</i>	<i>Alcohol n= 4</i>	<i>Tabaco n=1</i>	<i>Tranquilizantes n= 0</i>	<i>Cocaína n= 8</i>	<i>Heroína n= 1</i>	<i>Cristal n= 0</i>	<i>Rohypnol n= 0</i>	<i>Refractil n=0</i>	<i>D. Médicas* D n=2</i>	<i>Ilícitas** n=2</i>
Frecuencia actual													
Diario	86.3	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
2 - 3 veces por semana	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
1 - 3 veces por mes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
1 - 11 veces por año	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	53.0	66.7	100.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	38.5	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
25 - 29 años	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
30 - 34 años	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Droga de inicio													
Alcohol	37.6	66.7	0.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mariguana	18.8	0.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Inhalables	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	6.8	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	31.6	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n=195	Mariguana n= 30	Inhalables n= 33	Alcohol n= 18	Tabaco n=11	Tranquilizantes n= 13	Cocaína n= 47	Heroína n= 2	Cristal n= 4	Rohypnol n= 10	Refractil n=0	D. Médicas* n=13	D. Ilícitas** n=12
Sexo													
Masculino	87.7	90.0	84.8	83.3	90.9	76.9	95.7	100.0	100.0	100.0	0.0	69.2	83.3
Femenino	12.3	10.0	15.2	16.7	9.1	23.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	16.7
Edad													
14 años o menos	7.2	6.7	27.3	5.6	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	35.4	43.3	42.4	22.2	18.2	15.4	40.4	0.0	25.0	40.0	0.0	38.5	33.3
20 - 24 años	28.2	13.3	21.2	38.9	36.3	30.8	38.3	0.0	25.0	30.0	0.0	38.5	16.7
25 - 29 años	9.2	10.0	3.0	11.1	9.1	23.0	6.4	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7
30 - 34 años	9.7	10.0	0.0	22.2	9.1	0.0	10.6	50.0	0.0	10.0	0.0	7.7	25.0
35 años o más	10.3	16.7	6.1	0.0	18.2	30.8	4.3	0.0	0.0	20.0	0.0	15.3	8.3
Escolaridad													
Primaria	40.8	48.3	46.9	41.2	45.5	46.1	27.7	50.0	50.0	44.4	0.0	38.5	50.0
Secundaria	40.8	34.5	40.6	23.5	36.3	23.1	51.1	50.0	50.0	44.4	0.0	46.1	41.7
Preparatoria	11.5	6.9	9.4	11.8	18.2	23.1	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
Técnico	4.3	6.9	3.1	17.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
Profesional	2.6	3.4	0.0	5.9	0.0	7.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
Analfabeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	63.7	66.7	81.8	62.5	63.6	46.1	61.7	50.0	75.0	70.0	0.0	46.2	41.7
Casado	18.7	13.3	9.1	6.3	9.1	30.8	17.0	50.0	0.0	20.0	0.0	53.8	41.7
Divorciado	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	11.9	16.7	9.1	31.2	9.1	7.7	12.8	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	8.3
Otro	4.7	3.3	0.0	0.0	18.2	7.7	6.4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	51.4	16.7	38.5	50.0	80.0	33.3	66.6	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	100.0
Medio bajo	42.9	66.6	61.5	40.0	20.0	66.7	26.7	100.0	75.0	100.0	0.0	12.5	0.0
Medio	1.4	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bajo	4.3	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


Características	Global n=195	Mariguana n= 30	Inhalables n=33	Alcohol n=18	Tabaco n= 11	Tranquilizantes n= 13	Cocaína n= 47	Heroína n=2	Cristal n= 4	Rohypnol n= 10	Refractil n=0	D. Médicas* n=13	D. Ilícitas** n=12
Frecuencia actual													
Diario	64.4	45.5	26.3	10.0	75.0	66.6	20.0	100.0	100.0	28.5	0.0	42.9	50.0
2 - 3 veces por semana	8.1	18.2	15.8	20.0	0.0	16.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	11.9	4.5	10.5	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	14.3	0.0	14.2	0.0
1 - 3 veces por mes	14.1	27.3	36.9	70.0	12.5	16.7	36.7	0.0	0.0	42.9	0.0	42.9	50.0
1 - 11 veces por año	1.5	4.5	10.5	0.0	12.5	0.0	6.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	3.7	0.0	3.0	5.9	0.0	0.0	4.3	50.0	0.0	0.0	0.0	7.7	8.3
10 - 14 años	58.3	63.4	72.8	47.1	36.3	38.5	58.8	50.0	100.0	66.7	0.0	30.8	75.0
15 - 19 años	31.1	33.3	24.2	23.5	45.5	46.1	32.6	0.0	0.0	33.3	0.0	46.1	16.7
20 - 24 años	3.7	0.0	0.0	23.5	9.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	1.6	3.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
30 - 34 años	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
35 años o más	1.1	0.0	0.0	0.0	9.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	23.8	20.0	6.1	44.3	45.5	23.1	27.7	0.0	25.0	10.0	0.0	46.1	8.3
Mariguana	27.5	40.0	24.2	22.2	18.2	7.6	31.9	50.0	25.0	40.0	0.0	0.0	41.8
Inhalables	10.9	6.7	18.2	16.7	9.1	0.0	12.8	0.0	25.0	10.0	0.0	0.0	8.3
Alucinógenos	0.5	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	2.6	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	8.3
Tranquilizantes	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	28.5	30.0	45.5	5.6	27.2	38.5	23.4	50.0	0.0	30.0	0.0	23.1	33.3
Antidepresivos	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	7.7	0.0
Otros psicotrópicos	2.1	3.3	3.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

Características	Global n=33	Mariguana n= 2	Inhalables n= 2	Alcohol n= 3	Tabaco n= 0	Tranquilizantes n= 0	Cocaína n= 2	Heroína n= 0	Cristal n= 0	Rohypnol n= 0	Refractil n=0	D. Médicas* n=0	D. Ilícitas** n=0
Sexo													
Masculino	81.3	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Femenino	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad													
14 años o menos	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	33.3	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	21.2	0.0	100.0	66.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escolaridad													
Primaria incompleta	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria completa	9.4	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria incompleta	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria completa	6.1	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Preparatoria incompleta	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Preparatoria completa	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	3.1	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analfabeta	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	58.1	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Casado	16.1	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Divorciado	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	12.9	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	9.7	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	60.5	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por amigos o familia	15.2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación legal	15.2	50.0	0.0	33.4	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación médica	9.1	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 4. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


Características	Global n=33	Mariguana n= 2	Inhalables n=2	Alcohol n= 3	Tabaco n= 0	Tranquilizantes n= 0	Cocaína n=2	Heroína n= 0	Cristal n= 0	Rohypnol n= 0	Refractil n=0	D. Médicas* n=0	D. Ilícitas** n=0
Frecuencia actual													
Diario	75.7	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 - 3 veces por semana	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 3 veces por mes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 11 veces por año	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	57.5	50.0	50.0	66.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	36.4	50.0	50.0	33.3	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	63.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mariguana	9.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inhalables	21.2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 2. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 5. Perfil sociodemográfico de la población que acudió a tratamiento psiquiátrico

<i>Características</i>	<i>General</i>	<i>Neurosis sintomática</i>	<i>Trastorno afectivo</i>	<i>Trastorno psicótico</i>	<i>Trastorno caracterológico</i>	<i>Trastorno mental orgánico</i>
<i>Número</i>	<i>n=151</i>	<i>n=10</i>	<i>n=2</i>	<i>n=13</i>	<i>n=7</i>	<i>n=20</i>
Sexo	Masculino 94.6	Masculino 90.0	Masculino 50.0	Masculino 100.0	Masculino 85.7	Masculino 100.0
Edad	40 y más 32.7	40 y más 40.0	40 y más 50.0	15-19 30.8	40 y más 42.9	15-19 30.0
Escolaridad	Prim. com. 34.5	Prim. com. 40.0	Prim. com. 50.0	Prim. com. 76.9	Prim. com. 57.1	Prim. com. 50.0
Estado civil	Casado 48.3	Soltero 60.0	Casado 50.0	Soltero 69.2	Soltero 57.1	Soltero 75.0
Acudió	Por amigos 92.3	Por amigos 70.0	Voluntario 100.0	Por amigos 76.9	Por amigos 57.1	Por amigos 80.0
Hospitalizado	Sí 42.9	No 100.0		Sí 60.0	No 100.0	Sí 50.0
Cuántas veces	1 a 5 veces 100.0			1 a 5 veces 100.0		1 a 5 veces 100.0

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 6. Porcentaje de consumo de drogas entre la población que acudió a tratamiento psiquiátrico según diagnóstico en las ciudades SISVEA

Características	Total	Neurosis sintomática	Trastorno afectivo	Trastorno psicótico	Trastorno caracterológico	Trastorno mental Orgánico
Número	N = 151	N=10	N=2	N=13	N=7	N=20
Droga de inicio antes de tratamiento						
Alcohol	57.6	100.0	0.0	92.3	0.0	90.0
Mariguana	18.5	20.0	0.0	53.8	0.0	55.0
Inhalables	15.2	10.0	0.0	15.4	14.3	15.0
Cocaína	19.2	40.0	0.0	30.8	28.6	45.0
Heroína	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
Tranquilizantes	9.9	10.0	50.0	0.0	14.3	5.0
Drogas Médicas	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas ilícitas	17.9	10.0	0.0	30.8	14.3	30.0
Droga utilizada durante tratamiento						
Alcohol	6.0	0.0	0.0	7.7	0.0	5.0
Mariguana	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inhalables	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	23.2	20.0	0.0	7.7	28.6	15.0
Drogas médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas ilícitas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de consumo actual						
Alcohol	16.6	60.0	0.0	69.2	42.8	65.0
Mariguana	5.3	10.0	0.0	15.4	14.3	20.0
Inhalables	2.6	10.0	0.0	15.4	14.3	10.0
Cocaína	3.3	10.0	0.0	15.4	14.3	15.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas ilícitas	2.6	10.0	0.0	15.4	14.3	10.0

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 7. Perfil de pacientes que acude a tratamiento psiquiátrico por consumo de drogas

Características	Núm.	Sexo	%	Edad	%	Escolaridad	%	Estado civil	%	Hospita- lizado	%	Tipo de droga	%
Neurosis sintomática													
a) Ansiógena	6	M	100.0	15-19	33.3	Prim. compl.	33.3	Soltero	83.3	No	100.0	Alcohol	100.0
b) Fóbica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Depresiva	1	M	100.0	40 y más	100.0	Prim. Incompl.	100.0	Soltero	100.0	No	100.0	Alcohol	100.0
Trastorno afectivo													
a) U. maniaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Dep. mayor	1	M	100.0	25 - 29	100.0	Sec. Incompl.	100.0	Soltero	100.0	-	-	Alcohol	100.0
c) Bipolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno psicótico													
a) Esquizofrenia	1	M	100.0	40 y más	100.0	Prim. compl.	100.0	Soltero	100.0	No	-	Alcohol	100.0
b) Orgánico	11	M	100.0	15 - 19	100.0	Prim. compl.	72.7	Soltero	72.7	Sí	60	Alcohol	99.9
c) Otro funcional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno caracterológico													
a) Neurótico	3	M	100.0	15 - 19	33.3	Prim. compl.	33.3	Soltero	100.0	Sí	100.0	Alcohol	100.0
b) Límitrofe	1	M	100.0	15 - 19	100.0	Prim. compl.	100.0	Soltero	100.0	No	100.0	Alcohol	100.0
c) Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno mental orgánico													
a) Retardo mental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Traumático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Por sustancias	20	M	100.0	15 - 19	30.0	Prim. compl.	50.0	Soltero	75.0	Sí	50.0	Alcohol	90.0

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998

CUADRO 8. Características demográficas y patrón de consumo en individuos de Alcohólicos Anónimos*

<i>Características</i>		<i>Patrón de Consumo</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Sexo		Edad de inicio	
Masculino	82.9	10 a 14	51.4
Edad		Tipo de bebida	
35-39	77.1	Destilados	51.9
Escolaridad		Frecuencia de Consumo	
Primaria incompleta	47.1	1 a 3 por semana	52.2
Estado civil		Cantidad de consumo	
Casado	72.7	6 a 10 copas	45.0
Acudió		Experiencia con otra droga	
Voluntario	51.4	Sí	17.6
Droga de combinación habitual			
Cocaína	2.9		

* Población total: Individuos

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=35

CUADRO 9. Aspectos relevantes de individuos con consumo habitual de alcohol

<i>Aspectos</i>	<i>Porcentaje</i>
Se ha despertado por las noches sudoroso o tembloroso por falta de alcohol	75.8
Ha estado borracho durante varios días	77.1
Una vez que empieza a tomar, le es difícil detenerse antes de sentirse borracho	85.3
Ha bebido una copa a la mañana siguiente para "curarse la cruda"	80.0
Por estar bebiendo deja de comer	88.2
Ha notado cambios en los hábitos de consumo de alcohol	88.2
Toma siempre igual, sin importar que día de la semana es	88.2
Ha bebido tanto que al día siguiente no puede recordar lo que dijo o hizo	79.4
Ha tenido temblores al dejar de tomar	85.3
Ha dejado de trabajar debido al consumo de alcohol	79.4
Su consumo de bebidas alcohólicas ha interferido en actividades familiares	90.9
Cuando siente la necesidad de una copa, no puede concentrarse en otra cosa	76.5
Tiene problemas para dejar de beber, a pesar de habérselo propuesto	84.8
Ha tratado de reducir el consumo, pero no puede	90.9
Ha tenido que tomar más para sentir los mismos efectos que antes	90.9

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=35

CUADRO 10. Características sociodemográficas de fumadores

<i>Características</i>	<i>Aguascalientes n=10</i>
Sexo	Femenino 70.0
Edad	40 y más 40.0
Estado civil	Casado 60.0
Escolaridad	Lic o posgrado 44.4
Acudió	Voluntaria 100.0
Consumo de otras drogas	Sí 10.0
Drogas que ha probado	Mariguana 10.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 11. Patrón de consumo de fumadores

<i>Características</i>	<i>Aguascalientes n= 10</i>
Edad de inicio	15 a 19 50.0
Edad en la cual fumó 5 o más cigarros	15 a 19 70.0
Frecuencia de consumo	Diario 100.0
Cuantos cigarros fuma al día	16 o más 50.0
Tipo de cigarro	Con filtro 100.0
Le da el golpe al cigarro	Siempre 80.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998

CUADRO 12. Criterios de dependencia en fumadores

<i>Criterios</i>	<i>Aguascalientes n=10</i>
Abstención en lugar prohibido	40.0
Tiempo transcurrido entre despertar y fumar (menos de 5 minutos)	20.0
Fuma más por las mañanas	20.0
Fuma enfermo	30.0
Cuál es el cigarro más difícil de dejar (el primero de la mañana)	40.0
Ha intentado dejar de fumar	60.0

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 13. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias

<i>Influencia de drogas N=3</i>		<i>Uso habitual de drogas N=70</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
30-34	66.7	40 y más	31.4
Sexo		Sexo	
Femenino	66.7	Masculino	72.5
Escolaridad		Escolaridad	
Primaria incompleta	33.3	Primaria completa	24.6
Estado civil		Estado civil	
Casado	100.0	Casado	58.8
Consciente		Consciente	
Sí	33.3	Sí	97.1
Primera vez		Primera vez	
Sí	100.0	Sí	92.3
Destino		Destino	
Alta	33.3	Internamiento	39.7

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

CUADRO 14. Población bajo influjo por patología y drogas

<i>Patologías</i>	<i>Número</i>	<i>Número</i>	<i>Mariguana</i>	<i>Inhalables</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Tabaco</i>	<i>Tranquilizantes</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Heroína</i>	<i>Cristal</i>	<i>Rohypnol</i>	<i>Refractil</i>	<i>D.Médicas*</i>	<i>D.Ilícitas**</i>
		<i>2</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=2</i>	<i>n=0</i>
Bronquitis/enfisema/asma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA de tráquea/bronquios/pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. isquémica del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. cerebrovascular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afección neurológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrosis/gastritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangrado de tubo digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urgencias quirúrgicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicosis alcohólica/drogas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Afección gineco-obstétrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección osteo-muscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección dermatológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes mellitus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

CUADRO 15. Distribución por causa de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Global n=129</i>	<i>Accidentes n=57</i>	<i>Homicidios n=25</i>	<i>Suicidios n=15</i>
Sexo				
Masculino	93.0	96.5	88.0	100.0
Femenino	7.0	3.5	12.0	0.0
Edad				
14 años o menos	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19 años	6.3	8.9	4.0	14.3
20-24 años	15.1	17.9	8.0	35.7
25-29 años	17.5	25.0	16.0	7.1
30-34 años	12.7	12.5	8.0	14.3
35-39 años	7.9	1.8	16.0	0.0
40 o más	40.5	33.9	48.0	28.6
Causa de muerte				
Atropellado	12.5	22.8	12.0	0.0
Choque en vehículo	13.3	24.6	8.0	0.0
Caída	1.6	3.5	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.8	1.8	0.0	0.0
Golpe por objeto	4.7	3.5	12.0	6.7
Asfixia	15.6	10.5	16.0	60.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	5.5	0.0	20.0	13.2
Arma punzocortante	6.3	0.0	24.0	6.7
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	10.9	1.8	0.0	6.7
Envenenado	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	28.8	31.5	8.0	6.7
Lugar				
Tránsito	34.4	55.3	32.0	6.7
Hogar	24.8	3.6	16.0	60.0
Vía pública	21.6	19.6	44.0	6.7
Baños públicos	0.0	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	2.4	3.6	0.0	6.7
Trabajo	2.4	3.6	4.0	0.0
Área de servicio	8.0	8.9	0.0	13.3
Hospital	0.0	0.0	4.0	0.0
Otros	6.4	5.4	0.0	6.6

N = 233

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 16. Distribución de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Alcohol n=121</i>	<i>Opioides n=0</i>	<i>Mariguana n=5</i>
Sexo			
Masculino	92.5	0.0	100.0
Femenino	7.5	0.0	0.0
Edad			
14 años o menos	0.0	0.0	0.0
15-19 años	5.9	0.0	0.0
20-24 años	14.4	0.0	40.0
25-29 años	16.1	0.0	40.0
30-34 años	13.6	0.0	0.0
35-39 años	8.5	0.0	20.0
40 o más	41.5	0.0	0.0
Causa de muerte			
Atropellado	13.3	0.0	0.0
Choque en vehículo	14.2	0.0	0.0
Caída	1.7	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.8	0.0	0.0
Golpe por objeto	4.2	0.0	20.0
Asfixia	14.2	0.0	0.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	5.8	0.0	0.0
Arma punzocortante	5.8	0.0	40.0
Violación	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	11.7	0.0	0.0
Envenenado	0.0	0.0	0.0
Otros	28.3	0.0	40.0
Lugar			
Tránsito	36.7	0.0	0.0
Hogar	23.9	0.0	25.0
Vía pública	22.2	0.0	50.0
Baños públicos	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	0.9	0.0	0.0
Trabajo	2.6	0.0	0.0
Área de servicio	7.7	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0
Otros	6.0	0.0	25.0

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 17. Características sociales y tipo de delito cometido por menores infractores consumidores de drogas

<i>Global</i> N =319 %	<i>Mariguana</i> n =82 %	<i>Inhalables</i> n =89 %	<i>Alcohol</i> n =5 %	<i>Cocaína</i> n =7 %	<i>Tabaco</i> n =3 %	<i>Heroína</i> n =0 %
Masculino 92.2	Masculino 96.3	Masculino 88.8	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 0.0
Primaria incompleta 38.6	Primaria incompleta 37.8	Primaria incompleta 46.1	Primaria incompleta 40.0	Primaria incompleta 42.9	Primaria completa 66.7	Primaria incompleta 0.0
Abandono de escuela Desinterés 66.0	Abandono de escuela Desinterés 74.7	Abandono de escuela Desinterés 68.8	Abandono de escuela Desinterés 100.0	Abandono de escuela Desinterés 50.0	Abandono de escuela Desinterés 50.0	Abandono de escuela Desinterés 0.0
Ninguna 45.3	Ninguna 45.1	Ninguna 57.3	Ninguna 80.0	Subempleado 57.1	Subempleado 66.7	Subempleado 0.0
Usa tatuajes 5.3	Usa tatuajes 0.0	Usa tatuajes 12.5	Usa tatuajes 0.0	Usa tatuajes 0.0	Usa tatuajes 0.0	Usa tatuajes 0.0
Pertenece a banda 6.3	Pertenece a banda 15.9	Pertenece a banda 7.9	Pertenece a banda 0.0	Pertenece a banda 28.6	Pertenece a banda 0.0	Pertenece a banda 0.0
Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia
Extensa 74.0	Extensa 82.7	Extensa 78.2	Extensa 80.0	Nuclear 57.1	Extensa 100.0	Extensa 0.0
Disfuncional 93.3	Disfuncional 96.3	Disfuncional 93.2	Disfuncional 100.0	Disfuncional 71.4	Disfuncional 100.0	Disfuncional 0.0
Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad
Introverso 50.0	Introverso 50.0	Introverso 61.5	Introverso 0.0	Extroverso 100.0	Introverso 0.0	Introverso 0.0
Independiente 50.7	Independiente 64.2	Independiente 57.6	Dependiente 75.0	Dependiente 50.0	Independiente 66.7	Dependiente 0.0
Antisociable 52.7	Antisociable 67.2	Antisociable 53.4	Antisociable 100.0	Antisociable 75.0	Antisociable 100.0	Sociable 0.0
Agresivo 57.3	Agresivo 68.2	Agresivo 65.5	Pasivo 66.7	Pasivo 60.0	Agresivo 66.7	Agresivo 0.0
Ansioso 60.2	Ansioso 70.7	Ansioso 58.4	Ansioso 60.0	Ansioso 42.9	Ansioso 33.3	Ansioso 0.0
Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo
Diario 50.6	Diario 50.6	Diario 43.5	1 por semana 60.0	1 a 3 veces al mes 60.0	Diario 66.7	Diario 0.0
Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio
10 a 14 55.7	10 a 14 55.7	10 a 14 88.5	10 a 14 80.0	15 a 18 66.7	10 a 14 100.0	10 a 14 0.0
Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos
1 vez 73.3	1 vez 56.8	1 vez 58.4	1 vez 50.0	1 vez 42.9	1 vez 100.0	1 vez 0.0
Uso de arma	Uso de arma	Uso de arma	Uso de arma	Uso de arma	Uso de arma	Uso de arma
5.3	3.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma
Fuego 56.3	Fuego 66.7	Punzo-cortante 60.0	Fuego 0.0	Fuego 0.0	Fuego 0.0	Fuego 0.0
Delito bajo efecto	Delito bajo efecto	Delito bajo efecto	Delito bajo efecto	Delito bajo efecto	Delito bajo efecto	Delito bajo efecto
26.6	32.9	59.6	60.0	50.0	100.0	0.0
Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes
Robo 34.8	Robo 19.5	Robo 18.0	Robo 60.0	Robo 14.3	Robo 66.7	Robo 0.0
Contra la salud 19.7	Contra la salud 58.5	Consumo/drogas 57.3	Consumo/drogas 20.0	Contra la salud 71.4	Contra la salud 0.0	Portación de arma 0.0
Consumo/drogas 19.4	Consumo/drogas 11.0	Contra la salud 11.2	Contra la salud 20.0	Consumo/drogas 14.3	Consumo/drogas 0.0	Consumo/drogas 0.0
Lesiones 3.8	Lesiones 3.7	Lesiones 4.5	Otros 20.0	Lesiones 0.0	Otros 33.3	Lesiones 0.0

FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n=118	Mariguana n= 13	Inhalables n= 4	Alcohol n= 10	Tabaco n= 0	Tranquilizantes n= 8	Cocaína n=44	Heroína n= 19	Cristal n= 8	Rohypnol n= 2	Refractil n=0	D. Médicas* n=7	D. Ilícitas** n=2
Sexo													
Masculino	91.5	76.9	75.0	90.0	0.0	87.5	93.2	100.0	100.0	100.0	0.0	85.7	100.0
Femenino	8.5	23.1	25.0	10.0	0.0	12.5	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
Edad													
14 años o menos	7.6	7.7	25.0	30.0	0.0	25.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
15 - 19 años	31.4	61.5	50.0	10.0	0.0	62.5	15.9	31.5	37.5	100.0	0.0	42.8	0.0
20 - 24 años	22.9	7.7	0.0	0.0	0.0	12.5	36.4	31.6	12.5	0.0	0.0	14.3	50.0
25 - 29 años	25.4	15.4	25.0	50.0	0.0	0.0	29.5	26.3	37.5	0.0	0.0	14.3	0.0
30 - 34 años	6.8	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	9.1	5.3	12.5	0.0	0.0	0.0	50.0
35 años o más	5.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	5.3	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
Escolaridad													
Primaria	23.6	0.0	75.0	33.3	0.0	12.5	24.4	36.8	12.5	0.0	0.0	28.6	0.0
Secundaria	43.9	46.2	25.0	44.4	0.0	75.0	41.5	47.4	25.0	50.0	0.0	57.1	0.0
Preparatoria	23.7	30.7	0.0	11.1	0.0	12.5	26.8	15.8	62.5	0.0	0.0	0.0	100.0
Técnico	3.5	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	4.4	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
Analfabeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	62.9	84.6	50.0	40.0	0.0	100.0	51.2	77.8	50.0	100.0	0.0	71.4	50.0
Casado	18.2	15.4	0.0	10.0	0.0	0.0	32.5	5.6	0.0	0.0	0.0	14.3	50.0
Divorciado	1.7	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	11.2	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	11.6	5.6	37.5	0.0	0.0	14.3	0.0
Otro	6.0	0.0	25.0	20.0	0.0	0.0	4.7	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medio bajo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bajo	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


Características	Global n=118	Mariguana n= 13	Inhalables n= 4	Alcohol n= 10	Tabaco n=0	Tranquilizantes n= 8	Cocaína n= 44	Heroína n= 19	Cristal n=8	Rohypnol n= 2	Refractil n=0	D. Médicas* n=7	D. Ilícitas** n=2
Frecuencia actual													
Diario	45.7	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	84.6	40.0	0.0	0.0	50.0	0.0
2 - 3 veces por semana	15.2	40.0	66.7	25.0	0.0	33.3	5.9	7.7	20.0	0.0	0.0	25.0	0.0
1 vez por semana	22.8	0.0	33.3	25.0	0.0	66.7	32.4	0.0	20.0	0.0	0.0	25.0	0.0
1 - 3 veces por mes	14.1	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	35.3	7.7	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 11 veces por año	2.2	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	38.2	20.0	100.0	55.6	0.0	42.9	25.0	47.4	75.0	0.0	0.0	42.9	0.0
15 - 19 años	52.7	80.0	0.0	0.0	0.0	57.1	68.2	42.1	25.0	100.0	0.0	42.9	100.0
20 - 24 años	6.4	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	6.8	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	1.8	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0
30 - 34 años	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	33.3	38.5	25.0	10.0	0.0	12.5	50.0	10.5	50.0	50.0	0.0	14.3	50.0
Mariguana	47.9	30.7	75.0	50.0	0.0	75.0	34.0	73.6	37.5	50.0	0.0	57.1	50.0
Inhalables	1.7	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	11.1	15.4	0.0	20.0	0.0	0.0	11.4	5.3	12.5	0.0	0.0	28.6	0.0
Tranquilizantes	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	0.9	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

• Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

• ** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

Características	Global n=55	Mariguana n= 27	Inhalables n= 0	Alcohol n=18	Tabaco n= 2	Tranquilizantes n=2	Cocaína n= 3	Heroína n= 0	Cristal n= 2	Rohypnol n=0	Refractil n=0	D. Médicas* n=0	D. Ilícitas** n=1
Sexo													
Masculino	96.4	96.3	0.0	100.0	100.0	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Femenino	3.6	3.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad													
14 años o menos	5.6	3.8	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
15 - 19 años	23.6	29.6	0.0	5.6	50.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	20.0	14.8	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	23.6	29.6	0.0	16.7	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	12.7	18.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	14.5	3.7	0.0	33.2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escolaridad													
Primaria incompleta	12.7	7.5	0.0	11.0	0.0	50.0	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria completa	10.9	3.7	0.0	16.7	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria incompleta	21.8	33.3	0.0	5.6	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria completa	20.0	14.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Preparatoria incompleta	25.5	33.3	0.0	16.7	0.0	50.0	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Preparatoria completa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	9.1	7.4	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analfabeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	54.5	59.3	0.0	44.4	50.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Casado	32.7	22.2	0.0	50.0	50.0	0.0	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Divorciado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	7.3	11.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	5.5	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	79.6	80.8	0.0	77.7	50.0	100.0	66.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Por amigos o familia	13.0	15.4	0.0	5.6	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación legal	7.4	3.8	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación médica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.
- ** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 4. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


Características	Global n=55	Mariguana n= 27	Inhalables n= 0	Alcohol n=18	Tabaco n= 2	Tranquilizantes n=2	Cocaína n=3	Heroína n=0	Cristal n=2	Rohypnol n= 0	Refracto n=0	D. Médicas* n=0	D. Ilícitas** n=1
Frecuencia actual													
Diario	54.6	100.0	0.0	22.2	100.0	0.0	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-3 veces por semana	16.4	0.0	0.0	27.8	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	14.5	0.0	0.0	22.2	0.0	50.0	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1-3 veces por mes	1.8	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1- 11 veces por año	12.7	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Edad de inicio													
9 años o menos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	40.0	40.7	0.0	38.9	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
15 - 19 años	49.1	51.9	0.0	50.0	0.0	100.0	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	5.5	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	33.4	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	3.6	3.7	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	1.8	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	32.8	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mariguana	49.1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inhalables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	3.6	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 2. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales, 1998.

Secretaría de Salud
Culiacán
 Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
 Informe 1998

CUADRO 5. Perfil sociodemográfico de la población que acudió a tratamiento psiquiátrico

<i>Características</i> <i>Número</i>	<i>General</i> <i>n =234</i>	<i>Neurosis</i> <i>sintomática</i> <i>n =88</i>	<i>Trastorno</i> <i>afectivo</i> <i>n =13</i>	<i>Trastorno</i> <i>psicótico</i> <i>n =4</i>	<i>Trastorno</i> <i>caracterológico</i> <i>n =23</i>	<i>Trastorno</i> <i>mental orgánico</i> <i>n =104</i>
Sexo	Masculino 94.9	Masculino 93.9	Masculino 91.7	Masculino 100.0	Masculino 81.0	Masculino 92.4
Edad	20-24 23.7	20-24 23.8	20-24 38.5	20-24 50.0	20-24 30.4	20-24 29.4
Escolaridad	Sec. incom 21.8	Sec. incom 25.3	Prepa. incom 41.7	Sec. incom 50.0	Sec. incom 30.4	Sec. incom 22.8
Estado civil	Soltero 52.9	Soltero 45.9	Soltero 30.8	Casado 50.0	Soltero 69.6	Soltero 60.8
Acudió	Volumen 68.7	Volumen 69.3	Volumen 70.0	Volumen 75.0	Volumen 82.6	Volumen 67.0
Hospitalizado	Sí 3.2	Sí 5.7	Sí 11.1	Sí 33.3	Sí 0.0	Sí 2.1
Frecuencia	1 a 5 veces 100.0	1 a 5 veces 100.0	1 a 5 veces 100.0	1 a 5 veces 100.0		

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998

CUADRO 6. Porcentaje de consumo de drogas entre la población que acudió a tratamiento psiquiátrico según diagnóstico en las ciudades SISVEA

<i>Características</i>	<i>Total</i>	<i>Neurosis</i>	<i>Trastorno</i>	<i>Trastorno</i>	<i>Trastorno</i>	<i>Trastorno</i>
<i>Número</i>	<i>n=234</i>	<i>sintomática</i>	<i>afectivo</i>	<i>psicótico</i>	<i>caracterológico</i>	<i>mental orgánico</i>
	%	n=88	n=13	n=4	n=23	n=104
	%	%	%	%	%	%
Droga utilizada antes de tratamiento						
Alcohol	49.6	48.9	61.5	50.0	60.9	51.0
Mariguana	59.8	54.5	53.8	75.0	69.6	60.6
Inhalables	12.4	8.0	7.7	25.0	21.7	16.3
Cocaína	71.8	72.7	84.6	100.0	73.9	73.1
Heroína	22.2	21.6	7.7	25.0	13.0	23.1
Tranquilizantes	24.8	30.7	23.1	0.0	13.0	28.8
Drogas médicas	4.3	2.3	7.7	25.0	8.7	4.8
Drogas ilícitas	11.1	9.1	7.7	0.0	21.7	11.5
Droga utilizada durante tratamiento						
Alcohol	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0
Mariguana	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inhalables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas ilícitas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de consumo actual						
Alcohol	41.9	40.9	46.2	25.0	39.1	39.4
Mariguana	37.6	36.4	30.8	50.0	34.8	40.4
Inhalables	4.7	1.1	0.0	0.0	8.7	3.8
Cocaína	45.3	44.3	46.2	75.0	47.8	40.1
Heroína	22.2	22.7	7.7	25.0	17.4	23.1
Tranquilizantes	12.4	19.3	15.4	0.0	4.3	13.5
Drogas médicas	3.8	2.3	7.7	25.0	4.3	4.8
Drogas ilícitas	5.1	2.3	0.0	25.0	17.4	7.7

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

Secretaría de Salud
Culiacán
 Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
 Informe 1998

CUADRO 7. Perfil de pacientes que acude a tratamiento psiquiátrico por consumo de drogas

Características	Núm.	Sexo	%	Edad	%	Escolaridad	%	Estado civil	%	Hospita- lizado	%	Tipo de droga	%
Neurosis sintomática													
a) Ansiógena	26	M	91.3	20 - 24	36.0	Sec. comp.	30.8	Soltero	60.0	Sí	5.3	Cocaína	73.1
b) Fóbica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Depresiva	11	M	88.9	40 y más	36.4	Prim. com.	27.3	Soltero	63.6	Sí	0.0	Cocaína	72.7
Trastorno afectivo													
a) U. maniaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Dep. mayor	2	M	100.0	20 - 24	100.0	Prim. comp	50.0	Soltero	100.0	Sí	0.0	Cocaína	100.0
c) Bipolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno psicótico													
a) Esquizofrenia	1	M	100.0	20 - 24	100.0	Prep. com	100.0	U.L.	100.0	Sí	0.0	Cocaína	100.0
b) Orgánico	1	M	100.0	40 y más	100.0	Sec. incom	100.0	Casado	100.0	Sí	0.0	Cocaína	100.0
c) Otro funcional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno caracterológico													
a) Neurótico	8	M	85.7	25 - 29	25.0	Sec. Com	37.5	Soltero	62.5	Sí	0.0	Alcohol	87.5
b) Limítrofe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno mental orgánico													
a) Retardo mental	3	M	100.0	25 - 29	33.4	Prim incom	33.5	Soltero	66.7	Sí	0.0	Alcohol	100.0
b) Traumático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Por sustancias	103	M	92.3	20 - 24	29.7	Sec. incom.	23.0	Soltero	60.4	Sí	2.2	Cocaína	72.8

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 8. Características sociodemográficas de fumadores

<i>Características</i>	<i>Culiacán n= 31</i>
Sexo	Femenino 54.8
Edad	40 y más 38.7
Estado civil	Casado 64.5
Escolaridad	Lic o posgrado 51.6
Acudió	Voluntaria 87.1
Consumo de otras drogas	Sí 12.9
Drogas que ha probado	Mariguana 9.7

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 9. Patrón de consumo de fumadores

<i>Características</i>	<i>Culiacán n=31</i>
Edad de inicio	15 a 19 35.5
Edad en la cual fumó 5 o más cigarros	15 a 19 41.9
Frecuencia de consumo	Diario 66.7
Cuantos cigarros fuma al día	1 a 5 46.7
Tipo de cigarro	Con filtro 87.5
Le da el golpe al cigarro	Siempre 54.8

CUADRO 10. Criterios de dependencia en fumadores

<i>Criterios</i>	<i>Culiacán n=31</i>
Abstención en lugar prohibido	16.1
Tiempo transcurrido entre despertar y fumar (menos de 5 minutos)	10.3
Fuma más por las mañanas	29.0
Fuma enfermo	19.4
Cuál es el cigarro más difícil de dejar (el primero de la mañana)	22.6
Ha intentado dejar de fumar	80.6

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 11. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias

<i>Influencia de drogas N=4</i>		<i>Uso habitual de drogas N=41</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
15 a 19	50.0	40 y más	43.6
Sexo		Sexo	
Masculino	75.0	Masculino	80.5
Escolaridad		Escolaridad	
Primaria completa	50.0	Primaria incompleta	32.5
Estado civil		Estado civil	
Soltero	50.0	Casado	62.5
Consciente		Consciente	
Sí	75.0	Sí	89.7
Primera vez		Primera vez	
Sí	75.0	Sí	83.3
Destino		Destino	
Observación	25.0	Alta	38.5

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998

CUADRO 12. Población bajo influjo por patología y drogas


Patologías	Número	Número	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Cocaína	Heroína	Cristal	Rohypnol	Refractil	D.Médicas*	D.Ilícitas**
		6	N=0	n=0	n=3	n=0	n=2	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=1
Bronquitis/enfisema/asma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA de Tráquea/bronquios/pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. isquémica del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. cerebrovascular	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afección neurológica	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrosis/gastritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangrado de tubo digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urgencias quirúrgicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicosis alcohólica/drogas	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección gineco-obstétrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección osteo-muscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección dermatológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

GRÁFICA 1. Lesiones asociadas al consumo de drogas



Nota: sólo se mencionan las más frecuentes

CUADRO 13. Distribución por causa de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Global n=32</i>	<i>Accidentes n=11</i>	<i>Homicidios n=11</i>	<i>Suicidios n=5</i>
Sexo				
Masculino	93.3	90.9	88.9	100.0
Femenino	6.7	9.1	11.1	0.0
Edad				
14 años o menos	6.3	9.1	9.1	0.0
15-19 años	12.5	18.2	9.1	0
20-24 años	12.5	0.0	27.3	20.0
25-29 años	12.5	0.0	9.1	20.0
30-34 años	18.7	9.1	27.2	20.0
35-39 años	12.5	9.1	18.2	20.0
40 o más	25.0	54.5	0.0	20.
Causa de muerte				
Atropellado	9.7	18.2	0.0	0.0
Choque en vehículo	12.9	27.3	10.0	0.0
Caída	0.0	0.0	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	3.2	0.0	10.0	0.0
Asfixia	22.6	36.3	0.0	60.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	38.7	9.1	70.0	40.0
Arma punzocortante	3.2	0.0	0.0	0.0
Violación	0.0	0.0	10.0	0.0
Intoxicado	6.5	0.0	0.0	0.0
Envenenado	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	3.2	9.1	0.0	0.0
Lugar				
Tránsito	3.2	9.1	0.0	0.0
Hogar	19.4	0.0	0.0	80.0
Vía pública	67.7	63.6	100.0	20.0
Baños públicos	0.0	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	3.2	9.1	0.0	0.0
Trabajo	0.0	0.0	0.0	0.0
Área de servicio	0.0	0.0	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	6.5	18.2	0.0	0.0

N= 232

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 14. Distribución de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Alcohol n=31</i>	<i>Opioides n=1</i>	<i>Mariguana n=1</i>
Sexo			
Masculino	93.1	100.0	100.0
Femenino	6.9	0.0	0.0
Edad			
14 años o menos	6.5	0.0	0.0
15-19 años	9.7	100.0	100.0
20-24 años	12.9	0.0	0.0
25-29 años	12.9	0.0	0.0
30-34 años	19.4	0.0	0.0
35-39 años	12.9	0.0	0.0
40 o más	25.7	0.0	0.0
Causa de muerte			
Atropellado	10.1	0.0	0.0
Choque en vehículo	13.3	0.0	0.0
Caída	0.0	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	3.3	0.0	0.0
Asfixia	23.3	0.0	0.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	40.1	0.0	0.0
Arma punzocortante	3.3	0.0	0.0
Violación	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	3.3	100.0	100.0
Envenenado	0.0	0.0	0.0
Otros	3.3	0.0	0.0
Lugar			
Tránsito	3.3	0.0	0.0
Hogar	16.7	100.0	100.0
Vía pública	70.0	0.0	0.0
Baños públicos	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	3.3	0.0	0.0
Trabajo	0.0	0.0	0.0
Área de servicio	0.0	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0
Otros	6.7	0.0	0.0

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

Secretaría de Salud
Culiacán
 Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
 Informe 1998

CUADRO 15. Características sociales y tipo de delito cometido por menores infractores consumidores de drogas

<i>Global</i> N =184 %	<i>Mariguana</i> n =66 %	<i>Inhalables</i> n =9 %	<i>Alcohol</i> n =1 %	<i>Cocaína</i> n =13 %	<i>Tabaco</i> n =5 %	<i>Heroína</i> n =11 %
Masculino 97.8	Masculino 96.9	Masculino 88.9	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0
Primaria incompleta 31.0	Primaria incompleta 28.8	Primaria incompleta 33.3	Primaria completa 100.0	Primaria incompleta 38.5	Primaria completa 60.0	Primaria incompleta 36.4
Abandono de escuela Desinterés 43.3	Abandono de escuela Desinterés 45.5	Abandono de escuela Desinterés 33.3	Abandono de escuela Trabajo 100.0	Abandono de escuela Desinterés 80.0	Abandono de escuela Desinterés 45.5	Abandono de escuela Desinterés 45.5
Subempleado 29.7	Ninguna 39.4	Subempleado 44.4	Subempleado 100.0	Ninguna 38.5	Subempleado 80.0	Ninguna 54.5
Usa tatuajes 28.0	Usa tatuajes 57.6	Usa tatuajes 66.7	Usa tatuajes 100.0	Usa tatuajes 53.8	Usa tatuajes 40.0	Usa tatuajes 63.6
Pertenece a banda 2.2	Pertenece a banda 4.5	Pertenece a banda	Pertenece a banda 100.0	Pertenece a banda 7.7	Pertenece a banda	Pertenece a banda
Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia
Extensa 72.9	Extensa 76.4	Extensa 88.9	Extensa 100.0	Nuclear 72.7	Extensa 100.0	Nuclear 50.0
Funcional 64.5	Funcional 51.7	Funcional 55.6	Funcional 100.0	Disfuncional 77.8	Disfuncional 75.0	Funcional 80.0
Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad
Introvertido 88.7	Introvertido 89.7	Introvertido 83.3	Introvertido 100.0	Introvertido 87.5	Introvertido 100.0	Introvertido 90.9
Dependiente 70.9	Dependiente 61.3	Dependiente 55.6	Dependiente 100.0	Independiente 80.0	Dependiente 80.0	Dependiente 100.0
Sociable 86.3	Sociable 74.4	Sociable 75.0	Sociable 100.0	Sociable 100.0	Sociable 80.0	Sociable 81.8
Pasivo 83.7	Pasivo 75.0	Agresivo 57.1	Pasivo 100.0	Pasivo 100.0	Pasivo 60.0	Pasivo 90.0
Ansioso 1.6	Ansioso 4.5	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 9.1
Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo
Diario 85.9	Diario 85.9	1 a 3 veces al mes 57.1	Diario 100.0	Diario 38.5	Diario 100.0	Diario 54.5
Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio
15 a 18 51.5	15 a 18 51.5	15 a 18 77.8	15 a 18 100.0	15 a 18 83.3	10 a 14 80.0	15 a 18 81.8
Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos
1 vez 63.6	1 vez 56.1	1 vez 55.6	2-4 veces 100.0	1 vez 61.5	1 vez 80.0	2-4 veces 54.5
Uso de arma 29.2	Uso de arma 33.8	Uso de arma 55.6	Uso de arma 100.0	Uso de arma 33.3	Uso de arma 100.0	Uso de arma 54.5
Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma
Fuego 57.1	Punzo-cortante 57.1	Punzo-cortante 60.0	Fuego 100.0	Punzo-cortante 75.0	Punzo-cortante 100.0	Punzo-cortante 60.0
Delito bajo efecto 85.1	Delito bajo efecto 33.3	Delito bajo efecto 55.6	Delito bajo efecto 100.0	Delito bajo efecto 38.5	Delito bajo efecto 20.0	Delito bajo efecto 54.5
Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes
Robo 66.3	Robo 66.7	Robo 77.8	Robo 100.0	Robo 46.2	Robo 80.0	Robo 72.7
Contra la salud 11.4	Contra la salud 15.2	Secuestro 11.1	Contra la salud 0.0	Contra la salud 38.5	Contra la salud 20.0	Contra la salud 9.1
Portacion de arma 10.9	Portacion de arma 12.1	Contra la salud 11.1		Portación de arma 7.7	Portacion de arma 0.0	Portacion de arma 18.2
Violacion 3.3	Con / Dogas 3.0	Lesiones 11.1	Daños 0.0	Lesiones 0.0	Daños 0.0	Consumo/drogas 0.0

FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n=177	Mariguana n= 18	Inhalables n=12	Alcohol n= 22	Tabaco n= 0	Tranquilizantes n= 14	Cocaína n= 62	Heroína n= 34	Cristal n= 1	Rohypnol n= 7	Refractil n=0	D. Médicas* n=1	D. Ilícitas** n=6
Sexo													
Masculino	94.3	100.0	100.0	100.0	0.0	85.7	90.3	97.1	100.0	100.0	0.0	100.0	83.3
Femenino	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	9.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
Edad													
14 años o menos	7.9	11.1	25.0	22.7	0.0	14.3	1.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	30.5	61.1	75.0	27.3	0.0	21.4	25.8	14.8	0.0	14.3	0.0	0.0	50.0
20 - 24 años	22.1	5.6	0.0	36.4	0.0	14.3	29.0	20.6	0.0	42.8	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	16.9	22.2	0.0	4.5	0.0	7.1	21.0	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
30 - 34 años	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	9.7	17.6	100.0	28.6	0.0	100.0	16.7
35 años o más	11.9	0.0	0.0	9.1	0.0	28.6	12.9	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6
Escolaridad													
Primaria	32.0	50.0	41.7	38.0	0.0	15.4	16.2	55.9	0.0	28.6	0.0	0.0	16.7
Secundaria	41.1	27.6	50.0	52.4	0.0	53.8	46.8	26.5	0.0	42.8	0.0	100.0	16.7
Preparatoria	12.0	5.6	0.0	4.8	0.0	7.7	17.7	8.8	0.0	28.6	0.0	0.0	33.2
Técnico	10.3	5.6	8.3	0.0	0.0	15.4	14.5	8.8	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7
Profesional	4.0	5.6	0.0	4.8	0.0	7.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
Analfabeta	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	62.5	77.7	91.7	68.3	0.0	57.2	57.4	44.1	0.0	85.7	0.0	100.0	83.3
Casado	19.3	16.7	0.0	13.6	0.0	14.3	27.9	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Divorciado	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	11.4	5.6	8.3	13.6	0.0	7.1	8.2	20.6	100.0	14.3	0.0	0.0	16.7
Otro	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	7.1	4.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medio bajo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bajo	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


	Global	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Cocaína	Heroína	Cristal	Rohypnol	Refractil	D. Médicas*	D. Ilícitas**
Características	n=177	n= 18	n= 12	n= 22	n= 0	n= 14	n= 62	n= 34	n= 1	n= 7	n=0	n=1	n=6
Frecuencia actual													
Diario	40.9	54.5	20.0	7.1	0.0	20.0	27.5	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 - 3 veces por semana	10.2	27.3	0.0	14.3	0.0	0.0	10.0	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	31.4	9.1	40.0	57.2	0.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 3 veces por mes	16.8	9.1	20.0	21.4	0.0	40.0	20.0	3.6	0.0	66.7	0.0	0.0	100.0
1 - 11 veces por año	0.7	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	3.4	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	1.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
10 - 14 años	46.6	47.1	83.3	40.9	0.0	35.7	38.7	47.1	100.0	57.1	0.0	100.0	66.7
15 - 19 años	43.8	47.1	16.7	40.9	0.0	57.2	48.4	47.1	0.0	42.9	0.0	0.0	16.6
20 - 24 años	4.5	5.8	0.0	4.5	0.0	7.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	0.6	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	37.3	55.5	41.7	9.2	0.0	21.4	51.6	23.6	100.0	14.3	0.0	0.0	66.7
Mariguana	35.0	16.7	41.7	45.5	0.0	50.1	32.3	38.2	0.0	57.1	0.0	0.0	0.0
Inhalables	16.4	5.6	8.3	31.8	0.0	7.1	6.5	32.4	0.0	28.6	0.0	100.0	16.7
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	1.1	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	2.3	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	5.1	22.2	8.3	4.5	0.0	0.0	1.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil ofeno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

• Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

• ** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n=6730	Mariguana n= 957	Inhalables n= 998	Alcohol n= 524	Tabaco n= 163	Tranquilizantes n= 183	Cocaína n= 3058	Heroína n= 49	Cristal n= 32	Rohypnol n= 199	Refractil n=25	D. Médicas* n=97	D. Ilícitas** n=390
Sexo													
Masculino	88.6	86.7	85.6	85.3	87.1	75.4	92.5	91.8	81.3	92.5	64.0	78.4	84.3
Femenino	11.4	13.3	14.4	14.7	12.9	24.6	7.5	8.2	18.7	7.5	36.0	21.6	15.7
Edad													
14 años o menos	7.4	7.4	23.2	9.0	14.1	4.9	2.6	2.0	3.1	4.0	16.0	6.1	2.8
15 - 19 años	32.8	39.7	45.2	38.8	41.1	33.9	25.6	24.5	25.0	24.1	40.0	22.7	34.7
20 - 24 años	25.8	25.6	15.8	19.5	19.0	20.2	30.0	32.6	40.6	30.7	32.0	26.8	29.0
25 - 29 años	16.7	10.9	7.5	14.1	12.3	15.3	22.1	24.5	28.1	24.1	8.0	15.5	14.7
30 - 34 años	9.5	8.0	4.2	9.4	9.8	9.3	12.0	6.2	3.2	7.0	4.0	13.4	10.0
35 años o más	7.8	8.4	4.1	9.2	3.7	16.4	7.7	10.2	0.0	10.1	0.0	15.5	8.8
Escolaridad													
Primaria	14.7	19.2	18.7	15.6	12.7	13.3	12.4	6.5	3.1	18.1	8.0	9.3	14.0
Secundaria	50.7	48.4	61.8	52.4	53.8	45.0	49.3	54.3	25.0	45.7	64.0	41.2	45.0
Preparatoria	25.0	24.5	13.5	23.7	23.4	25.0	27.7	19.6	59.4	28.6	28.0	28.9	29.5
Técnico	4.6	3.6	3.5	3.3	5.7	10.6	4.8	8.7	3.1	4.5	0.0	9.3	6.2
Profesional	4.7	3.9	1.8	4.6	4.4	6.1	5.6	10.9	9.4	3.1	0.0	11.3	5.3
Analfabeta	0.2	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	67.6	72.3	84.0	69.8	77.1	67.7	59.2	76.1	80.6	67.5	84.0	61.5	70.7
Casado	19.0	15.7	7.2	17.3	9.9	18.7	25.3	15.2	16.1	17.8	8.0	26.0	15.3
Divorciado	1.0	0.7	0.4	1.2	2.5	1.6	1.3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5
Viudo	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Unión libre	8.4	8.1	5.6	7.4	8.0	7.1	9.8	6.5	3.3	8.1	4.0	8.3	7.8
Otro	3.9	3.1	2.8	3.9	2.5	4.9	4.3	2.2	0.0	4.1	4.0	4.2	5.7
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	15.7	15.0	11.3	15.2	10.2	22.8	16.8	15.4	0.0	18.8	10.0	28.2	16.5
Medio bajo	60.7	58.2	63.7	55.6	59.3	50.9	62.4	46.1	71.4	58.0	70.0	43.6	63.1
Medio	9.0	10.0	6.4	10.7	11.9	8.8	8.6	23.1	28.6	7.3	10.0	20.5	7.8
Bajo	14.6	16.8	18.6	18.5	18.6	17.5	12.2	15.4	0.0	15.9	10.0	7.7	12.6
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


Características	Global n=6730	Mariguana n= 957	Inhalables n= 998	Alcohol n= 524	Tabaco n= 163	Tranquilizantes n= 183	Cocaína n= 3058	Heroína n= 49	Cristal n= 32	Rohypnol n= 199	Refractil n=25	D. Médicas* n=97	D. Ilícitas** n=390
Frecuencia actual													
Diario	41.5	43.9	29.7	12.8	64.1	43.1	36.0	50.0	14.3	34.3	63.6	55.7	29.9
2 - 3 veces por semana	10.9	11.9	13.9	6.4	8.5	14.8	17.0	11.1	0.0	8.3	9.1	6.6	7.2
1 vez por semana	21.6	13.7	19.0	31.2	10.4	5.7	22.6	0.0	14.3	20.4	9.1	8.2	9.7
1 - 3 veces por mes	22.4	25.2	28.2	44.3	15.1	23.9	20.8	33.3	21.4	28.7	9.1	23.0	38.3
1 - 11 veces por año	3.6	5.3	9.2	5.3	1.9	12.5	3.6	5.6	50.0	8.3	9.1	6.5	14.9
Edad de inicio													
9 años o menos	2.2	2.3	1.7	2.3	5.8	1.7	1.9	2.0	0.0	1.0	4.2	3.2	4.4
10 - 14 años	38.2	36.7	52.3	38.8	40.6	44.6	32.1	53.1	70.0	43.5	50.0	40.0	42.8
15 - 19 años	48.3	50.3	41.5	45.4	46.5	34.5	52.1	32.7	26.7	47.7	37.5	43.2	45.8
20 - 24 años	7.5	8.1	3.1	7.8	4.5	6.8	9.5	10.2	3.3	3.6	8.3	4.2	4.1
25 - 29 años	2.2	1.8	0.9	2.3	1.3	4.5	2.6	2.0	0.0	2.6	0.0	5.3	2.2
30 - 34 años	1.0	0.7	0.4	1.5	1.3	2.8	1.2	0.0	0.0	1.6	0.0	2.1	0.3
35 años o más	0.6	0.1	0.1	1.9	0.0	5.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4
Droga de inicio													
Alcohol	27.2	28.0	18.2	19.7	30.7	30.7	30.9	24.6	40.6	31.1	8.0	26.9	24.0
Mariguana	26.0	29.3	21.4	24.4	19.0	20.2	25.8	36.8	34.4	31.7	20.0	28.9	35.1
Inhalables	19.3	18.9	44.8	17.0	25.2	16.4	12.7	6.1	0.0	15.6	24.0	3.1	17.2
Alucinógenos	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Heroína	0.1	0.3	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3
Opio-morfina y deriv.	0.2	0.1	0.1	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.1	0.0
Cocaína	15.4	12.5	5.4	24.1	16.0	3.3	20.4	10.2	18.8	11.6	0.0	7.2	7.7
Tranquilizantes	1.0	0.4	0.3	1.0	0.6	18.0	0.3	2.0	0.0	0.5	8.0	2.1	1.0
Barbitúricos	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
Anfetaminas	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Tabaco	8.2	9.2	7.7	10.9	3.1	7.7	8.1	10.2	3.1	6.5	12.0	9.3	6.2
Antidepresivos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
Otros psicotrópicos	0.9	0.2	1.2	0.4	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	3.1	0.0	0.0	1.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.5	0.3	0.2	1.1	1.2	0.5	0.5	2.0	0.0	2.0	4.0	1.0	0.3
Crack	0.2	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Refractil ofteno	0.3	0.3	0.4	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.5	24.0	0.0	0.5

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

<i>Características</i>	<i>Global n=1385</i>	<i>Mariguana n= 128</i>	<i>Inhalables n= 103</i>	<i>Alcohol n= 265</i>	<i>Tabaco n= 24</i>	<i>Tranquilizantes n= 11</i>	<i>Cocaína n= 523</i>	<i>Heroína n= 17</i>	<i>Cristal n= 2</i>	<i>Rohypnol n= 9</i>	<i>Refractil n=0</i>	<i>D. Médicas* n=32</i>	<i>D. Ilícitas** n=37</i>
Sexo													
Masculino	86.4	91.4	95.1	79.6	66.7	54.5	91.0	76.5	100.0	88.9	0.0	53.1	81.1
Femenino	13.6	8.6	4.9	20.4	33.3	45.5	9.0	23.5	0.0	11.1	0.0	46.9	18.9
Edad													
14 años o menos	4.6	0.8	12.7	3.2	33.3	9.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
15 - 19 años	23.3	36.8	38.2	9.8	45.8	0.0	21.3	11.7	50.0	0.0	0.0	3.1	27.0
20 - 24 años	20.5	23.4	27.5	9.8	4.2	9.1	22.5	47.1	50.0	55.6	0.0	15.6	16.2
25 - 29 años	13.8	12.5	9.8	9.8	4.2	18.2	18.8	11.8	0.0	22.2	0.0	3.1	18.9
30 - 34 años	14.6	15.6	5.9	11.7	8.3	18.2	20.2	5.9	0.0	11.1	0.0	12.5	8.1
35 años o más	23.2	10.9	5.9	55.7	4.2	45.5	15.9	23.5	0.0	11.1	0.0	65.7	18.9
Escolaridad													
Primaria incompleta	5.5	3.1	12.0	5.3	8.3	0.0	3.1	17.6	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0
Primaria completa	10.6	9.4	16.0	8.8	12.5	0.0	8.6	17.6	0.0	33.3	0.0	0.0	8.3
Secundaria incompleta	19.1	21.1	37.0	11.1	33.3	27.2	17.9	11.8	50.0	11.1	0.0	3.1	25.1
Secundaria completa	22.7	32.8	22.0	16.0	20.8	36.4	21.9	29.4	0.0	55.6	0.0	15.6	22.2
Preparatoria incompleta	16.5	14.8	8.0	12.6	20.8	9.1	22.1	11.8	0.0	0.0	0.0	9.4	19.4
Preparatoria completa	5.8	5.5	0.0	5.0	4.2	0.0	7.9	5.9	50.0	0.0	0.0	12.5	8.3
Profesional	19.0	12.5	4.0	40.1	0.0	27.3	18.3	5.9	0.0	0.0	0.0	50.0	13.9
Analfabeta	0.8	0.8	1.0	1.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
Estado civil													
Soltero	54.2	70.9	78.7	34.6	78.3	36.4	53.2	52.9	50.0	33.3	0.0	18.8	45.4
Casado	28.9	19.7	8.5	47.3	13.0	54.5	30.2	23.5	50.0	33.3	0.0	53.1	30.3
Divorciado	4.1	3.1	0.0	6.8	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0	28.1	6.1
Viudo	0.5	0.0	0.0	1.9	0.0	9.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	8.0	2.4	7.5	4.9	0.0	0.0	8.8	11.8	0.0	33.4	0.0	0.0	18.2
Otro	4.3	3.9	5.3	4.5	8.7	0.0	4.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	51.8	50.8	65.0	43.9	39.1	63.6	55.0	46.7	0.0	77.8	0.0	21.9	30.0
Por amigos o familia	42.8	40.0	28.0	54.6	56.5	36.4	40.0	53.3	100.0	22.2	0.0	78.1	70.0
Por indicación legal	1.6	4.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación médica	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	3.2	5.0	6.0	1.1	4.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 4. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


<i>Características</i>	<i>Global</i>	<i>Mariguana</i>	<i>Inhalables</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Tabaco</i>	<i>Tranquilizantes</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Heroína</i>	<i>Cristal</i>	<i>Rohypnol</i>	<i>Refractil</i>	<i>D. Médicas*</i>	<i>D. Ilícitas**</i>
	<i>n=37</i>	<i>n=1385</i>	<i>n=128</i>	<i>n=103</i>	<i>n=265</i>	<i>n=24</i>	<i>n=11</i>	<i>n= 523</i>	<i>n= 17</i>	<i>n=2</i>	<i>n=9</i>	<i>n=0</i>	<i>n=32</i>
Frecuencia actual													
Diario	50.1	87.4	73.6	80.0	73.7	90.9	81.6	69.2	0.0	100.0	0.0	90.6	80.6
2 - 3 veces por semana	14.7	5.9	4.6	10.0	0.0	9.1	8.7	7.7	0.0	0.0	0.0	3.1	8.2
1 vez por semana	16.2	2.5	5.7	4.8	0.0	0.0	3.7	7.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 3 veces por mes	17.3	4.2	16.1	4.3	26.3	0.0	5.6	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
1 - 11 veces por año	1.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	50.0	0.0	0.0	6.3	5.6
Edad de inicio													
9 años o menos	3.6	0.0	2.5	3.1	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	37.8	14.4	30.9	20.9	52.9	9.1	5.7	6.6	0.0	0.0	0.0	3.1	13.9
15 - 19 años	42.4	48.2	42.0	27.6	11.8	18.2	26.8	20.0	0.0	0.0	0.0	12.5	36.1
20 - 24 años	9.3	17.3	12.3	5.8	0.0	0.0	22.4	40.0	0.0	62.5	0.0	15.6	11.1
25 - 29 años	3.1	7.3	4.9	6.2	0.0	9.1	17.4	6.7	0.0	12.5	0.0	3.1	16.7
30 - 34 años	2.1	6.4	4.9	5.3	5.9	18.2	14.5	6.7	0.0	12.5	0.0	18.8	2.8
35 años o más	1.7	6.4	2.5	31.1	0.0	45.4	13.2	20.0	0.0	12.5	0.0	46.9	19.4
Droga de inicio													
Alcohol	50.8	47.7	21.3	86.8	12.5	45.4	51.4	47.0	50.0	33.3	0.0	50.0	54.1
Mariguana	15.7	36.7	14.6	1.5	0.0	9.1	18.0	11.8	50.0	33.4	0.0	3.1	16.2
Inhalables	10.8	6.3	49.5	2.3	0.0	0.0	5.2	5.9	0.0	22.2	0.0	0.0	5.4
Alucinógenos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Heroína	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0
Cocaína	9.5	0.8	1.0	1.5	4.2	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Tranquilizantes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
Barbitúricos	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0
Anfetaminas	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	9.5	7.8	13.6	6.4	83.3	0.0	7.3	5.9	0.0	11.1	0.0	0.0	5.4
Antidepresivos	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
Otros psicotrópicos	1.3	0.8	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Basuco o pasta base	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 2. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 5. Características demográficas y patrón de consumo en individuos de Alcohólicos Anónimos*

<i>Características</i>		<i>Patrón de consumo</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Sexo		Edad de inicio	
Masculino	100.0	10-14	50.8
Edad		Tipo de bebida	
35-39	64.5	Cerveza	32.8
Escolaridad		Frecuencia de consumo	
Primaria incompleta	48.5	Diario	34.9
Estado civil		Cantidad de consumo	
Soltero	37.7	16 más	35.5
Acudió		Experiencia con otra droga	
Por amigos	53.0	Sí	41.3
Droga de combinación habitual			
Mariguana	11.9		
Cocaína	4.9		

* Población total: Individuos

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=67

CUADRO 6. Aspectos relevantes de individuos con consumo habitual de alcohol

<i>Aspectos</i>	<i>Porcentaje</i>
Se ha despertado por las noches sudoroso o tembloroso por falta de alcohol	76.9
Ha estado borracho durante varios días	87.7
Una vez que empieza a tomar, le es difícil detenerse antes de sentirse borracho	78.1
Ha bebido una copa a la mañana siguiente para "curarse la cruda"	92.3
Por estar bebiendo deja de comer	70.8
Ha notado cambios en los hábitos de consumo de alcohol	82.8
Toma siempre igual, sin importar que día de la semana es	90.6
Ha bebido tanto que al día siguiente no puede recordar lo que dijo o hizo	76.9
Ha tenido temblores al dejar de tomar	81.3
Ha dejado de trabajar debido al consumo de alcohol	73.4
Su consumo de bebidas alcohólicas ha interferido en actividades familiares	70.3
Cuando siente la necesidad de una copa, no puede concentrarse en otra cosa	73.4
Tiene problemas para dejar de beber, a pesar de habérselo propuesto	96.9
Ha tratado de reducir el consumo, pero no puede	82.3
Ha tenido que tomar más para sentir los mismos efectos que antes	65.6

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=67

CUADRO 7. Características sociodemográficas de fumadores

<i>Características</i>	<i>D.F. n=232</i>
Sexo	
Femenino	52.4
Edad	
40 y más	71.6
Estado civil	
Casado	52.1
Escolaridad	
Lic o posgrado	41.7
Acudió	
Voluntaria	89.1
Consumo de otras drogas	
Sí	28.4
Drogas que ha probado	
Mariguana	19.8

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 8. Patrón de consumo de fumadores

<i>Características</i>	<i>D.F. n=232</i>
Edad de inicio	
15 a 19	45.3
Edad en la cual fumó 5 o más cigarros	
15 a 19	46.1
Frecuencia de consumo	
Diario	98.7
Cuantos cigarros fuma al día	
16 o más	67.3
Tipo de cigarro	
Con filtro	92.2
Le da el golpe al cigarro	
Siempre	85.8

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 9. Criterios de dependencia en fumadores

<i>Criterios</i>	<i>D. F. n=232</i>
Abstención en lugar prohibido	35.8
Tiempo transcurrido entre Despertar y fumar (menos de 5 minutos)	45.3
Fuma más por las mañanas	45.0
Fuma enfermo	64.3
Cuál es el cigarro más Difícil de dejar (el primero de la mañana)	45.7
Ha intentado dejar de fumar	82.7

FUENTE: SISVEA - Clínicas de Tabaco, 1998.

CUADRO 10. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias

<i>Influencia de drogas</i> N=53		<i>Uso habitual de drogas</i> N=405	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
20-24	23.5	40 y más	25.6
Sexo		Sexo	
Masculino	60.4	Masculino	68.3
Escolaridad		Escolaridad	
Secundaria incompleta	23.9	Primaria incompleta	18.6
Estado civil		Estado civil	
Soltero	52.3	Casado	40.2
Consciente		Consciente	
Sí	96.0	Sí	96.9
Primera vez		Primera vez	
Sí	83.3	Sí	81.8
Destino		Destino	
Alta	62.7	Alta	76.0

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

CUADRO 11. Población bajo influjo por patología y drogas


Patologías	Número	Número												
		Mariguana 38	Inhalables N=0	Inhalables n=3	Alcohol n=22	Tabaco n=1	Tranquilizantes n=0	Cocaína n=6	Heroína n=0	Cristal n=0	Rohypnol n=0	Refractil n=0	D.Médicas* n=4	D.Ilícitas** n=2
Bronquitis/enfisema/asma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA de tráquea/bronquios/pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. isquémica del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensión	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Enf. cerebrovascular	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afección neurológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrosis/gastritis	9	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangrado de tubo digestivo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urgencias quirúrgicas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicosis alcohólica/drogas	15	0	2	7	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0
Afección gineco-obstétrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección osteo-muscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección dermatológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	9	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.


** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

GRÁFICA 1. Lesiones asociadas al consumo de drogas



N = 825



FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

Para regresar a la página de procedencia, pulse el botón "Atrás" del explorador.

CUADRO 12. Características sociales y tipo de delito cometido por menores infractores consumidores de drogas

<i>Global</i> <i>N =1192</i> <i>%</i>	<i>Mariguana</i> <i>n =190</i> <i>%</i>	<i>Inhalables</i> <i>n =192</i> <i>%</i>	<i>Alcohol</i> <i>n =21</i> <i>%</i>	<i>Cocaína</i> <i>n =157</i> <i>%</i>	<i>Tabaco</i> <i>n =18</i> <i>%</i>	<i>Heroína</i> <i>n =3</i> <i>%</i>
Masculino 92.9	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 100.0
Secundaria incompleta 30.6	Primaria incompleta 31.6	Primaria incompleta 44.3	Secundaria incompleta 33.3	Primaria completa 35.0	Primaria incompleta 33.3	Primaria incompleta 33.3
Abandono de escuela Desinterés 39.8	Abandono de escuela Desinterés 44.2	Abandono de escuela Desinterés 44.8	Abandono de escuela Desinterés 42.1	Abandono de escuela Desinterés 0.0	Abandono de escuela Desinterés 64.7	Abandono de escuela Desinterés 33.3
Subempleado 37.2	Subempleado 59.0	Subempleado 58.0	Subempleado 55.0	Subempleado 58.2	Subempleado 50.0	Subempleado 66.7
Usa tatuajes 24.0	Usa tatuajes 46.2	Usa tatuajes 38.7	Usa tatuajes 57.1	Usa tatuajes 39.9	Usa tatuajes 55.6	Usa tatuajes 100.0
Pertenece a banda 4.0	Pertenece a banda 8.0	Pertenece a banda 12.2	Pertenece a banda 9.5	Pertenece a banda 7.7	Pertenece a banda 5.6	Pertenece a banda 100.0
Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia	Tipo de familia
Nuclear 66.4	Nuclear 52.7	Nuclear 55.5	Nuclear 57.1	Nuclear 55.1	Extensa 77.8	Nuclear 50.0
Funcional 72.5	Funcional 62.8	Funcional 65.3	Funcional 69.2	Funcional 61.1	Disfuncional 72.2	Funcional 66.7
Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad	Personalidad
Extrovertido 60.4	Extrovertido 71.3	Extrovertido 70.7	Introvertido 100.0	Extrovertido 72.6	Introvertido 83.3	Introvertido 100.0
Independiente 69.2	Independiente 81.6	Independiente 82.2	Dependiente 50.0	Independiente 82.5	Dependiente 77.8	Independiente 66.7
Sociable 92.5	Sociable 90.2	Sociable 84.1	Sociable 55.6	Sociable 88.8	Sociable 58.5	Sociable 100.0
Pasivo 95.8	Pasivo 93.0	Pasivo 87.1	Pasivo 55.6	Pasivo 91.5	Pasivo 70.6	Pasivo 100.0
Ansioso 5.0	Ansioso 9.5	Ansioso 8.3	Ansioso 52.4	Ansioso 11.5	Ansioso 66.7	Ansioso 33.3
Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo	Frec. de consumo
Diario 36.3	Diario 36.3	Diario 29.3	1 a 3 veces al mes 55.6	1 a 3 veces al mes 27.9	Diario 83.3	1 a 3 veces al mes 66.7
Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio	Edad de inicio
10 a 14 48.6	10 a 14 48.6	10 a 14 52.4	15 a 18 58.8	15 a 18 64.9	10 a 14 50.0	15 a 18 66.7
Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos	Núm. de ingresos
1 vez 80.1	1 vez 62.5	1 vez 64.0	1 vez 88.2	1 vez 60.8	1 vez 81.8	2-4 veces 100.0
Uso de arma 14.2	Uso de arma 17.8	Uso de arma 13.9	Uso de arma 26.3	Uso de arma 19.5	Uso de arma 26.7	Uso de arma 0.0
Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma	Tipo de arma
Punzo-cortante 51.3	Punzo-cortante 59.4	Punzo-cortante 52.2	Punzo-cortante 66.7	Punzo-cortante 58.6	Fuego 50.0	Punzo-cortante 0.0
Delito bajo efecto 14.4	Delito bajo efecto 33.1	Delito bajo efecto 45.7	Delito bajo efecto 75.0	Delito bajo efecto 32.2	Delito bajo efecto 29.4	Delito bajo efecto 100.0
Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes
Robo 81.6	Robo 88.9	Robo 90.1	Robo 90.5	Robo 88.5	Robo 77.8	Robo 100.0
Lesiones 8.1	Contra la salud 3.7	Daños 2.6	Homicidio 4.8	Contra la salud 3.2	Portación de arma 5.6	Portacion de arma 0.0
Violación 2.3	Lesiones 2.1	Contra la salud 2.6	Contra la salud 0.0	Portación de arma 3.8	Lesiones 11.1	Homicidio 0.0
Portación de arma 2.6	Portación de arma 5.3	Portacion de arma 2.6	Daños 4.8	Homicidio 3.2	Homicidio 5.6	Consumo/drogas 0.0

FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

Para regresar a la página de procedencia, pulse el botón "Atrás" del explorador.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual

Características	Global n=114	Mariguana n= 29	Inhalables n= 21	Alcohol n= 8	Tabaco n=5	Tranquilizantes n= 8	Cocaína n= 20	Heroína n= 0	Cristal n= 5	Rohypnol n= 8	Refractil n=0	D. Médicas* n=6	D. Ilícitas** n=3
Sexo													
Masculino	78.1	75.9	66.7	75.0	100.0	62.5	80.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	33.3
Femenino	21.9	24.1	33.3	25.0	0.0	37.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
Edad													
14 años o menos	23.7	24.2	33.3	37.5	60.0	25.0	15.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	33.3
15 - 19 años	46.5	48.3	61.9	37.5	40.0	37.5	35.0	0.0	20.0	75.0	0.0	33.3	33.3
20 - 24 años	13.2	3.4	4.8	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	40.0	25.0	0.0	33.3	33.4
25 - 29 años	9.6	6.9	0.0	12.5	0.0	12.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	33.4	0.0
30 - 34 años	0.9	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	6.1	17.2	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Escolaridad													
Primaria	19.5	17.9	28.6	25.0	0.0	50.0	10.0	0.0	20.0	12.5	0.0	16.7	0.0
Secundaria	60.2	67.9	61.8	50.0	100.0	37.5	65.0	0.0	40.0	50.0	0.0	33.3	66.7
Preparatoria	8.8	7.1	4.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	40.0	12.5	0.0	16.7	0.0
Técnico	4.4	0.0	4.8	12.5	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
Profesional	7.1	7.1	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	33.3	33.3
Analfabeta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	82.0	71.3	95.0	75.0	100.0	57.1	80.0	0.0	80.0	100.0	0.0	83.3	100.0
Casado	13.5	17.9	5.0	25.0	0.0	42.9	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
Divorciado	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	0.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nivel socioeconómico													
Alto y medio alto	12.8	20.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	33.3
Medio bajo	57.4	40.0	88.9	66.7	0.0	50.0	62.5	0.0	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0
Medio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bajo	29.8	40.0	11.1	33.3	0.0	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
Otro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento en Centros de Integración Juvenil según droga actual


Características	Global n=114	Mariguana n= 29	Inhalables n= 21	Alcohol n= 8	Tabaco n=5	Tranquilizantes n=8	Cocaína n=20	Heroína n=0	Cristal n= 5	Rohypnol n= 8	Refractil n=0	D.Médicas* n=6	D.Ílícitas** n=3
Frecuencia actual													
Diario	54.4	52.6	41.7	0.0	33.3	60.0	36.4	0.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0
2 - 3 veces por semana	12.0	0.0	41.7	20.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
1 vez por semana	16.3	21.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 3 veces por mes	13.0	10.5	8.3	60.0	66.7	0.0	36.4	0.0	33.3	33.3	0.0	50.0	0.0
1 - 11 veces por año	4.3	15.8	0.0	20.0	0.0	40.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	5.4	3.7	4.8	12.5	0.0	0.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	33.3
10 - 14 años	59.5	51.9	76.2	62.5	100.0	62.5	55.0	0.0	0.0	62.5	0.0	50.0	66.7
15 - 19 años	28.8	40.7	19.0	12.5	0.0	25.0	35.0	0.0	60.0	37.5	0.0	16.7	0.0
20 - 24 años	5.4	3.7	0.0	12.5	0.0	0.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	33.3	0.0
25 - 29 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	31.0	24.1	19.0	0.0	60.0	50.0	50.0	0.0	20.0	50.0	0.0	16.7	33.3
Mariguana	26.4	27.6	28.7	50.0	20.0	12.5	15.0	0.0	40.0	37.5	0.0	33.3	0.0
Inhalables	14.2	27.6	19.0	12.5	20.0	0.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	2.7	0.0	4.8	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	16.8	20.7	19.0	12.5	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
Antidepresivos	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.9	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	1.8	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0

• Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

• ** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros de Integración Juvenil, 1998.

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

<i>Características</i>	<i>Global</i> n=250	<i>Mariguana</i> n= 0	<i>Inhalables</i> n= 2	<i>Alcohol</i> n= 0	<i>Tabaco</i> n= 0	<i>Tranquilizantes</i> n= 1	<i>Cocaína</i> n= 3	<i>Heroína</i> n= 1	<i>Cristal</i> n= 3	<i>Rohypnol</i> n= 0	<i>Refractil</i> n=0	<i>D. Médicas*</i> n=0	<i>D. Ilícitas**</i> n=4
Sexo													
Masculino	97.2	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	100.0
Femenino	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad													
14 años o menos	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	21.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	25.0
20 - 24 años	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29 años	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
35 años o más	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	50.0
Escolaridad													
Primaria incompleta	26.6	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	25.0
Primaria completa	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0
Secundaria incompleta	16.9	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria completa	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0
Preparatoria incompleta	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
Preparatoria completa	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analfabeta	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	43.1	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	25.0
Casado	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Divorciado	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	16.8	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
Otro	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Por amigos o familia	3.4	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación legal	85.5	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	33.4	0.0	0.0	0.0	100.0
Por indicación médica	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 4. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto


<i>Características</i>	<i>Global</i> n=250	<i>Mariguana</i> n=0	<i>Inhalables</i> n=2	<i>Alcohol</i> n=0	<i>Tabaco</i> n=0	<i>Tranquilizantes</i> n=1	<i>Cocaína</i> n= 3	<i>Heroína</i> n= 1	<i>Cristal</i> n=3	<i>Rohypnol</i> n=0	<i>Refractil</i> n=0	<i>D. Médicas*D.</i> n=0	<i>Ilícitas**</i> n=4
Frecuencia actual													
Diario	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	25.0
2 - 3 veces por semana	5.6	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 3 veces por mes	21.5	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
1 - 11 veces por año	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
Edad de inicio													
9 años o menos	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	27.5	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	55.9	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4
20 - 24 años	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
25 - 29 años	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
Droga de inicio													
Alcohol	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mariguana	47.5	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	66.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.0
Inhalables	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos. Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

**DIAGRAMA 2. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 5. Perfil sociodemográfico de la población que acudió a tratamiento psiquiátrico

<i>Características Número</i>	<i>Total N=55</i>	<i>Neurosis sintomática n =24</i>	<i>Trastorno afectivo n =5</i>	<i>Trastorno psicótico n =37</i>	<i>Trastorno caracterológico n =33</i>	<i>Trastorno mental orgánico n =48</i>
Sexo	Masculino 94.5	Masculino 100.0	Masculino 100.0	Masculino 94.6	Masculino 93.9	Masculino 93.8
Edad	25-29 24.5	25-29 26.1	20-24 40.0	25-29 22.2	25-29 25.0	25-29 26.1
Escolaridad	Prim. com. 31.5	Prim. inc. 33.3	Prim.com. 40.0	Prim. com. 38.9	Prim. inc. 30.3	Prim.com. 34.0
Estado civil	Soltero 40.0	Soltero 41.7	Soltero 80.0	Soltero 48.6	Soltero 48.5	Soltero 41.7
Acudió	Por amigos 72.7	Por amigos 66.7	Por amigos 80.0	Por amigos 75.7	Por amigos 63.6	Por amigos 72.9
Hospitalizado	Sí 33.3	Sí 50.0	Sí 60.0	Sí 27.6	Sí 45.5	Sí 33.3
Frecuencia	1-5 veces 100.0	1-5 veces 100.0	1-5 veces 100.0	1-5 veces 100.0	1-5 veces 100.0	1-5 veces 100.0

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 6. Porcentaje de consumo de drogas entre la población que acudió a tratamiento psiquiátrico según diagnóstico en las ciudades SISVEA

<i>Características Número</i>	<i>Total N=55</i>	<i>Neurosis sintomática n=24</i>	<i>Trastorno afectivo n=5</i>	<i>Trastorno psicótico n=37</i>	<i>Trastorno caracterológico n=33</i>	<i>Trastorno mental orgánico n=48</i>
Droga utilizada antes de tratamiento						
Alcohol	56.4	58.3	80.0	67.6	63.6	60.4
Mariguana	41.8	41.7	60.0	51.4	42.4	41.7
Inhalables	5.5	4.2	0.0	8.1	6.1	4.2
Cocaína	29.1	16.7	20.0	32.4	27.3	29.2
Heroína	5.5	0.0	0.0	2.7	6.1	6.3
Tranquilizantes	5.5	0.0	0.0	8.1	3.0	6.3
Drogas médicas	3.6	0.0	0.0	2.7	3.0	2.1
Drogas ilícitas	7.3	8.3	0.0	10.8	6.1	8.3
Droga utilizada durante tratamiento						
Alcohol	3.6	4.2	0.0	5.4	3.0	4.2
Mariguana	1.8	4.2	20.0	2.7	0.0	2.1
Inhalables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	7.3	8.3	20.0	2.7	9.1	6.3
Drogas médicas	5.5	4.2	0.0	2.7	9.1	4.2
Drogas ilícitas	5.5	8.3	20.0	2.7	6.1	4.2
Droga de consumo actual						
Alcohol	12.7	16.7	0.0	16.2	12.1	14.6
Mariguana	5.5	12.5	20.0	8.1	3.0	6.3
Inhalables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	1.8	4.2	0.0	2.7	3.0	2.1
Heroína	1.8	4.2	0.0	0.0	3.0	2.1
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas médicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Drogas ilícitas	1.8	4.2	0.0	2.7	0.0	2.1

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 7. Perfil de pacientes que acude a tratamiento psiquiátrico por consumo de drogas

Características	Núm.	Sexo	%	Edad	%	Escolaridad	%	Estado civil	%	Hospita- lizado %	Tipo de droga %	
Neurosis sintomática												
a) Ansiógena	14	M	100.0	25 - 29	35.7	Sec. incompl.	28.6	Soltero	50.0	Sí	42.9	Alcohol 64.3
b) Fóbica	1	M	100.0	35 - 39	100.0	Sec. incompl.	100.0	Casado	100.0	Sí	100.0	Alcohol 100.0
c) Depresiva	8	M	100.0	25 - 29	42.9	Prim. incompl.	37.5	Casado	25.0	Si	50.0	Alcohol 50.0
Trastorno afectivo												
a) U. maniaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Dep. mayor	3	M	100.0	20 - 24	66.7	Prim. incompl.	33.3	Soltero	100.0	Sí	66.7	Alcohol 100.0
c) Bipolar	1	M	100.0	30 - 34	100.0	Prim. compl.	100.0	Divorc	100.0	Sí	100.0	Marig. 100.0
Trastorno psicótico												
a) Esquizofrenia	1	F	100.0	15 - 19	100.0	Sec. compl.	100.0	Soltero	100.0	No	100.0	Alcohol 100.0
b) Orgánico	16	M	93.8	40 y más	26.7	Prim. compl.	56.3	Soltero	31.3	Sí	36.4	Alcohol 68.8
c) Otro funcional	17	M	94.1	25 - 29	23.5	Prim. compl.	25.0	Soltero	58.8	Sí	26.7	Alcohol 70.6
Trastorno caracterológico												
a) Neurótico	17	M	100.0	25 - 29	29.4	Prim. compl.	35.3	Soltero	52.9	Sí	27.3	Alcohol 64.7
b) Límitrofe	2	M	50.0	25 - 29	50.0	Sec. incompl.	50.0	Soltero	50.0	Sí	50.0	Alcohol 50.0
c) Psicótico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastorno mental orgánico												
a) Retardo mental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Traumático	1	M	100.0	40 y más	100.0	Lic. Pos.	100.0	Casado	100.0	Sí	100.0	Alcohol 100.0
c) Por sustancias	44	M	93.2	25 - 29	26.2	Prim. Compl.	34.9	Soltero	43.2	Sí	33.3	Alcohol 61.4

FUENTE: SISVEA - Hospitales Psiquiátricos, 1998.

CUADRO 8. Características demográficas y patrón de consumo en individuos de Alcohólicos Anónimos*

<i>Características</i>		<i>Patrón de Consumo</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Sexo		Edad de inicio	
Masculino	90.9	15 a 19	50.0
Edad		Tipo de bebida	
35-39	58.7	Destilados	56.7
Escolaridad		Frecuencia de consumo	
Licenciatura	27.1	1 a 3 por semana	44.1
Estado civil		Cantidad de consumo	
Casado	71.7	6 a 10 copas	61.1
Acudió		Experiencia con otra droga	
Por amigo	48.9	Sí	41.0
Droga de combinación habitual			
Cocaína	14.6		
Mariguana	12.5		

* Población total: Individuos

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=48

CUADRO 9. Aspectos relevantes de individuos con consumo habitual de alcohol

<i>Aspectos</i>	<i>Porcentaje</i>
Se ha despertado por las noches sudoroso o tembloroso por falta de alcohol	81.0
Ha estado borracho durante varios días	86.0
Una vez que empieza a tomar, le es difícil detenerse antes de sentirse borracho	84.1
Ha bebido una copa a la mañana siguiente para "curarse la cruda"	79.1
Por estar bebiendo deja de comer	69.0
Ha notado cambios en los hábitos de consumo de alcohol	76.9
Toma siempre igual. sin importar que día de la semana es	77.5
Ha bebido tanto que al día siguiente no puede recordar lo que dijo o hizo	85.0
Ha tenido temblores al dejar de tomar	56.1
Ha dejado de trabajar debido al consumo de alcohol	87.5
Su consumo de bebidas alcohólicas ha interferido en actividades familiares	97.5
Cuando siente la necesidad de una copa. no puede concentrarse en otra cosa	65.9
Tiene problemas para dejar de beber. a pesar de habérselo propuesto	90.2
Ha tratado de reducir el consumo. pero no puede	87.8
Ha tenido que tomar más para sentir los mismos efectos que antes	79.9

FUENTE: SISVEA - Grupos de Alcohólicos Anónimos, 1998.

N=48

CUADRO 10. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias

<i>Influencia de drogas N=3</i>		<i>Uso habitual de drogas N=149</i>	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
15 a19	33.3	40 y más	37.0
Sexo		Sexo	
Femenino	66.7	Masculino	66.7
Escolaridad		Escolaridad	
Primaria Incompleta	33.3	Lic. o Posgrado	24.0
Estado civil		Estado civil	
Soltero	66.7	Casado	59.0
Consciente		Consciente	
Sí	100.0	Sí	99.3
Primera vez		Primera vez	
Sí	100.0	Sí	72.9
Destino		Destino	
Alta	50.0	Alta	69.9

FUENTE: SISVEA- Servicio de Urgencias, 1998.

CUADRO 11. Población bajo influjo por patología y drogas


<i>Patologías</i>	<i>Número</i>	<i>Número</i>	<i>Mariguana</i>	<i>Inhalables</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Tabaco</i>	<i>Tranquilizantes</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Heroína</i>	<i>Cristal</i>	<i>Rohypnol</i>	<i>Refractil</i>	<i>D.Médicas*</i>	<i>D.Ilícitas**</i>
		<i>0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>	<i>n=0</i>
Bronquitis/enfisema/asma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA de tráquea/bronquios/pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf.isquémica del corazón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipertensión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enf. cerebrovascular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afección neurológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirrosis/gastritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangrado de tubo digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urgencias quirúrgicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicosis alcohólica/drogas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección gineco-obstétrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección osteo-muscular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afección dermatológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1997.

GRÁFICA 1. Lesiones asociadas al de drogas



Fuente: SISVEA - Servicios de Urgencias/1998

Para regresar a la página de procedencia, pulse el botón "Atrás" del explorador.

CUADRO 12. Distribución por causa de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Global n=56</i>	<i>Accidentes n=13</i>	<i>Homicidios n=19</i>	<i>Suicidios n=1</i>
Sexo				
Masculino	96.4	92.3	94.7	100.0
Femenino	3.6	7.7	5.3	0.0
Edad				
14 años o menos	1.9	7.7	0.0	0.0
15-19 años	7.4	15.4	11.1	0.0
20-24 años	27.8	30.8	50.0	0.0
25-29 años	7.4	7.7	11.1	0.0
30-34 años	5.6	0.0	0.0	100.0
35-39 años	9.3	7.7	11.1	0.0
40 o más	40.6	30.7	16.7	0.0
Causa de muerte				
Atropellado	5.5	7.7	5.6	0.0
Choque en vehículo	7.3	30.8	0.0	0.0
Caída	1.8	7.7	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	0.0	0.0	0.0	0.0
Asfixia	5.5	23.1	0.0	0.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	25.5	0.0	72.1	0.0
Arma punzocortante	5.5	0.0	16.7	0.0
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	7.3	0.0	5.6	0.0
Envenenado	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	41.6	30.7	0.0	100.0
Lugar				
Tránsito	7.1	15.4	0.0	0.0
Hogar	26.8	15.4	5.3	0.0
Vía pública	35.7	46.1	63.2	0.0
Baños públicos	0.0	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	3.6	7.7	5.3	0.0
Trabajo	1.8	0.0	5.3	0.0
Área de servicio	5.4	0.0	5.3	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	19.6	15.4	15.6	100.0

N = 620

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 13. Distribución de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Alcohol</i> <i>n=54</i>	<i>Opioides</i> <i>n=0</i>	<i>Mariguana</i> <i>n=2</i>
Sexo			
Masculino	96.3	0.0	100.0
Femenino	3.7	0.0	0.0
Edad			
14 años o menos	1.9	0.0	0.0
15-19 años	7.7	0.0	0.0
20-24 años	26.9	0.0	50.0
25-29 años	5.8	0.0	50.0
30-34 años	5.8	0.0	0.0
35-39 años	9.6	0.0	0.0
40 o más	42.3	0.0	0.0
Causa de muerte			
Atropellado	5.7	0.0	0.0
Choque en vehículo	7.6	0.0	0.0
Caída	1.9	0.0	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	0.0	0.0	0.0
Asfixia	5.7	0.0	0.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	24.5	0.0	50.0
Arma punzocortante	5.7	0.0	0.0
Violación	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	7.5	0.0	0.0
Envenenado	0.0	0.0	0.0
Otros	41.5	0.0	50.0
Lugar			
Tránsito	7.4	0.0	0.0
Hogar	27.8	0.0	0.0
Vía pública	35.1	0.0	50.0
Baños públicos	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	3.7	0.0	0.0
Trabajo	1.9	0.0	0.0
Área de servicio	5.6	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0
Otros	18.5	0.0	50.0

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 14. Características sociales y tipo de delito cometido por menores infractores consumidores de drogas

<i>Global</i> <i>N =475</i> <i>%</i>	<i>Mariguana</i> <i>n =44</i> <i>%</i>	<i>Inhalables</i> <i>n =38</i> <i>%</i>	<i>Alcohol</i> <i>n =28</i> <i>%</i>	<i>Cocaína</i> <i>n =3</i> <i>%</i>	<i>Tabaco</i> <i>n =30</i> <i>%</i>	<i>Heroína</i> <i>n =0</i> <i>%</i>
Masculino 84.4	Masculino 88.6	Masculino 84.2	Masculino 92.9	Masculino 66.7	Masculino 93.3	Masculino 0.0
Primaria incompleta 31.5	Primaria incompleta 50.0	Primaria incompleta 63.2	Secundaria incompleta 46.4	Secundaria incompleta 66.7	Secundaria incompleta 36.7	Primaria incompleta 0.0
Abandono de escuela Desinterés 53.0	Abandono de escuela Desinterés 76.2	Abandono de escuela Desinterés 76.5	Abandono de escuela Desinterés 66.7	Abandono de escuela Desinterés 0.0	Abandono de escuela Desinterés 61.5	Abandono de escuela Desinterés 0.0
Estudiante 32.8	Ninguna 46.3	Ninguna 47.2	Subempleado 26.9	Ninguna 66.7	Ninguna 32.1	Ninguna 0.0
Usa tatuajes 18.8	Usa tatuajes 40.9	Usa tatuajes 34.2	Usa tatuajes 37.0	Usa tatuajes 66.7	Usa tatuajes 30.0	Usa tatuajes 0.0
Pertenece a banda 14.7	Pertenece a banda 36.4	Pertenece a banda 31.6	Pertenece a banda 17.9	Pertenece a banda 33.3	Pertenece a banda 26.7	Pertenece a banda 0.0
Tipo de familia Extensa 70.4	Tipo de familia Extensa 69.8	Tipo de familia Extensa 75.7	Tipo de familia Extensa 82.1	Tipo de familia Extensa 66.7	Tipo de familia Extensa 73.3	Tipo de familia Extensa 0.0
Funcional 51.5	Disfuncional 68.2	Disfuncional 63.2	Funcional 53.6	Disfuncional 66.7	Disfuncional 60.0	Disfuncional 0.0
Personalidad Extrovertido 76.1	Personalidad Extrovertido 75.0	Personalidad Extrovertido 94.1	Personalidad Extrovertido 73.3	Personalidad Extrovertido 66.7	Personalidad Extrovertido 71.4	Personalidad Introvertido 0.0
Independiente 85.7	Independiente 80.0	Independiente 94.1	Independiente 78.6	Independiente 100.0	Independiente 80.0	Dependiente 0.0
Sociable 96.3	Sociable 100.0	Sociable 100.0	Sociable 100.0	Sociable 100.0	Sociable 100.0	Sociable 0.0
Pasivo 97.0	Pasivo 94.7	Pasivo 100.0	Pasivo 100.0	Pasivo 100.0	Pasivo 100.0	Agresivo 0.0
Ansioso 0.8	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0	Ansioso 0.0
Frec. de consumo Diario 35.9	Frec. de consumo Diario 35.9	Frec. de consumo 1 a 11 al año 30.8	Frec. de consumo 1 a 3 veces al mes 64.0	Frec. de consumo 1 a 3 veces al mes 100.0	Frec. de consumo Diario 78.6	Frec. de consumo Diario 0.0
Edad de inicio 10 a 14 72.7	Edad de inicio 10 a 14 72.7	Edad de inicio 10 a 14 72.7	Edad de inicio 10 a 14 85.7	Edad de inicio 10 a 14 100.0	Edad de inicio 10 a 14 76.5	Edad de inicio 15 a 18 0.0
Núm. de ingresos 1 vez 78.2	Núm. de ingresos 1 vez 45.0	Núm. de ingresos 1 vez 58.3	Núm. de ingresos 1 vez 84.0	Núm. de ingresos 1 vez 50.0	Núm. de ingresos 1 vez 85.2	Núm. de ingresos 2-4 veces 0.0
Uso de arma 9.2	Uso de arma 11.6	Uso de arma 13.2	Uso de arma 14.3	Uso de arma 0.0	Uso de arma 24.1	Uso de arma 0.0
Tipo de arma Fuego 53.1	Tipo de arma Punzo-cortante 66.7	Tipo de arma Punzo-cortante 75.0	Tipo de arma Fuego 100.0	Tipo de arma Fuego 0.0	Tipo de arma Fuego 83.3	Tipo de arma Punzo-cortante 0.0
Delito bajo efecto 20.9	Delito bajo efecto 57.5	Delito bajo efecto 64.9	Delito bajo efecto 32.0	Delito bajo efecto 33.3	Delito bajo efecto 76.0	Delito bajo efecto 0.0
Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes	Delitos más comunes
Robo 24.6	Robo 38.6	Robo 21.1	Robo 46.4	Robo 33.3	Robo 40.0	Robo 0.0
Contra la salud 6.9	Contra la salud 6.8	Consumo/drogas 63.2	Consumo/drogas 7.1	Violación 33.3	Contra la salud 13.3	Portación de arma 0.0
Consumo/drogas 10.5	Consumo/drogas 31.8	Violación 2.6	Portación de arma 10.7	Consumo/drogas 33.3	Lesiones 6.7	Homicidio 0.0
Violación 6.7	Violación 4.5	Lesiones 2.6	Violación 7.1	Lesiones 0.0	Portación de arma 13.3	Consumo/drogas 0.0

FUENTE: Consejo Tutelar de Menores, 1998.

Para regresar a la página de procedencia, pulse el botón "Atrás" del explorador.

CUADRO 1. Perfil sociodemográfico de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

Características	Global n=201	Mariguana n=8	Inhalables n= 1	Alcohol n= 7	Tabaco n=0	Tranquilizantes n= 0	Cocaína n= 5	Heroína n= 70	Cristal n= 34	Rohypnol n= 0	Refractil n=0	D. Médicas* n=1	D. Ilícitas** n=2
Sexo													
Masculino	86.8	87.5	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	94.2	76.5	0.0	0.0	100.0	100.0
Femenino	13.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad													
14 años o menos	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
15 - 19 años	16.8	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	26.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	35.4	0.0	0.0	100.0	0.0
25 - 29 años	18.4	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	60.0	21.4	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	12.2	12.5	100.0	14.3	0.0	0.0	20.0	22.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años o más	24.6	12.5	0.0	57.1	0.0	0.0	20.0	22.9	8.8	0.0	0.0	0.0	50.0
Escolaridad													
Primaria incompleta	22.8	0.0	100.0	14.3	0.0	0.0	0.0	17.1	20.6	0.0	0.0	0.0	50.0
Primaria completa	7.6	12.5	0.0	28.6	0.0	0.0	20.0	5.7	11.8	0.0	0.0	100.0	50.0
Secundaria incompleta	34.6	62.5	0.0	28.5	0.0	0.0	40.0	37.2	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Secundaria completa	13.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	21.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Preparatoria incompleta	7.6	12.5	0.0	14.3	0.0	0.0	40.0	8.6	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Preparatoria completa	8.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Profesional	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Analfabeta	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estado civil													
Soltero	56.5	62.5	100.0	50.0	0.0	0.0	40.0	51.4	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0
Casado	21.8	12.5	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	20.6	24.2	0.0	0.0	0.0	50.0
Divorciado	7.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Viudo	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Unión libre	9.3	12.5	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.2	6.1	0.0	0.0	100.0	0.0
Separado	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acudió													
En forma voluntaria	10.2	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	25.0	11.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Por amigos o familia	58.3	62.5	0.0	14.3	0.0	0.0	75.0	64.3	52.9	0.0	0.0	100.0	50.0
Por indicación legal	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Por indicación médica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	30.5	37.5	100.0	71.4	0.0	0.0	0.0	24.3	41.3	0.0	0.0	0.0	50.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA- Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 2. Patrón de consumo de la población que acude a tratamiento según droga de impacto

Características	Global n=201	Mariguana n=8	Inhalables n=1	Alcohol n=7	Tabaco n=0	Tranquilizantes n=0	Cocaína n= 5	Heroína n= 70	Cristal n=34	Rohypnol n=0	Refractil n=0	D. Médicas* n=1	Dilícitas** n=2
Frecuencia actual													
Diario	65.7	87.5	100.0	85.7	0.0	0.0	60.0	85.7	85.4	0.0	0.0	0.0	100.0
2 - 3 veces por semana	17.7	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1 vez por semana	12.5	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	20.0	8.6	8.8	0.0	0.0	100.0	0.0
1 - 3 veces por mes	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	1.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 11 veces por año	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Edad de inicio													
9 años o menos	3.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
10 - 14 año	41.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
15 - 19 años	40.0	50.0	0.0	71.4	0.0	0.0	60.0	44.9	52.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24 años	7.4	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	20.0	23.3	17.6	0.0	0.0	100.0	0.0
25 - 29 años	3.2	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	15.9	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
30 - 34 años	2.6	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.9	0.0	0.0	0.0	50.0
35 años o más	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Droga de inicio													
Alcohol	14.9	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	20.0	5.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Mariguana	59.0	75.0	0.0	57.1	0.0	0.0	60.0	74.3	55.9	0.0	0.0	100.0	50.0
Inhalables	5.1	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	2.9	0.0	0.0	0.0	50.0
Alucinógenos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroína	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Opio-morfina y deriv.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cocaína	5.1	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Tranquilizantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anfetaminas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antidepresivos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros psicotrópicos	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Basuco o pasta base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cristal	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Refractil ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 1998.

CUADRO 3. Perfil sociodemográfico y de atención a pacientes en urgencias

<i>Influencia de drogas</i> N=3		<i>Uso habitual de drogas</i> N=47	
	<i>Porcentaje</i>		<i>Porcentaje</i>
Edad		Edad	
25 a 29	33.3	40 y más	30.3
Sexo		Sexo	
Masculino	66.7	Masculino	56.5
Escolaridad		Escolaridad	
Secundaria incompleta	66.7	Primaria completa	23.4
Estado civil		Estado civil	
Soltero	66.7	Casado	38.3
Consciente		Consciente	
Sí	100.0	Sí	97.8
Primera vez		Primera vez	
Sí	50.0	Sí	80.4
Destino		Destino	
Alta	100.0	Alta	70.5

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

CUADRO 4. Población bajo influjo por patología y drogas


Patologías	Número	Número	Mariguana	Inhalables	Alcohol	Tabaco	Tranquilizantes	Cocaína	Heroína	Cristal	Rohypnol	Refractil	D.Médicas*	D.Ilícitas**
		0	N=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
Bronquitis/enfisema/asma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CA de tráquea/bronquios/pulmón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enf. isquémica del corazón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hipertensión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enf. cerebrovascular	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras afección neurológica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cirrosis/gastritis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sangrado de tubo digestivo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Urgencias quirúrgicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Psicosis alcohólica/drogas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Afección gineco-obstétrica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Afección osteo-muscular	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Afección dermatológica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diabetes mellitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

** Alucinógenos, Basuco, Otros psicotrópicos.

FUENTE: SISVEA - Servicio de Urgencias, 1998.

GRÁFICA 1. Lesiones asociadas al consumo de drogas



Nota: Sólo se mencionan las más frecuentes. No se registraron lesiones bajo efecto
FUENTE: SISVEA - Servicios de Urgencias, 1998

CUADRO 5. Distribución por causa de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Global n=83</i>	<i>Accidentes n=24</i>	<i>Homicidios n=7</i>	<i>Suicidios n= 4</i>
Sexo				
Masculino	95.1	95.8	100.0	100.0
Femenino	4.9	4.2	0.0	0.0
Edad				
14 años o menos	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19 años	5.0	8.7	0.0	0.0
20-24 años	16.3	13.0	14.3	50.0
25-29 años	16.3	21.7	71.4	0.0
30-34 años	5.0	8.7	0.0	0.0
35-39 años	15.0	13.0	0.0	0.0
40 o más	42.4	34.9	14.3	50.0
Causa de muerte				
Atropellado	12.2	25.0	14.3	0.0
Choque en vehículo	8.5	25.0	14.3	0.0
Caída	3.7	12.5	0.0	0.0
Electrocutado	1.2	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	2.4	4.2	0.0	0.0
Asfixia	11.0	4.2	28.5	50.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	9.8	4.2	28.6	50.0
Arma punzocortante	6.1	8.3	14.3	0.0
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	8.5	0.0	0.0	0.0
Envenenado	1.2	0.0	0.0	0.0
Otros	35.4	16.6	0.0	0.0
Lugar				
Tránsito	13.7	28.6	14.3	0.0
Hogar	17.8	0.0	0.0	75.0
Vía pública	41.1	38.1	57.1	25.0
Baños públicos	1.4	0.0	0.0	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	8.2	9.5	0.0	0.0
Trabajo	2.7	9.5	0.0	0.0
Área de servicio	0.0	0.0	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	15.1	14.3	28.6	0.0

N = 442


FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

CUADRO 6. Distribución de muertes producidas bajo efecto de alguna sustancia

<i>Características</i>	<i>Alcohol n=61</i>	<i>Opioides n= 8</i>	<i>Mariguana n=8</i>
Sexo			
Masculino	95.0	100.0	87.5
Femenino	5.0	0.0	12.5
Edad			
14 años o menos	0.0	0.0	0.0
15-19 años	3.4	0.0	37.5
20-24 años	17.2	25.0	25.0
25-29 años	13.8	0.0	0.0
30-34 años	1.7	12.5	0.0
35-39 años	13.8	25.0	25.0
40 o más	50.1	37.5	12.5
Causa de muerte			
Atropellado	11.5	0.0	12.5
Choque en vehículo	11.5	0.0	25.0
Caída	3.3	14.3	0.0
Electrocutado	0.0	0.0	0.0
Quemado	0.0	0.0	0.0
Golpe por objeto	3.3	0.0	0.0
Asfixia	9.8	0.0	0.0
Aplastamiento	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	4.9	28.6	25.0
Arma punzocortante	6.6	0.0	12.5
Violación	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	3.3	42.8	12.5
Envenenado	1.6	0.0	0.0
Otros	44.2	14.3	12.5
Lugar			
Tránsito	14.8	0.0	28.6
Hogar	18.5	14.3	0.0
Vía pública	40.7	42.8	57.1
Baños públicos	1.9	14.3	0.0
Áreas escolares	0.0	0.0	0.0
Lugares de recreo	5.6	0.0	0.0
Trabajo	1.9	14.3	0.0
Área de servicio	0.0	0.0	0.0
Hospital	0.0	0.0	0.0
Otros	16.6	14.3	14.3

FUENTE: SISVEA - Servicio Médico Forense, 1998.

**DIAGRAMA 1. Historia natural del consumo de drogas
 (seguimiento hasta tres drogas)**



FUENTE: Centros No Gubernamentales, 1998.