



**Subsecretaría de Prevención
y
Promoción de la Salud**

Dirección General Adjunta de Epidemiología

**Dirección de Investigación Operativa
Epidemiológica**

**Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones
(SISVEA)**

Informe 2007



SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Angel Cordova Villalobos
Secretario de Salud

Dra. Maki Esther Ortíz Domínguez
Subsecretaria de Innovación y Calidad

Dr. Mauricio Hernández Avila
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Ma. Eugenia de León-May
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Pablo Kuri Morales
**Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
y Control de Enfermedades**

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
Director General Adjunto de Epidemiología



COORDINACIÓN NACIONAL

Dr. Pablo Kuri Morales
Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
Dra. Ietza Bojorquez Chapela

COORDINACIÓN OPERATIVA Y DE ANÁLISIS

Dra. Ietza Bojorquez Chapela
M. en C. Mario Cortés Ramírez
Fis. Mat. Fernando Galván Castillo
Dr. Armando Amézcua Jiménez

ÁREA DE SUPERVISIÓN

Lic. Otilda Jiménez Casillas
Lic. Maricela Mendoza Morales
C. Martha Villalobos Díaz
Dr. Juan Manuel Hernández Sánchez

ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tec. Carlos Javier Ortíz Mondragón



RESPONSABLES POR ENTIDAD FEDERATIVA



Aguascalientes

Dr. Jorge Alfonso Blanco Alonso
Jefe de Departamento Estatal de Epidemiología

C. Martín García Pedroza
Responsable Estatal del SISVEA

Baja California

Dra. Angélica Guadalupe Pon Méndez
Departamento de Epidemiología Estatal

Dra. Leticia Wong López
Coordinadora Estatal de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades no Transmisibles

Baja California Sur

Dr. Alejo Méndez Hernández
Subdirector de Prevención y Control del Enfermedades

Campeche

Dr. Arturo Alatorre Manjarrez
Coordinador de Enfermedades no Transmisibles

Coahuila

Dr. Edgar Farías Farías
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Tec.. Arturo Malacara Garza
Coordinador Estatal del SISVEA

Colima

Dr. Rodolfo Flores García
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Dr. Oscar David González Andrade
Coordinador Estatal del SISVEA

Chiapas

Dra. Leticia Jarquín Estrada
Jefa del Departamento de Epidemiología Estatal

Lic. Abraham Aquino Hernández
Coordinador Estatal del SISVEA



Chihuahua

Dr. Gumaro Barrios Gallegos
Subdirector Estatal de Epidemiología

Dr. Carlos Eduardo Pacheco Torres
Coordinador Estatal del SISVEA

Distrito Federal

Dra. Alejandra Lisbeth Martínez Delgadillo
Responsable del SISVEA

Durango

Dr. Carlos Ortega Amador
Jefe de la Subdirección de Epidemiología y Medicina Preventiva

Lic. Aída Escárzaga Ayala
Coordinadora Estatal del SISVEA

Guanajuato

Dr. Martín Milán López
Jefe del Departamento de Epidemiología

Lic. Ma. Teresa Ortega Luna
Coordinadora Estatal del SISVEA

Guerrero

Dr. Angel Peñaloza Moctezuma
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

T. I. Irma Rocío Benítez
Coordinadora Estatal del SISVEA

Hidalgo

Dr. Israel Mendoza López
Subdirector Estatal de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Ma. Teresa Tristán
Coordinadora Estatal del SISVEA

Jalisco

Lic. María Cristina Santoscoy Gutiérrez
Comisionada del Consejo Estatal Contra las Adicciones

Dra. Lucía Salazar Montes
Jefa del Departamento de Epidemiología

Dr. Luis Javier Robles Arellano
Coordinador Estatal del SISVEA



Estado de México

Dra. Rosa María Sánchez Espinoza
Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Dra. Laura García Osorio
Coordinadora Estatal del SISVEA

Michoacán

Dr. Mario Guzmán Solorio
Jefe del Departamento de Epidemiología de Medicina Preventiva Estatal

Dra. Rosa Eugenia Valencia Farías
Responsable Estatal del SISVEA

Morelos

Dr. Alfonso Pérez Parra
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Psic. Jaime Dávila Sosa
Secretario del Consejo Estatal Contra las Adicciones
Coordinador Estatal del SISVEA

Nayarit

Dr. Aurelio Carrillo Rodríguez
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Lic. Yadira Guadalupe Ibarra González
Responsable de Vigilancia Epidemiológica

Lic. en Enf. Dolores Selene Arvizu Ramírez
Coordinadora Estatal del SISVEA

Nuevo León

Dra. Angeles Mata Briseño
Jefa del Departamento de Epidemiología Estatal

Dr. Juan José Roque Segovia
Coordinador Estatal del SISVEA

Oaxaca

Dr. Rubén Coronado García
Jefe del Departamento de Epidemiología

Dr. Miguel A. Solano Ceh
Coordinador Estatal del SISVEA



Puebla

Mtro. Jorge Manuel Ramírez Sánchez
Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Dra. Patricia Guzmán Hernández
Responsable Estatal del SISVEA

Querétaro

Dr. Jaime Ponce Alcocer
Comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones

Lic. Lorena Gómez Varela
Coordinadora Estatal del SISVEA

Quintana Roo

Dr. José Esparza Aguilar
Subdirector Estatal de Epidemiología

Lic. Luis Norberto Pasos Ceh
Coordinador Estatal del SISVEA

San Luis Potosí

Dr. Hector Marroquín Segura
Srio. Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones

Dr. José De Jesús Méndez Lira
Jefe del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas
Coordinador Estatal del SISVEA

Sinaloa

Dr. Adolfo Entzana Galindo
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Dra. Ofelia Cárdenas Medina
Coordinadora Estatal del SISVEA

Sonora

Dr. Ricardo Pacheco Elías
Jefe del Departamento Estatal de Epidemiología

Ing. Aarón León Ruiz
Coordinador Estatal del SISVEA

Tabasco

Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Lic. Lucía Santiago Priego
Coordinador Estatal del SISVEA



Tamaulipas

Dr. Alfredo Rodríguez Trujillo
Jefe del Departamento de Epidemiología Estatal

Lic. José Manuel Vázquez Vázquez
Coordinador Estatal del SISVEA

Tlaxcala

Dr. Carlos Tlacoahuatl Cholula
Subdirector Estatal de Epidemiología

Dra. Virginia Sánchez Cordero
Coordinadora Estatal del SISVEA

Veracruz

Dra. Dulce María Espejo Guevara
Jefa del Departamento Estatal del SISVEA

Dra. María Teresa Libreros Ochoa
Coordinadora Estatal del SISVEA

Yucatán

Dra. Mirza Margarita Teckumi

Lic. Gabriela Molina Morín
Responsable del Programa Estatal de Adicciones
Coordinadora Estatal del SISVEA

Zacatecas

Dra. Lucía Reyes Veyna
Jefa del Departamento de Epidemiología Estatal

Lic. Patricia Vargas Romo
Coordinadora Estatal del SISVEA



ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	11
Resultados por Fuentes de información	
1. Centros de tratamiento	14
2. Consejo Tutelar de Menores.....	29
3. Servicio Médico Forense.....	30
4. Servicio de Urgencias Hospitalarias.....	33
Conclusiones.....	35
Glosario	37



INFORME DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES (SISVEA) MEXICO 2007

INTRODUCCIÓN

El abuso de sustancias tanto lícitas como ilícitas es un problema de salud con consecuencias a nivel individual y social. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del año 2002, en México la prevalencia a lo largo de la vida del trastorno de uso de sustancias es de 9.2% en mayores de edad, y la dependencia al alcohol alguna vez en la vida afecta al 5.9% de la población¹. Este consumo se inicia frecuentemente durante la adolescencia, afectando a las personas en un momento crucial del desarrollo, y limitando en muchos casos su potencial de crecimiento individual y productividad social. En la encuesta de estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México, realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría en el periodo escolar 2002-2003, se encontró que el 35.2% de los estudiantes había consumido alcohol en el último mes, y el 4.6% había consumido alguna sustancia psicoactiva en el mismo periodo².

Para encausar la planeación de acciones de prevención y atención a la salud en el campo de las adicciones, es necesario contar con información acerca de la situación epidemiológica de ellas. En la mayor parte de los padecimientos de interés en salud pública, la información epidemiológica puede ligarse de manera relativamente sencilla a la búsqueda de atención. La detección y registro de casos se hace en el momento del contacto del enfermo con las unidades de salud, y puede suponerse con un grado razonable de certeza que de esta manera se están

¹ Medina-Mora et al (2003). Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: Resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. *Salud Mental*, 26(4): 1-16.



captando buena parte de los eventos. En cambio, la búsqueda de atención por parte de quienes presentan trastornos de uso de sustancias es limitada, y cuando lo hacen generalmente acuden a servicios diferentes a los que tradicionalmente sirven de insumo a la vigilancia epidemiológica. Es por ello que para la obtención de información acerca de la situación a nivel poblacional de las adicciones se requiere el uso de métodos diversos, dibujando un panorama compuesto a través de un proceso de triangulación³ que combina información de diversas fuentes.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) es un componente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) que tiene como objetivo conocer el panorama de uso de sustancias en México. Siguiendo el principio de triangulación mencionado, el SISVEA recoge e integra información de cuatro fuentes principales. En primer lugar, se obtienen datos de manera rutinaria de centros de tratamiento y rehabilitación operados por organizaciones no gubernamentales, entre ellos grupos de auto-ayuda como el de Alcohólicos Anónimos, así como de los Centros de Integración Juvenil (CIJ). La segunda fuente de información son los Consejos Tutelares de Menores, y la tercera los Servicios Médicos Forenses. Por último, se llevan a cabo de manera periódica encuestas en servicios de urgencias de hospitales de segundo nivel, donde se recaban datos sobre la asociación entre ingresos a esos servicios y uso de sustancias. Estas estrategias se representan en la Figura 1


La información que el SISVEA recopila tiene características que deben considerarse en su interpretación epidemiológica. Primero, se trata de un sistema que registra eventos, y no casos,

² Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Hernández, M., Fleiz, C., Amador, N. G. & Bermúdez, P. (2005). La encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de la Ciudad de México: Noviembre 2003. Prevalencias y evolución del consumo de drogas. *Salud Mental*, 28 (1): 38-51.

³ Hammersley, M. y Atkinson, P. (1983). *Ethnography: principles in practice*. Routledge, Londres.

de modo que una misma persona puede ingresar de manera repetida al mismo. Por ejemplo, si alguien ingresa en más de un ocasión a un centro de tratamiento, será contado como dos eventos o “casos” dentro del sistema. En segundo lugar, el SISVEA recoge información de usuarios de sustancias con características particulares. Por lo anterior, no sería apropiado utilizar los datos del SISVEA como numerador en el cálculo de frecuencias a nivel poblacional. En cambio, estos datos son útiles para monitorear de manera constante las tendencias en patrones de consumo, incluyendo sustancias de inicio y sustancias que motivan la búsqueda de atención, y la relación entre consumo y otros daños a la salud como los accidentes.

Figura 1



El presente informe describe las actividades del SISVEA durante el año 2007. Se presentan los resultados de cada una de las fuentes de información, y se exponen conclusiones generales acerca de la situación de las adicciones en México.



RESULTADOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN

1. CENTROS DE TRATAMIENTO

El SISVEA recopila información de **centros de tratamiento**⁴ a las adicciones, muchos de ellos operados por organizaciones de la sociedad civil. La información proviene de cuestionarios que se aplican a quienes acuden a solicitar atención. Así, los datos corresponden a personas cuyo problema de **adicción** ha evolucionado hasta un punto que les hace percibir la necesidad de buscar ayuda, ya sea de manera voluntaria, o llevados por familiares, amigos u otros, de manera que representan a un grupo particular de los usuarios de **drogas** en el país.

De la información contenida en el cuestionario de centros de tratamiento, la principal corresponde a la **droga de inicio** y **droga de impacto**. La primera es aquella con la que el usuario reporta haber comenzado el uso de sustancias, y la segunda, la que motiva la búsqueda de atención o la que el usuario percibe como aquella que le ha traído más consecuencias negativas laborales, familiares o sociales.

CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES

Durante el año 2007, reportaron al SISVEA 626 centros de tratamiento (CT) no gubernamentales, ubicados en las 32 entidades federativas del país. La mayor parte se encuentra en grandes ciudades. El 91% de ellos da tratamiento tanto a usuarios de **alcohol** como a usuarios de sustancias ilícitas. En el 55% de los centros el servicio es gratuito o se cobra sólo una cuota voluntaria.

En este año se reportaron un total de 64,917 tratamientos otorgados en estos centros, lo que no necesariamente corresponde al número de pacientes atendidos, ya que un mismo paciente pudo haber acudido más de una vez en busca de atención.



Entre las personas que buscaron ayuda especializada en estos CT, la droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por el 31.5% de los que respondieron al cuestionario. En segundo lugar se mencionó la **cocaína**, que alcanzó el 23.4% de los registros, y el cristal⁵ se ubicó como la tercer droga con 16.3%, seguido por la **heroína** con 10.5% (Cuadro 1).

La mayor parte (91%) de los registros en CT fueron de hombres, reflejando por una parte la mayor prevalencia de uso de sustancias en el sexo masculino, pero también las diferencias por género en la búsqueda de atención que consistentemente se refieren en la literatura⁶. Es interesante observar que la mayor proporción de mujeres se encontró entre quienes mencionaron al refractil como droga de impacto, resultado tal vez de la facilidad de adquisición de esta sustancia.

Si bien el mayor porcentaje de los entrevistados tenía 35 años de edad o más, el 15% era menor de edad, y un gran número eran adultos jóvenes. El porcentaje de jóvenes fue mayor entre los usuarios que mencionaron como droga de impacto a la **mariguana** y los **inhalables**. Por otro lado, entre los que tuvieron como droga de impacto a la cocaína y el cristal, más del 40% eran adultos jóvenes. En cambio, el mayor porcentaje de adultos de 35 años o más se encontró en los que mencionaron alcohol como droga de impacto.

En cuanto a los **patrones de consumo**, como sería de esperar en usuarios que solicitan atención en un CT, la mayor parte de los entrevistados hacía un uso diario de la sustancia de impacto. El uso se inició en forma temprana en la mayoría de ellos, y la droga de inicio que se mencionó con mayor frecuencia fue el alcohol. El **tabaco** y la mariguana se mencionaron con frecuencias muy similares entre sí como droga de inicio, pero esto podría deberse a que quienes respondieron al cuestionario no consideraron al tabaco como una droga.

⁴ Los términos **en negritas** se definen en el Glosario

⁵ En los registros del SISVEA, la categoría “cristal” incluye a todas las anfetaminas, entre ellas MDMA (éxtasis).

⁶ Belló, M., Puentes-Rosas, E. & Medina-Mora, M. E. (2008). El papel de género en la demanda de atención por problemas asociados al consumo de alcohol en México. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 23(4): 231-236.



Cuadro 1
Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales
según Droga de Impacto, 2007

Características	Global N = 64,917	Mariguana n= 5,157	Alcohol n= 20,445	Inhalables n= 3,067	Tabaco n= 1,523	Tranquilizantes n= 579	Cocaína * n= 15,198	Heroína n= 6,835	Cristal 10,613	Rohypnol n= 72	Refractil n= 3	Otras D. Médicas** n= 287	Otras D. Ilícitas*** n= 1,138
Sexo													
Masculino	91.2	94.2	90.9	88.7	77.6	78.1	92.8	93.8	90.9	90.3	66.7	81.2	83.9
Femenino	8.8	5.8	9.1	11.3	22.4	21.9	7.2	6.2	9.1	9.7	33.3	18.8	16.1
Edad													
14 años o menos	1.6	3.2	1.0	11.9	2.7	1.4	1.3	0.1	0.6	1.4	0.0	1.0	1.0
15 - 19 años	13.8	28.3	7.2	38.3	16.3	16.6	16.1	3.3	14.6	19.4	0.0	13.2	19.2
20 - 24 años	17.2	23.2	9.2	20.6	13.7	13.5	23.2	11.5	24.0	12.5	33.3	15.7	23.3
25 - 29 años	16.6	15.1	10.8	12.7	13.1	14.7	20.9	19.7	21.8	15.3	66.7	17.8	21.9
30 - 34 años	14.6	11.0	13.0	6.8	10.6	14.0	15.8	20.0	16.9	22.2	0.0	17.4	13.2
35 años o más	36.1	19.2	58.8	9.7	43.5	39.9	22.7	45.4	22.0	29.2	0.0	34.8	21.5
Escolaridad													
Sin escolaridad	5	3.2	9.3	5.6	4.5	2.2	2.4	3.5	2.5	5.6	0.0	2.1	1.9
Primaria	33.8	31.7	38.5	45.5	29.0	31.3	27.5	39.3	29.8	30.6	0.0	22.3	29.2
Tec. Post-primaria	0.8	0.9	0.9	0.8	1.2	0.9	0.7	0.9	0.8	0.0	0.0	0.7	0.7
Secundaria	35.4	38.1	27.1	39.0	32.5	30.2	38.6	38.5	42.1	41.7	33.3	37.6	44.5
Tec. Post-secundaria	1.4	1.4	1.6	0.8	3.3	3.6	1.7	0.8	0.8	1.4	0.0	2.1	1.1
Bachillerato	17.6	19.2	14.2	7.7	18.1	19.5	22.2	15.2	21.0	15.3	66.7	22.6	19.3
Licenciatura	5.5	5.2	7.8	0.7	11.1	10.9	6.5	1.7	2.7	5.6	0.0	9.8	3.0
Posgrado	0.4	0.2	0.7	0.0	0.5	1.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	2.8	0.3
Estado Civil													
Soltero	50.1	66.8	36.9	78.2	41.6	44.4	50.0	53.4	57.7	59.7	33.3	47.0	60.0
Casado	25.6	14.2	36.8	7.5	35.8	29.2	24.5	17.1	20.9	20.8	66.7	24.4	20.1
Divorciado	4	2.7	4.7	1.0	4.5	5.7	4.1	5.5	3.2	5.6	0.0	5.2	3.7
Separado	6.9	4.8	8.8	4.7	5.3	7.1	7.2	6.8	5.2	2.8	0.0	9.1	4.0
Viudo	1.3	0.7	2.4	0.4	2.6	2.1	0.6	1.2	0.5	2.8	0.0	0.7	1.1
Unión libre	12.1	10.9	10.5	8.3	10.1	11.6	13.6	16.0	12.4	8.3	0.0	13.6	11.1
Situación Laboral													
Estudiante	4.9	11.7	4.1	10.8	9.0	6.9	5.1	1.1	2.7	7.1	0.0	5.6	5.1
Desempleado	28.2	23.7	21.2	25.8	14.4	26.1	28.9	44.5	34.7	18.6	0.0	25.2	34.5
Desocupado	12.2	12.3	9.4	17.8	8.1	11.6	11.9	14.5	14.5	18.6	33.3	19.6	18.8
Trabajo fijo	26.2	24.1	31.0	17.9	34.1	28.8	30.3	16.9	19.9	25.7	33.3	23.4	21.5
Trabajo ocasional	25.4	27.1	29.6	26.6	24.2	18.5	22.3	20.6	25.4	27.1	33.3	19.9	14.4
Ama de casa	2.4	0.8	3.0	0.9	7.5	6.9	1.3	2.1	2.6	2.9	0.0	5.2	5.3
Jubilado	0.7	0.3	1.6	0.2	2.6	1.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	1.0	0.4
Acudió													
En forma voluntaria	46.2	33.8	36.4	27.5	60.5	50.1	51.0	73.5	51.6	58.3	33.3	49.5	30.1
Por amigos o familia	44	43.7	56.3	50.2	24.4	34.5	39.0	24.1	39.9	34.7	66.7	42.5	65.6
Por indicación legal	7	19.6	4.8	19.4	10.2	11.9	7.8	1.0	3.9	5.6	0.0	4.9	3.6
Por indicación médica	0.5	0.6	0.5	0.4	2.2	2.1	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	1.0	0.2
Otros	2.2	2.4	1.9	2.6	2.7	1.4	1.7	1.2	4.2	1.4	0.0	2.1	0.4

* Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

*** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



Cuadro 1 (continuación)
Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales
según Droga de Impacto, 2007

Características	NACIONAL												
	Global N = 64,917	Mariguana n= 5,157	Alcohol n= 20,445	Inhalables n= 3,067	Tabaco n= 1,523	Tranquilizantes n= 579	Cocaína * n= 15,198	Heroína n= 6,835	Cristal 10,613	Rohypnol n= 72	Refractil n= 3	D. Médicas** n= 287	D. Ilícitas*** n= 1,138
Frecuencia Actual													
Diario	73.0	80.1	60.4	73.2	86.0	76.7	69.5	96.2	80.1	58.3	66.7	77.3	86.6
2 - 3 veces por semana	9.9	8.9	12.5	11.4	4.6	7.1	12.0	1.3	9.1	22.2	0.0	8.4	4.6
1 vez por semana	10.5	5.7	16.3	9.1	4.8	6.9	12.3	1.5	7.0	5.6	0.0	9.8	5.5
1 - 3 veces por mes	4.9	3.7	7.9	4.0	3.4	6.0	5.0	0.7	3.1	13.9	33.3	2.4	2.6
1- 11 veces al año	1.6	1.7	2.8	2.3	1.2	3.3	1.2	0.2	0.7	0.0	0.0	2.1	0.7
Edad de Inicio													
9 años o menos	5.0	5.6	3.9	8.0	3.9	4.3	4.8	7.7	4.4	5.6	0.0	5.9	5.3
10 - 14 años	40.6	46.5	31.0	57.5	37.1	42.7	43.0	51.7	41.3	43.1	66.7	35.5	40.3
15 - 19 años	40.8	40.6	45.3	30.6	45.1	34.1	40.8	32.0	40.4	38.9	33.3	38.0	42.4
20 - 24 años	8.3	4.9	12.0	3.0	10.1	7.1	7.0	4.9	8.2	5.6	0.0	8.7	7.4
25 - 29 años	2.9	1.4	4.1	0.5	2.1	3.3	2.5	1.8	3.1	4.2	0.0	5.6	2.5
30 - 34 años	1.2	0.6	1.7	0.2	0.7	3.1	1.0	1.1	1.3	2.8	0.0	2.1	0.8
35 años o más	1.3	0.4	2.1	0.1	1.1	5.4	0.9	0.8	1.1	0.0	0.0	4.2	1.4
Droga de Inicio													
Alcohol	41.6	25.7	80.4	19.6	19.6	28.8	33.2	9.9	20.0	26.4	66.7	28.2	20.4
Mariguana	20.1	49.3	3.9	13.6	2.8	21.2	22.2	39.5	25.8	33.3	33.3	19.2	23.2
Inhalables	5.8	5.3	1.3	49.6	1.2	7.3	5.6	7.0	2.3	8.3	0.0	8.0	2.6
Alucinógenos	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	10.5
Heroína	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	10.6	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0
Opio-Morfina y deriv.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0
Cocaína	4.7	1.6	0.8	0.7	0.5	3.1	12.0	3.0	6.6	0.0	0.0	2.4	4.0
Tranquilizantes	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	21.1	0.4	1.4	0.6	1.4	0.0	1.0	0.4
Barbitúricos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
Anfetaminas	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	13.2	0.1
Anticolinérgicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabaco	20.8	16.7	13.0	14.9	75.4	17.1	20.6	25.3	28.1	15.3	0.0	11.1	33.5
Antidepresivos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
Otros Psicotrópicos	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	3.4
Basuco o pasta base	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
Cristal	2.9	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	15.8	1.4	0.0	0.3	1.7
Flunitrazepam (Rohypnol)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
Crack	1.2	0.3	0.1	0.5	0.0	0.2	4.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2
Refractil Ofteno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Cocaína, Basuco, Crack S Shell

** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

*** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales 2007



El Cuadro 2 muestra el perfil de los usuarios de acuerdo a la droga de inicio. Se observa un mayor porcentaje de adultos jóvenes entre los que iniciaron el consumo con cocaína o sus derivados. Un mayor porcentaje de quienes iniciaron el uso con inhalables lo hicieron en edades previas a la adolescencia. El inicio con las otras sustancias ocurrió en general durante la adolescencia.

Cuadro 2
Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's)
según principales Drogas de Inicio, 2007

NACIONAL

Número	Global N= 64,917	Mariguana n= 13,063	Inhalables n= 3,763	Alcohol n= 27,010	* Cocaína n= 3,960	Heroína n= 775	Tabaco n= 13,487
Sexo							
Masculino	91.5	95.6	91.5	90.6	91.1	93.2	89.3
Femenino	8.5	4.4	8.5	9.4	8.9	6.8	10.7
Edad							
14 años o menos	1.7	1.4	6.9	1.1	1.2	0.1	1.9
15 - 19 años	13.7	16.9	27.1	9.6	14.4	2.7	15.3
20 - 24 años	17.0	20.9	19.4	12.9	26.7	11.2	18.4
25 - 29 años	16.4	18.8	16.6	14.0	21.6	17.9	17.4
30 - 34 años	14.5	14.7	12.1	14.2	16.3	18.3	14.8
35 años o más	36.7	27.4	17.9	48.2	19.7	49.7	32.1
Escolaridad							
Sin escolaridad	5.0	2.9	5.9	6.9	2.6	4.8	3.9
Primaria	33.9	33.6	48.5	33.3	26.9	38.2	33.4
Tec. Post-primaria	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	1.5	0.6
Secundaria	35.2	40.8	35.5	30.1	40.3	33.5	38.4
Tec. Post-secundaria	1.4	0.9	0.8	1.8	1.2	1.4	1.4
Bachillerato	17.6	18.0	7.7	18.0	23.7	17.9	17.3
Licenciatura	5.6	2.7	0.7	8.4	4.3	2.5	4.7
Posgrado	0.4	0.2	0.0	0.7	0.3	0.1	0.3
Estado Civil							
Soltero	59.2	66.8	41.3	50.7	54.5	52.5	49.8
Casado	17.4	11.7	33.1	25.3	20.9	23.6	25.8
Divorciado	3.7	2.1	4.6	3.9	5.5	3.8	4.1
Separado	5.9	6.3	8.2	6.1	6.1	6.4	7.0
Viudo	0.7	0.5	1.8	0.7	1.5	1.2	1.3
Unión libre	13.2	12.5	11.0	13.3	11.5	12.6	12.0
Edad de Inicio							
9 años o menos	5.1	4.5	11.0	4.2	1.1	0.8	7.4
10 - 14 años	41.3	49.7	60.3	33.4	22.6	16.3	50.9
15 - 19 años	40.9	39.6	25.6	45.7	43.9	40.0	35.9
20 - 24 años	7.9	4.4	2.5	10.4	16.7	21.5	4.4
25 - 29 años	2.6	1.2	0.3	3.4	8.5	10.2	0.9
30 - 34 años	1.0	0.4	0.1	1.3	3.7	6.6	0.3
35 años o más	1.1	0.2	0.1	1.6	3.5	4.6	0.3
Frecuencia de consumo							
Diario	64.8	78.6	73.3	45.4	58.7	93.5	88.0
2 - 3 Veces por semana	10.4	7.3	10.5	15.1	11.5	1.2	4.2
1 Vez por semana	14.4	7.2	8.8	23.8	18.6	1.8	3.9
1 - 3 Veces por mes	7.9	4.8	5.1	12.3	8.7	3.1	3.0
1- 11 Veces al año	2.5	2.1	2.3	3.5	2.5	0.4	0.9

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007


* Cocaína, Basuco, Crack



En la Gráfica 1 se presentan las tendencias de droga de inicio y droga de impacto a lo largo de los últimos 14 años. El alcohol y la marihuana se mantienen como las principales drogas de inicio, pero el primero ha mostrado un ascenso constante en este periodo. Se observa también la aparición y ascenso del cristal como droga de impacto hasta el año 2005, y la disminución en el porcentaje de entrevistados que reporta el uso de heroína. Esta es una tendencia a nivel nacional, que presenta variaciones entre las regiones del país (Gráfica 2). En la región norte (Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Tamaulipas), la heroína pasó en los últimos años de ocupar el primer lugar como droga de impacto, a un segundo lugar, y el reporte de uso de cristal se incrementó de manera lineal entre los años 2000 y 2005, para disminuir ligeramente en el 2006 y 2007. En las regiones centro (Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) y sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) el alcohol se mantiene como el principal problema. En la región sur, sin embargo, a partir del año 2001 se incrementó el porcentaje de usuarios que mencionaron a la cocaína como droga de impacto.

Gráfica 1

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
NACIONAL




* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



Grafica 2

Tendencia Droga de Impacto en Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007 según región




* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007




En el año 2007, el alcohol, el tabaco y la mariguana se reportaron principalmente como drogas de inicio. El alcohol se reportó también como droga de impacto. El cristal, el crack y la cocaína se reportaron principalmente como drogas de impacto (Gráficas 3 y 4).

Gráfica 3
Droga de Inicio y Droga de Impacto más frecuentes por Entidad Federativa en Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's), 2007



Fuente: SISVEA, Centros de Tratamientos No Gubernamentales, 2007

Gráfica 4
Principales Drogas de Inicio y de Impacto por regiones, reportadas en Centros de Tratamiento No gubernamentales (ONG'S), 2006



N = 64,917

Fuente: SISVEA, Centros de Tratamientos No Gubernamentales 2007


A través de la información recabada por los CT podemos conocer también la **historia natural del consumo de drogas**, desde la primera sustancia de elección de los usuarios hasta las que utilizan en fases posteriores. Los diagramas 1 a 4 muestran la historia natural del consumo de mariguana, inhalables, alcohol y cocaína. Estos diagramas muestran el porcentaje de aquellos entrevistados que reportaron haber iniciado con una sustancia, y posteriormente iniciaron el uso de una segunda y, en algunos casos, tercera, así como las sustancias que con más frecuencia se utilizan en cada paso.



El 92% de quienes habían iniciado con marihuana, el 81% de quienes habían iniciado con inhalables, el 68% de quienes iniciaron con alcohol y el 70% de quienes lo hicieron con cocaína, pasaron a una segunda sustancia, y una elevada proporción de estos usuarios de dos sustancias transitó posteriormente a una tercera.

Diagrama 1
Historia Natural del consumo de Marihuana
2007


Centros de Tratamiento No Gubernamentales



Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007

Diagrama 2
Historia Natural del consumo de Inhalables
2007

Centros de Tratamiento No Gubernamentales




Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



Diagrama 3
Historia Natural del consumo de Alcohol
2007


Centros de Tratamiento No Gubernamentales



Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007

Diagrama 4
Historia Natural del consumo de Cocaína
2007

Centros de Tratamiento No Gubernamentales



Fuente: SISVEA, Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, 2007

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) proporcionan al SISVEA información sobre el consumo de drogas obtenida a partir de la aplicación de la entrevista inicial a sus pacientes de primer ingreso. Para el periodo de enero a diciembre del 2007 se obtuvo información de 24,221 pacientes que solicitaron ayuda en este tipo de centro. Las principales sustancias que motivaron la demanda de tratamiento fueron cocaína (26.8%), alcohol (20.6%), tabaco (15.7%), marihuana (12.1%), inhalables (11%), y estimulantes (6.6%) (Cuadro 3). Es importante mencionar que la clasificación de sustancias utilizada por CIJ agrupa como “estimulantes” a las anfetaminas, y los antidepresivos, y como “depresores” a tranquilizantes, barbitúricos y rohypnol, de manera que sus categorías no son estrictamente comparables con las de otras fuentes de información del SISVEA.

Del mismo modo que en los CT, acudieron a solicitar atención a los CIJ más hombres (78.0%) que mujeres. Sin embargo, entre los usuarios de **drogas de diseño**, depresores y tabaco, se observaron proporciones importantes de mujeres. La población que atienden los CIJ es más joven y con mejor nivel educativo, en comparación con la de los CT. La droga de inicio reportada con mayor frecuencia fue el tabaco (57.8%), reflejando probablemente una percepción del tabaco como droga más clara que entre quienes acudieron a los CT. Los CIJ proporcionan información acerca del nivel socioeconómico de la población atendida. Observamos que entre los usuarios de drogas de diseño, **alucinógenos** y tabaco hay mayores proporciones de personas de nivel socioeconómico medio alto y alto, en comparación con los que solicitaron atención por otras sustancias (Cuadro 4).



Cuadro 3
Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil
según Droga de Impacto, 2007
NACIONAL

Características	Global N=24,221	Tabaco n = 3,810	Alcohol 4,984	Mariguana n = 2,924	Cocaína n = 6,504	Inhalables n = 2,672	Estimulantes n = 1,612	De diseño n = 53	Alucinógenos n = 83	Depresores n = 352	Opiáceos n = 436	Otras n = 45
Sexo	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Masculino	78,0	56,3	74,9	88,9	88,3	78,3	79,2	57,7	80,7	63,4	86,9	51,1
Femenino	22,0	43,7	25,1	11,1	11,7	21,7	20,8	42,3	19,3	36,6	13,1	48,9
Edad actual												
9 ó menos	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
10-14	8,7	5,4	7,6	8,5	2,0	37,2	3,2	3,8	2,4	7,4	,5	8,9
15-19	25,8	12,3	23,6	46,8	18,2	48,7	22,3	39,6	57,3	25,9	5,7	26,7
20-24	17,3	9,3	15,4	20,1	25,2	7,4	23,5	24,5	30,5	9,9	14,9	8,9
25-29	13,9	9,1	13,4	9,2	21,6	3,0	20,1	15,1	3,7	12,8	22,5	15,6
30-34	11,0	9,0	12,6	5,7	15,8	1,8	15,1	13,2	2,4	9,9	15,9	6,7
35 y más	23,4	54,9	27,5	9,6	17,2	2,0	15,9	3,8	3,7	34,1	40,5	33,3
Estado Civil												
Soltero	52,2	34,3	49,5	73,6	43,5	86,0	44,5	67,9	89,2	52,8	38,3	57,8
Casado	21,1	36,3	24,2	9,0	24,6	2,2	17,4	5,7	2,4	24,4	11,2	22,2
U. Libre	11,9	9,0	10,9	7,7	16,7	4,7	20,9	11,3	4,8	8,0	25,5	,0
Separado	7,8	8,8	7,9	4,3	10,0	1,9	10,9	9,4	2,4	6,5	17,7	11,1
Divorciado	2,1	4,6	2,3	,6	2,0	,2	2,4	1,9	1,2	2,6	3,2	,0
Viudo	,9	3,6	,7	,2	,2	,1	,1	1,9	,0	1,4	1,1	4,4
No Específica	3,9	3,5	4,6	4,6	3,0	4,8	3,8	1,9	,0	4,3	3,0	4,4
Escolaridad												
Sin est.No sabe	,6	,7	,5	,9	,5	,6	1,3	,0	,0	,3	,7	,0
Sin est. Sabe le	,5	1,0	,7	,3	,2	,4	,3	1,9	,0	,6	,7	,0
Primaria	15,5	16,8	14,4	12,8	14,7	14,6	21,4	1,9	,0	19,1	32,8	11,1
Secundaria	42,9	31,3	37,8	41,2	43,9	68,1	44,9	32,1	34,9	40,9	39,5	35,6
Técnico o come	4,2	9,0	4,0	2,2	3,9	1,6	2,9	5,7	1,2	6,6	2,8	11,1
Bachillerato	25,5	22,3	27,7	34,6	27,4	13,7	23,3	45,3	42,2	22,9	17,7	24,4
Licenciatura	10,3	17,7	14,4	7,7	9,0	1,0	5,8	13,2	20,5	9,4	5,8	13,3
Posgrado	,5	1,3	,5	,2	,4	,0	,1	,0	1,2	,3	,0	4,4
Ocupación												
Estudiante	19,2	12,4	21,1	33,5	6,7	49,7	7,5	34,1	33,3	18,2	1,2	27,9
Estudia y trabaj	3,7	3,6	4,5	6,5	2,3	4,4	1,1	4,5	9,0	3,6	1,5	2,3
Laboral estable	31,0	39,0	36,5	20,0	37,5	8,7	28,0	22,7	7,7	30,3	28,1	37,2
Laboral inestabl	16,7	12,3	15,1	16,5	21,3	11,5	20,2	6,8	14,1	13,9	27,6	11,6
Desempleado	8,2	4,7	6,5	8,5	11,9	5,2	11,5	11,4	3,8	8,2	10,9	,0
Desocupado	14,2	6,9	10,4	13,4	17,0	17,4	25,1	18,2	29,5	12,1	25,6	4,7
Hogar	5,9	16,4	5,1	1,5	3,2	3,0	6,5	2,3	2,6	13,3	4,7	16,3
Pensionado	1,0	4,7	,7	,1	,2	,0	,0	,0	,0	,3	,2	,0
Nivel Socioeconómico												
Alto	,9	1,6	1,3	1,0	,6	,1	1,0	2,0	1,2	,9	1,4	2,3
Medio alto	14,2	22,3	14,3	15,4	12,5	7,0	12,6	22,0	32,1	14,5	8,9	11,6
Medio bajo	59,6	58,0	59,7	59,0	62,8	58,0	56,3	52,0	55,6	61,5	49,9	72,1
Bajo	24,3	17,5	24,2	23,2	23,6	33,2	28,7	24,0	11,1	21,2	37,3	14,0
Pobreza extrem	,9	,6	,6	1,4	,5	1,7	1,5	,0	,0	1,8	2,4	,0
Droga de inicio												
Tabaco	57,8	78,0	49,2	54,2	59,1	49,0	54,4	45,3	56,6	47,0	63,5	43,2
Alcohol	29,5	18,4	45,9	27,7	26,7	24,2	31,6	39,6	34,9	27,1	16,1	31,8
Mariguana	5,7	2,1	2,7	14,2	6,2	3,6	7,4	3,8	3,6	8,5	11,5	4,5
Cocaína	1,5	,2	,6	,8	3,9	,3	1,8	1,9	2,4	,3	1,6	2,3
Inhalables	4,6	1,0	1,3	2,7	3,5	22,7	1,3	,0	1,2	3,7	5,5	,0
Estimulantes	,3	,1	,1	,1	,2	,1	2,9	3,8	,0	,0	,0	,0
De diseño	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	5,7	,0	,0	,0	,0
Alucinógenos	,1	,0	,0	,1	,1	,0	,1	,0	1,2	,0	,0	,0
Depresores	,4	,1	,1	,1	,4	,1	,4	,0	,0	12,8	,2	2,3
Opiáceos	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,1	,0	,0	,3	1,6	,0
Otras	,1	,1	,0	,1	,0	,0	,1	,0	,0	,3	,0	15,9

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007



Cuadro 4
Perfil Sociodemográfico de la Población que acude a Centros de Integración Juvenil
según Droga de Inicio, 2007

NACIONAL

CARACTERÍSTICAS	Global N = 24,221	Tabaco n = 13,893	Alcohol n = 7,165	Mariguana n = 1,377	Cocaína n = 366	Inhalables n = 1,130	Estimulantes n = 77	De diseño n = 5	Alucinógenos n = 12	Depresores n = 104	Opiáceos n = 10	Otras n = 19
SEXO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
MASCULINO	77,9	76,5	77,9	91,0	83,8	81,3	67,5	40,0	91,7	52,9	80,0	47,4
FEMENINO	22,1	23,5	22,1	9,0	16,2	18,7	32,5	60,0	8,3	47,1	20,0	52,6
EDAD ACTUAL												
9 Ó MENOS	,0	0,0	0,0	,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-14	9,0	7,8	8,9	5,3	4,7	30,4	12,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,5
15-19	25,8	24,6	26,8	29,9	23,9	32,2	26,7	80,0	16,7	9,7	10,0	21,1
20-24	17,0	17,3	16,5	18,8	29,7	11,3	20,0	20,0	25,0	9,7	20,0	15,8
25-29	13,8	13,6	14,3	14,5	18,1	9,6	18,7	0,0	41,7	15,5	10,0	10,5
30-34	11,0	10,7	11,6	11,8	12,4	7,6	5,3	0,0	8,3	23,3	20,0	5,3
35 Y MAS	23,4	26,0	21,9	19,6	11,3	9,0	17,3	0,0	8,3	31,1	40,0	36,8
Estado Civil												
Soltero	52,4	50,4	53,3	55,0	50,5	70,2	55,8	100,0	50,0	39,4	30,0	52,6
Casado	21,0	22,6	20,5	18,1	19,4	8,8	13,0	0,0	16,7	34,6	40,0	26,3
U. Libre	11,9	11,6	12,0	14,3	17,2	10,4	10,4	0,0	8,3	6,7	10,0	0,0
Separado	7,8	8,2	7,5	7,0	7,4	4,8	18,2	0,0	8,3	9,6	0,0	5,3
Divorciado	2,1	2,5	1,9	1,1	,8	1,0	0,0	0,0	8,3	2,9	10,0	0,0
Viudo	,9	1,1	,8	,1	0,0	,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	10,5
No Especifica	3,9	3,6	4,1	4,4	4,6	4,6	2,6	0,0	8,3	5,8	10,0	5,3
Escolaridad												
Sin est.No sabe leer ni escribir	,6	,6	,7	1,0	,6	,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Sin est. Sabe leer escribir	,5	,5	,5	,4	,6	,8	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Primaria	15,5	16,0	12,9	17,0	18,3	21,2	22,4	0,0	8,3	25,5	40,0	21,1
Secundaria	43,2	42,4	41,4	46,6	44,7	62,4	47,4	0,0	33,3	30,4	30,0	31,6
Técnico o comercial	4,2	4,7	3,8	3,0	2,2	2,0	1,3	0,0	16,7	7,8	0,0	15,8
Bachillerato	25,4	24,8	28,9	25,3	24,4	10,9	22,4	100,0	25,0	21,6	20,0	31,6
Licenciatura	10,1	10,7	11,2	6,3	8,6	1,9	5,3	0,0	16,7	10,8	10,0	0,0
Posgrado	,4	,4	,5	,5	,6	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Ocupación												
Estudiante	19,6	17,2	22,6	15,8	10,4	37,0	21,3	80,0	0,0	16,7	11,1	33,3
Estudia y trabaja	3,7	3,6	4,1	2,9	3,1	3,2	1,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Laboral estable	30,7	31,5	31,1	30,6	32,1	19,2	28,0	0,0	41,7	25,0	33,3	38,9
Laboral inestable	16,9	16,9	16,0	21,3	20,2	15,7	20,0	0,0	25,0	15,6	11,1	11,1
Desempleado	8,1	8,3	7,6	10,1	12,5	6,8	6,7	20,0	16,7	5,2	0,0	0,0
Desocupado	14,1	14,2	12,8	17,3	18,3	14,7	16,0	0,0	16,7	13,5	44,4	5,6
Hogar	5,9	6,9	5,3	1,8	3,4	3,2	6,7	0,0	0,0	18,8	0,0	11,1
Pensionado	1,0	1,4	,6	,1	0,0	,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Nivel Socioeconómico												
Alto	,9	1,0	1,1	,6	,3	,2	2,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Medio alto	14,1	14,9	14,7	11,9	11,6	6,0	8,6	20,0	25,0	11,0	10,0	11,1
Medio bajo	59,6	59,7	60,3	58,0	63,1	54,2	64,3	60,0	58,3	60,0	70,0	61,1
Bajo	24,4	23,5	23,3	28,5	23,5	37,5	24,3	20,0	16,7	25,0	20,0	27,8
Pobreza extrema	,9	1,0	,6	1,1	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0


Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007



Respecto a la comparación entre la droga con que se iniciaron en el consumo estos pacientes y aquella que reportan como la de mayor impacto, es evidente que el tabaco (57.4%) y el alcohol (29.6%) permanecen como las principales drogas de inicio, mientras que al observar la droga de impacto el mayor porcentaje se reporta en la cocaína (26.9%), seguida por el alcohol (20.6%) (Gráfica 5).

Gráfica 5
Droga de Inicio e Impacto en pacientes de Centros de Integración Juvenil, 2007



Fuente: SISVEA, Centros de Integración Juvenil, 2007



2. CONSEJO TUTELAR DE MENORES.

Esta fuente proporciona datos específicos sobre el grupo de individuos menores de edad que son detenidos por cometer infracciones. El cuestionario correspondiente se aplica a quienes ingresan al Consejo Tutelar de Menores (CTM). Durante el año 2007 se tuvieron reportes de CTM de las 32 entidades federativas, con información sobre 7,230 detenidos. De ellos, el 52.3% (3,779) mencionó consumir drogas de forma habitual, y 1179 (16.3%) cometieron la infracción bajo el efecto de alguna sustancia (cuadro 5). El 93% de los detenidos eran hombres. La droga más utilizada entre estos menores infractores fue la marihuana (25.2%), seguida por alcohol (21.5%), tabaco (21.2%), cocaína (11.3%) e inhalables (10.5%) (Cuadro 5).

Cuadro 5
Características sociales y tipo de infracción cometida por los
menores infractores usuarios de drogas
2007

Características	Global N = 7,230	Marihuana n = 1,823	Inhalables n = 761	Alcohol n = 1,554	Cocaína n = 816	Heroína n = 28	Tabaco n = 1,530	Cristal n = 415
Sexo								
Masculino	93.0	96.5	96.1	95.7	94.5	100.0	96.0	91.6
Femenino	7.0	3.5	3.9	4.3	5.5		4.0	8.4
Edad								
5 - 9 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 - 14 años	15.1	3.5	13.3	8.3	8.6		9.5	7.4
15 - 18 años	84.9	90.7	86.7	91.7	91.4	100.0	90.5	92.6
Escolaridad								
Primaria	39.8	49.5	54.9	39.7	49.8	50.0	41.4	52.3
Secundaria	45.9	41.0	36.5	46.0	40.0	25.0	46.6	41.0
Prepa	10.1	5.7	2.8	10.6	4.4	10.7	8.1	2.9
Licenciatura o posgrado	0.1	0.1		0.2			0.1	0.2
No estudio	4.1	3.7	5.8	3.4	5.8	14.3	3.7	3.6
Ocupación								
Estudiante	24.7	12.0	12.4	18.7	9.1	10.7	16.5	6.0
Empleado	24.0	27.7	23.3	23.9	27.0	25.0	23.0	29.2
Subempleado	32.4	35.6	44.7	42.7	39.6	50.0	44.2	30.4
Hogar	2.3	1.0	1.2	1.7	2.1		1.3	1.4
Ninguna	16.6	23.6	18.4	12.9	22.2	14.3	15.1	33.0
Presenta tatuajes								
Sí	20.4	34.5	30.5	25.5	34.1	64.3	27.6	34.7
No	79.6	65.5	69.5	74.5	65.9	35.7	72.4	65.3
Pertenece a una banda								
Sí	14.1	27.4	27.6	13.0	31.9	39.3	13.8	22.7
No	85.9	72.6	72.4	87.0	68.1	60.7	86.2	77.3
Infracción bajo intoxicación								
Sí	16.3	28.4	34.0	29.7	33.3	29.6	21.3	35.7
No	83.7	71.6	66.0	70.3	66.7	70.4	78.7	64.3
Tipo de infracción								
Robo	65.0	67.0	74.5	62.2	73.2	82.1	64.2	72.3
Violación	5.8	4.0	3.3	6.3	4.9		5.9	2.9
Homicidio	4.2	4.9	5.8	7.1	4.5	3.6	5.4	1.9
Lesiones a terceros	9.0	4.7	4.7	10.4	4.5	3.6	8.3	3.6
Daños a propiedad ajena	5.1	3.6	3.2	6.1	4.0		5.3	2.2
Secuestro	0.7	0.7	0.3	0.9	0.5	3.6	1.1	0.2
Delitos contra la salud	5.3	10.2	3.4	5.3	10.2	7.1	6.7	8.0
Consumo de drogas	1.7	4.8	3.9	0.4	2.2		0.6	4.6
Posesión/ arma	7.9	8.4	5.0	5.0	6.9	3.6	5.2	14.2
Otras	8.7	6.3	5.0	4.6	4.7	10.7	5.0	9.6
Lugar de la infracción								
VIA PUBLICA	74.1	74.2	78.0	74.7	72.1	67.9	73.7	66.5
HOGAR	14.8	14.2	13.6	12.6	18.2	21.4	13.5	20.5
TRABAJO	2.0	2.1	0.9	2.9	1.2	3.6	2.8	1.4
ESCUELA	1.2	0.8	0.3	1.2	0.6		1.6	0.5
AEROPUERTO INTERNAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LUGAR DE RECREO	1.6	1.1	1.8	2.1	0.6	3.6	1.4	0.5
OTRO	6.2	7.5	5.4	6.5	7.3	3.6	7.0	10.6




3. SERVICIO MÉDICO FORENSE

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) proporciona información al SISVEA sobre la presencia de sustancias en los casos de muertes que ocurrieron en circunstancias no naturales, a través de una cédula de reporte que llena el médico responsable. En el año 2007 participaron 21 entidades federativas en el reporte al SISVEA, ya que el resto se encuentra bien en proceso de incorporación al Sistema, o en espera de tener acceso a un laboratorio toxicológico. Los estados participantes fueron Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se contó con información de un total de 11,212 defunciones, de las cuales 2,112 (18.8%) ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia.

Entre los estados con mayor porcentaje de defunciones bajo el influjo de sustancias se encuentran Puebla (59.7%), Colima(33.3%), Querétaro y Aguascalientes con un 32.7% y 32% respectivamente (Gráfica 6). Cabe mencionar que de las muertes reportadas en el estado de Hidalgo, ninguna tuvo relación con el consumo de drogas, y el estado de Chiapas sólo reportó las muertes relacionadas con consumo de drogas.



Gráfica 6
Muertes reportadas bajo el influjo de alguna droga
durante el año 2007



N = 2,112

Fuente: SISVEA, Servicio Médico Forense, 2007

Del total de defunciones relacionadas con algún tipo de sustancia, el 91.5% fueron de hombres. El grupo de edad donde se reportó un número mayor de muertes asociadas a sustancias fue el de mayores de 40 años (34.8%), sin embargo, en las muertes asociadas con consumo de cocaína el porcentaje mayor fue de adultos jóvenes.



Las causas más comunes de defunciones bajo intoxicación fueron los accidentes de tránsito (19.8%), asfixia (16.2%), y atropellamientos (12.3%), y los lugares donde ocurrieron las defunciones con mayor frecuencia fueron la casa (35.2%) y la calle (31.2%) (Cuadro 6).

Cuadro 6
Tipo de muerte bajo intoxicación según droga
2007

	Global (bajo efecto)	Acohol	Tranquilizantes	Cocaína	Mariguana	Opioides *
	n = 2,112	n = 1,725	n = 137	n = 163	n = 94	n = 95
	%	%	%	%	%	%
Sexo						
Masculino	91.5	92.1	77.4	94.4	92.6	94.7
Femenino	8.5	7.9	22.6	5.6	7.4	5.3
Edad						
5 - 9 Años	0.3	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0
10 - 14	0.6	0.5	2.2	0.6	2.1	0.0
15 - 19	7.6	7.0	13.1	9.2	11.7	6.3
20 - 24	15.4	15.2	16.1	25.8	20.2	7.4
25 - 29	14.9	15.2	10.9	14.7	14.9	14.7
30 - 34	13.6	13.1	12.4	20.9	16.0	14.7
35 - 39	12.6	11.7	10.2	14.7	14.9	30.5
> 40	34.8	37.0	33.6	14.1	20.2	26.3
Causa de la muerte						
Atropellado	12.3	13.3	11.7	5.6	6.5	0.0
Accidente de tránsito	19.8	22.3	8.8	10.6	15.1	2.1
Caída	4.0	4.1	5.1	2.5	5.4	1.1
Electrocutado	0.4	0.3	0.0	0.6	0.0	1.1
Quemado	1.3	1.0	5.1	1.2	0.0	0.0
Golpes	2.3	2.4	0.7	4.3	6.5	1.1
Asfixia	16.2	17.5	4.4	22.4	23.7	5.3
Aplastamiento	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0
Arma de fuego	9.5	9.6	7.3	16.1	16.1	9.6
Objeto punzo-cortante	4.7	4.7	3.6	9.3	8.6	2.1
Violación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intoxicado	8.0	4.2	9.5	8.1	2.2	6.9
Envenenado	0.3	0.2	2.2	0.0	0.0	0.0
Otras	20.8	20.0	40.9	19.3	16.1	8.5
Lugar de la muerte						
Accidente automovilístico	21.8	24.8	15.4	3.1	11.8	1.1
Casa	35.2	34.9	28.7	44.8	47.3	38.9
Calle	31.2	31.1	24.3	40.5	34.4	32.6
Baños Públicos	0.2	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0
Áreas Escolares	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Áreas de Recreación	2.6	2.9	0.0	2.5	2.2	0.0
Trabajo	1.4	1.2	1.5	3.1	0.0	0.0
Áreas de Servicios	6.1	3.5	27.9	6.1	2.2	27.4
Otros	1.5	1.3	2.2	0.0	1.1	0.0

N = 11,212 "muertes registradas"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



4. SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Esta información se obtiene a partir de la realización de encuestas a todos aquellos que ingresan a salas de urgencias de hospitales seleccionados en dos **semanas típicas** al año. Se trata de una estrategia centinela que incluye los servicios de urgencias de hospitales generales y otros sitios de atención, como la Cruz Roja. En el año 2007 participaron los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Se realizaron encuestas en 189 hospitales, de los cuales el 34.9% pertenece a la zona sur, el 53.4% a la zona centro y el 16.4% a la zona norte del país.

Se registraron 17,631 ingresos, de los cuales en 7,186 el paciente refirió haber consumido alguna sustancia en los últimos 30 días (40.8%) (incluye tabaco). De los ingresados, 5739 (32.6%) había sufrido alguna lesión por causa externa. De quienes habían sufrido lesión por causa externa, 649 (3.7%), se encontraban bajo el efecto de al menos una sustancia psicoactiva al momento del ingreso. La sustancia mencionada con mayor frecuencia fue el alcohol. La mayor parte de los que se encontraban bajo el efecto del alcohol ingresaron por contusiones, caídas, o accidentes automovilísticos. En cambio, de quienes ingresaron bajo efecto de cocaína, tranquilizantes u otras drogas médicas, la mayoría requirió atención por envenenamiento o intoxicación (Cuadros 7 y 8).



Cuadro 7
Proporción de pacientes bajo influjo de drogas, atendidos debido a lesiones por causa externa en Servicios de Urgencias, según tipo de droga 2007

Lesiones por causa externa (%)	DROGA									
	Alcohol (n = 445)	Mariguana (n = 82)	Inhalables (n = 34)	Cocaína * (n = 90)	Tabaco (n = 12)	Tranquilizantes (n = 32)	Heroína (n = 6)	Cristal** (n = 22)	Otras Drogas Médicas *** (n = 14)	Otras Drogas Ilegales **** (n = 11)
Accidente de automóvil	17,5	7,9	,0	14,6	62,5	,0	,0	28,6	,0	,0
Atropellamiento	3,8	7,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Caida	22,3	18,4	13,3	14,6	,0	15,8	,0	,0	,0	50,0
Envenenamiento ó intoxicación	7,9	10,5	20,0	29,3	,0	42,1	,0	,0	50,0	,0
Contusiones	24,4	23,7	46,7	19,5	25,0	10,5	,0	28,6	25,0	,0
Herida arma de fuego	2,4	5,3	,0	4,9	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
Herida arma blanca	12,7	7,9	6,7	7,3	12,5	,0	,0	14,3	,0	50,0
Violación	,7	,0	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Quemaduras	,7	2,6	,0	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Asfixia	,0	,0	,0	,0	,0	5,3	,0	,0	,0	,0
Aplastamiento	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0
Otros	6,9	15,8	6,7	7,3	,0	26,3	,0	14,3	,0	,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	100,0	100,0	100,0

* Cocaína, Basuco, Crack

** Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivos, Morfina.

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

n = 17,631 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota: La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007

Cuadro 8
Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días 2007

Patologías (%)	DROGA										
	Tabaco (n = 3,697)	Alcohol (n = 4,699)	Analgésicos (n = 1,666)	Tranquilizantes (n = 611)	Antidepresivos (n = 282)	Anfetaminas (n = 211)	Mariguana (n = 332)	Inhalables (n = 127)	Cocaína (n = 250)	Heroína (n = 43)	Alucinógenos (n = 26)
Bronquitis / Enfisema / Asma	3.8	3.1	6.1	8.2	8.2	4.7	3.6	0.8	1.6	0.0	11.5
CA de tráquea/ Bronquios	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.5	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0
Enf. Isquémica del corazón	0.8	0.5	1.6	2.5	1.8	0.5	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0
Hipertensión	6.5	6.2	12.4	17.0	14.5	10.4	3.0	0.8	2.4	2.3	7.7
Enf. Cerebro-vascular	0.6	0.6	1.6	2.6	1.1	0.9	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0
Otra Afección Neurológica	1.1	1.0	1.4	4.1	5.3	1.4	1.8	2.4	0.8	2.3	0.0
Cirrosis / Gastritis	6.2	6.5	5.9	7.7	6.4	6.2	7.2	3.1	4.8	7.0	3.8
Sangrado del tubo digestivo	1.5	1.6	1.7	2.5	2.8	0.5	2.4	3.1	2.8	2.3	3.8
Urgencias Quirúrgicas	2.9	3.3	4.7	2.9	2.8	3.8	2.1	0.8	5.2	4.7	3.8
Psicosis Alcohólica	3.7	3.6	1.0	3.9	4.6	4.7	13.6	28.3	15.6	18.6	11.5
Afección Gineco - obstétrica	2.1	1.9	5.4	4.1	5.3	7.6	2.1	7.1	2.4	7.0	0.0
Afección Osteo - muscular	7.2	6.3	7.5	5.9	3.9	4.7	4.2	5.5	2.8	2.3	0.0
Afección Dermatológica	2.2	2.0	1.7	1.1	1.8	3.8	1.2	0.8	1.2	2.3	7.7
Diabetes Mellitus	4.6	4.2	12.0	11.8	10.3	12.3	1.5	2.4	1.6	9.3	0.0
Sida	0.4	0.3	0.6	1.3	1.8	0.5	1.2	1.6	2.0	2.3	0.0
Otras	24.1	24.2	31.2	22.9	23.0	14.2	16.9	14.2	14.8	14.0	11.5

N = 17,631

Nota: El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada pacientes pudo tener respuestas multiples



CONCLUSIONES

De acuerdo con los datos obtenidos por el SISVEA durante el año 2007, los principales puntos a destacar son:

Tendencias

- Se mantuvo la tendencia al aumento en la proporción de los pacientes que acuden a CT que reporta al alcohol como droga de inicio. Esto podría reflejar una mayor conciencia de esta sustancia como una droga, y se esperaría en los próximos años un incremento similar en el reporte de tabaco como droga de inicio, tal como se observa en los CIJ.
- En la región norte del país, se mantuvo la tendencia a la disminución de la heroína como droga de impacto en los CT. El porcentaje de usuarios que reportan al cristal como droga de impacto se estabilizó y mostró un ligero descenso en los últimos dos años en esa región.
- En la región sur del país, a partir del 2001 se ha registrado un incremento en el porcentaje de usuarios que reportan la cocaína y sus derivados como droga de impacto. Si bien este porcentaje es aún reducido en relación con el de usuarios de alcohol en la misma región, se trata de una tendencia que es necesario continuar monitoreando, y se requiere un análisis cuidadoso de las razones detrás de este incremento, así como la puesta en marcha de acciones para su control.

Grupos en riesgo

- Se observó una importante proporción de adultos jóvenes entre los usuarios de cristal y cocaína, así como entre los casos de defunciones bajo influjo de cocaína. Lo anterior apunta a un grupo en riesgo, para el cual será importante desarrollar acciones preventivas y de atención.



- La información de CIJ muestra entre los usuarios de drogas de diseño a un mayor porcentaje de personas de nivel socioeconómico medio alto o alto, que probablemente se asocia a la posibilidad de acceder a esas sustancias.

Menores infractores

- El número total de los menores infractores reportados por los Consejos Tutelares disminuyó en comparación al año anterior. Esto se debió a las reformas al código penal, de acuerdo a las cuales algunos delitos ya no ameritan internamiento, por lo que a los menores que los cometen no se les aplica la encuesta del SISVEA. Entre los menores infractores, la droga consumida con mayor frecuencia fue la marihuana.

Servicio Médico Forense

- En el Servicio Médico Forense se mantuvo el alcohol como la droga que más frecuentemente acompaña al fallecimiento. Sin embargo, es importante mencionar que existe un subregistro en el caso de otras drogas, debido a que no todos los Servicios Médicos Forenses cuentan con equipo necesario para realizar análisis específicos para detectarlas.

Salas de urgencias

- La sustancia más frecuentemente reportada en los pacientes que acudieron a servicios de urgencias fue el alcohol. Esta información, como se mencionó para el caso del SEMEFO, puede representar un subregistro debido a la falta de los protocolos y pruebas toxicológicas necesarias.



GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ABUSO: Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

ADICCIÓN: Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, un objeto, o de consumir una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

ADICTO O FARMACODEPENDIENTE: Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.

ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL: Es un depresor primario y continuo del SNC.

ALUCINÓGENOS: Sustancias que producen alteraciones mentales, emocionales y del comportamiento, semejantes a las que caracterizan a las psicosis, con desorganización de la personalidad. Suelen provocar alucinaciones, es decir, falsas impresiones sensoriales.

CENTROS DE TRATAMIENTO NO GUBERNAMENTALES (ONGs). Son centros de tratamiento o rehabilitación que atienden a individuos usuarios de sustancias psicoactivas, operados por asociaciones civiles. Generalmente ofrecen servicios gratuitos y están a cargo de adictos en recuperación. Tienen como objetivo apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo. Estos centros de tratamiento iniciaron la notificación al SISVEA a partir de 1994.

COCAÍNA: Potente estimulante del SNC que produce aumento en estado de alerta, sentimientos intensos de euforia, produce inhibición del apetito y de la necesidad de dormir.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.



DROGA DE IMPACTO: Aquella que el paciente identifica con más capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de salud, familiar, legal o laboral y que es el motivo principal de la demanda de tratamiento.

DROGA DE INICIO: Se refiere a la primera droga consumida.

DROGA DE USO ACTUAL: Aquella que el paciente refiere en uso al momento de la entrevista.

DROGA: Se define como aquella sustancia que modifica la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad tanto física como mental.

DROGAS DE DISEÑO O SÍNTESIS: Sustancias de estructura química semejante y parecidos efectos psicoactivos, sintetizadas en laboratorios. En CIJ se ha realizado una división en 4 grupos: 1. Estimulantes (éxtasis), 2. Otros estimulantes, 3. Alucinógenos (ácidos como LSD) y 4. Opioides. Los efectos que producen son taquicardia, insomnio, pérdida del apetito, sudoración anormal, náuseas, merma de la capacidad de concentración, cambios en la percepción de los colores, crisis de ansiedad, trastornos psicóticos de tipo paranoide.

DROGAS ILEGALES: Llamadas también no-médicas o duras, se definen como aquellas sustancias cuyo uso médico es nulo o no comprobado, pero se consumen para alterar intencionalmente el funcionamiento del SNC.

HEROÍNA: Potente opioide, semisintético, derivado de la morfina, tiene efectos eufóricos y analgésicos muy potentes y un potencial adictivo más alto que cualquier otro analgésico narcótico.

HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE DROGAS. Se refiere al orden cronológico en que inicio el uso de las tres primeras drogas que el paciente manifiesta consumir.



INHALABLES O SOLVENTES: Hidrocarburos solventes volátiles que se obtienen del petróleo y del gas natural, que tienen efectos psicotrópicos similares a los de otras sustancias sedantes e hipnóticos, generalmente producen distorsiones sensoriales y perceptuales temporales.

MARIGUANA: Alucinógeno leve, que induce un sentimiento de relajación, desinhibición emocional, distorsiones preceptuales y sensoriales, inhabilidad cognitiva y motora.

MONOUSUARIO: Consume solamente un tipo de droga.

PATRÓN DE CONSUMO: Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga(s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

POLIUSUARIO: Consume dos o más tipos de droga.

SEMANA TÍPICA: Se denomina al periodo de una semana (de lunes a domingo), en la cual no se presentan festividades, celebraciones, eventos especiales o puentes vacacionales, que pudieran alterar el número de ingresos en los servicios de urgencias en la localidad donde se aplica el operativo.

TABACO (*Nicotiana Tabacum*): Es una planta que presenta propiedades narcóticas gracias a un alcaloide denominado nicotina y que se utiliza para fumar, masticar o aspirar. Tiene efectos estimulantes en el SNC.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



AGUASCALIENTES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Cuadro 1
Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAÍNA*	HEROÍNA	D.MEDICAS**	D.ILEGALES***	
		n=986	n=89	n=317	n=17	n=182	n=21	n=316	n=9	n=2	n=33	
SEXO	MASCULINO	90.1	94.4	91.8	94.1	79.7	90.5	93.0	88.9	100.0	87.9	
	FEMENINO	9.9	5.6	8.2	5.9	20.3	9.5	7.0	11.1	.0	12.1	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.9	5.6	.6	5.9	1.1	.0	2.5	.0	.0	3.0	
	15-19 AÑOS	15.4	28.1	5.7	52.9	20.3	4.8	17.4	.0	.0	21.2	
	20-24 AÑOS	14.4	15.7	7.6	5.9	12.6	.0	21.5	11.1	.0	33.3	
	25-29 AÑOS	17.8	22.5	10.4	5.9	14.8	14.3	26.3	44.4	50.0	12.1	
	30-34 AÑOS	13.2	10.1	12.9	17.6	12.6	23.8	13.9	33.3	.0	6.1	
	35 AÑOS O MAS	37.2	18.0	62.8	11.8	38.5	57.1	18.4	11.1	50.0	24.2	
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.5	1.1	2.8	.0	3.3	4.8	2.5	.0	.0	.0	
	PRIMARIA	37.1	39.3	46.1	29.4	24.2	47.6	33.9	44.4	.0	45.5	
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	.0	.9	.0	1.6	.0	1.3	.0	.0	3.0	
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	35.8	32.6	29.3	58.8	40.1	28.6	40.8	33.3	100.0	24.2	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.8	1.1	2.8	.0	4.4	9.5	1.6	22.2	.0	3.0	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.6	19.1	10.7	11.8	18.7	9.5	15.2	.0	.0	21.2	
	LICENCIATURA	5.8	4.5	7.3	.0	7.7	.0	4.7	.0	.0	3.0	
	POSGRADO	.2	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTADO CIVIL	CASADO	38.1	20.2	51.4	5.9	37.4	57.1	30.7	44.4	100.0	33.3
	SOLTERO	40.7	59.6	28.4	82.4	42.3	4.8	45.9	44.4	.0	51.5	
	DIVORCIADO	6.7	4.5	4.7	.0	10.4	14.3	7.6	11.1	.0	.0	
	SEPARADO	5.1	4.5	5.7	.0	4.4	9.5	5.1	.0	.0	6.1	
	VIUDO	2.6	.0	5.0	.0	1.6	4.8	1.9	.0	.0	.0	
	UNION LIBRE	6.8	11.2	4.7	11.8	3.8	9.5	8.9	.0	.0	9.1	
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	5.6	9.0	2.8	17.6	8.2	.0	5.4	.0	.0	9.1	
	DESEMPLEADO	30.2	37.1	20.8	41.2	23.6	28.6	41.1	11.1	.0	36.4	
	DESOCUPADO	13.2	12.4	15.5	11.8	6.6	19.0	13.3	22.2	.0	24.2	
	TRABAJO FIJO	29.1	21.3	34.7	.0	32.4	19.0	25.3	55.6	50.0	27.3	
	TRABAJO OCASIONAL	17.7	20.2	20.8	29.4	20.3	23.8	13.0	11.1	50.0	3.0	
	AMA DE CASA	2.8	.0	2.8	.0	6.6	4.8	1.9	.0	.0	.0	
	JUBILADO	1.3	.0	2.5	.0	2.2	4.8	.0	.0	.0	.0	
	ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	31.4	19.1	20.8	35.3	54.4	19.0	33.9	11.1	.0	30.3
		LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	62.7	65.2	73.2	64.7	39.6	76.2	62.7	77.8	50.0	69.7
	POR INDICACION LEGAL	2.9	12.4	2.5	.0	1.6	.0	1.9	.0	50.0	.0	
	POR INDICACION MEDICA	.4	.0	.3	.0	.5	.0	.3	11.1	.0	.0	
	OTROS	2.5	3.4	3.2	.0	3.8	4.8	1.3	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=986	n=89	n=317	n=17	n=182	n=21	n=316	n=9	n=2	n=33
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	70.6	89.9	53.9	76.5	95.1	76.2	67.4	77.8	100.0	63.6
	2 - 3 VECES POR SEMANA	3.2	.0	3.2	11.8	.5	.0	5.7	.0	.0	3.0
	1 VEZ POR SEMANA	21.1	6.7	34.7	5.9	3.3	19.0	22.8	22.2	.0	21.2
	1 A 3 VECES POR MES	4.4	1.1	7.6	5.9	1.1	4.8	3.5	.0	.0	9.1
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.7	2.2	.6	.0	.0	.0	.6	.0	.0	3.0
	9 AÑOS O MENOS	4.6	7.9	1.9	5.9	7.1	4.8	4.7	.0	.0	6.1
	10-14 AÑOS	39.0	57.3	28.1	35.3	46.2	14.3	43.0	55.6	50.0	30.3
	15-19 AÑOS	44.1	32.6	52.1	58.8	38.5	52.4	41.1	44.4	50.0	45.5
	20-24 AÑOS	7.4	2.2	10.4	.0	6.6	14.3	6.3	.0	.0	9.1
	25-29 AÑOS	3.0	.0	4.7	.0	1.6	.0	3.5	.0	.0	3.0
DROGA DE INICIO	30-34 AÑOS	.8	.0	1.6	.0	.0	9.5	.0	.0	.0	3.0
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.0	1.3	.0	.0	4.8	1.3	.0	.0	3.0
	ALCOHOL	36.7	21.3	69.7	11.8	13.7	38.1	24.1	22.2	.0	27.3
	MARIGUANA	8.2	24.7	1.9	11.8	1.1	9.5	11.7	33.3	.0	21.2
	INHALABLES	2.9	7.9	1.6	23.5	.0	.0	3.8	.0	.0	3.0
	ALUCINOGENOS	.7	1.1	.3	.0	.0	.0	.6	.0	.0	9.1
	HEROINA	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.1	1.1	1.6	.0	.5	.0	12.3	22.2	.0	6.1
	TRANQUILIZANTES	.8	.0	.3	.0	.0	33.3	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	43.5	42.7	23.7	52.9	84.1	19.0	44.0	22.2	50.0	24.2
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	1.1	1.1	.6	.0	.5	.0	1.3	.0	.0	9.1	
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	.7	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENEO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
AGUASCALIENTES**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=959	n=81	n=29	n=362	n=57	n=1	n=429
SEXO	MASCULINO	90.5	97.5	96.6	92.5	87.7	100.0	87.4
	FEMENINO	9.5	2.5	3.4	7.5	12.3	.0	12.6
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.9	3.7	.0	.6	3.5	.0	2.6
	15-19 AÑOS	15.5	24.7	27.6	8.6	17.5	.0	18.6
	20-24 AÑOS	14.5	21.0	24.1	8.6	26.3	.0	16.1
	25-29 AÑOS	17.6	28.4	31.0	12.2	24.6	.0	18.4
	30-34 AÑOS	13.2	6.2	13.8	14.9	15.8	.0	12.8
	35 AÑOS O MAS	37.2	16.0	3.4	55.2	12.3	100.0	31.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.6	6.2	.0	3.3	.0	.0	1.9
	PRIMARIA	36.8	34.6	62.1	46.7	40.4	.0	26.8
	TECNICO POST-PRIMARIA	.9	1.2	.0	.8	1.8	.0	.9
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	36.0	34.6	31.0	26.5	35.1	.0	44.8
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.8	.0	.0	3.3	1.8	.0	3.3
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.7	19.8	6.9	11.6	14.0	100.0	16.8
	LICENCIATURA	5.9	2.5	.0	7.5	7.0	.0	5.6
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.2	1.2	.0	.3	.0	.0	.0
	SOLTERO	40.9	60.5	62.1	29.8	47.4	.0	44.3
	CASADO	37.6	16.0	13.8	47.5	28.1	.0	36.4
	DIVORCIADO	6.8	9.9	6.9	8.0	3.5	.0	5.6
	SEPARADO	5.1	6.2	13.8	4.4	3.5	100.0	4.9
	VIUDO	2.6	.0	.0	4.7	7.0	.0	.9
	UNION LIBRE	7.0	7.4	3.4	5.5	10.5	.0	7.9
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.7	6.2	6.9	3.0	.0	.0	6.3
	10-14 AÑOS	39.6	50.6	69.0	26.2	10.5	.0	50.8
	15-19 AÑOS	44.0	40.7	24.1	52.2	59.6	.0	37.1
	20-24 AÑOS	7.0	1.2	.0	11.0	17.5	.0	3.7
	25-29 AÑOS	3.0	.0	.0	4.4	8.8	100.0	1.6
	30-34 AÑOS	.7	.0	.0	1.4	.0	.0	.5
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.9	1.2	.0	1.7	3.5	.0	.0
	DIARIO	64.1	55.6	72.4	45.3	36.8	100.0	84.6
	2 - 3 VECES POR SEMANA	4.0	.0	10.3	5.5	1.8	.0	3.3
	1 VEZ POR SEMANA	21.9	23.5	10.3	38.1	56.1	.0	4.2
	1 A 3 VECES POR MES	7.8	7.4	3.4	9.1	5.3	.0	7.5
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.2	13.6	3.4	1.9	.0	.0	.5

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
AGUASCALIENTES



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGÍA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=30	n=9	n=4	n=6	n=7	n=1	n=5	
SEXO	MASCULINO	93.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	3.7	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	
	15 - 18 AÑOS	96.3	88.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	60.0	55.6	75.0	83.3	57.1	100.0	80.0	
	SECUNDARIA	26.7	33.3	25.0	.0	28.6	.0	20.0	
	PREPA	13.3	11.1	.0	16.7	14.3	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	13.3	.0	.0	16.7	.0	.0	.0	
	EMPLEADO	40.0	33.3	25.0	16.7	14.3	.0	20.0	
	SUBEMPLEADO	16.7	11.1	.0	33.3	14.3	100.0	40.0	
HOGAR	HOGAR	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	26.7	55.6	75.0	33.3	71.4	.0	40.0	
	SI	26.7	44.4	100.0	.0	57.1	.0	40.0	
USA TATUAJES	NO	73.3	55.6	.0	100.0	42.9	100.0	60.0	
	SI	20.0	44.4	50.0	16.7	42.9	.0	40.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	80.0	55.6	50.0	83.3	57.1	100.0	60.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	13.3	33.3	50.0	33.3	42.9	.0	20.0	
	NO	86.7	66.7	50.0	66.7	57.1	100.0	80.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	VIOLACION	13.3	.0	.0	16.7	.0	.0	.0	
	HOMICIDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	13.3	22.2	25.0	.0	14.3	100.0	20.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	10.0	22.2	.0	.0	14.3	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	80.0	88.9	75.0	100.0	85.7	100.0	80.0	
	OTROS	13.3	.0	.0	33.3	.0	.0	20.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	46.7	55.6	25.0	33.3	42.9	100.0	40.0
		HOGAR	36.7	33.3	75.0	33.3	28.6	.0	20.0
		TRABAJO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
		ESCUELA	10.0	.0	.0	16.7	14.3	.0	20.0
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		
OTRO	6.7	11.1	.0	16.7	14.3	.0	20.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERISTICAS		GLOBAL	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIGUANA
		(BAJO EFECTO)				
		n=156	n=113	n=15	n=26	n=13
SEXO	MASCULINO	92.3	95.6	80.0	88.5	100.0
	FEMENINO	7.7	4.4	20.0	11.5	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.6	.0	6.7	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	1.9	.0	6.7	3.8	7.7
	15 - 19 AÑOS	14.7	15.9	13.3	7.7	.0
	20 - 24 AÑOS	19.9	17.7	20.0	30.8	15.4
	25 - 29 AÑOS	13.5	15.0	.0	23.1	30.8
	30 - 34 AÑOS	10.9	7.1	26.7	19.2	15.4
	35 - 39 AÑOS	7.1	7.1	13.3	.0	7.7
	40 AÑOS O MÁS	31.4	37.2	13.3	15.4	23.1
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	12.8	11.5	33.3	11.5	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	19.2	23.0	6.7	15.4	23.1
	CAIDA	2.6	.9	.0	.0	15.4
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	1.9	.9	6.7	3.8	.0
	GOLPES	1.3	1.8	.0	.0	.0
	ASFIXIA	3.8	4.4	.0	3.8	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	3.8	1.8	.0	15.4	15.4
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	3.2	3.5	.0	3.8	7.7
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	.0	.0	.0	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	51.3	52.2	53.3	46.2	38.5
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	.6	.9	.0	.0
CASA		50.0	59.3	26.7	34.6	61.5
CALLE		45.5	38.1	66.7	57.7	38.5
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0
AREAS RECREATIVAS		1.9	1.8	.0	3.8	.0
TRABAJO		1.9	.0	6.7	3.8	.0
ARES DE SERVICIO		.0	.0	.0	.0	.0
OTROS		.0	.0	.0	.0	.0

N=487 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
AGUASCALIENTES**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL n=13	MARIGUANA n=0	INHALABLES n=0	COCAINA * n=0	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=0	HEROINA n=0	CRISTAL ** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=0	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=2
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=902 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 AGUASCALIENTES**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=126	n=125	n=62	n=19	n=7	n=3	n=7	n=6	n=5	n=3	n=2
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.6	1.6	6.5	10.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	12.7	6.4	8.1	15.8	.0	33.3	14.3	16.7	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.8	.8	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	4.8	6.4	3.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	2.4	1.6	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	3.2	1.6	6.5	.0	.0	.0	.0	16.7	20.0	33.3	50.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	.8	2.4	.0	5.3	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	5.6	4.0	9.7	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.8	.0	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	11.9	4.0	4.8	21.1	.0	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	27.8	32.8	41.9	31.6	57.1	66.7	85.7	66.7	60.0	66.7	50.0
NINGUNA	28.6	25.6	9.7	.0	.0	.0	.0	.0	20.0	.0	.0

N=902

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=340	n=193	n=97	n=21	n=13	n=9	n=4	n=0	n=0	n=3	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	80.6	77.2	84.5	81.0	100.0	88.9	100.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	FEMENINO	19.4	22.8	15.5	19.0	.0	11.1	.0	.0	.0	66.7	.0	.0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10-14	6.8	7.3	5.2	10.5	.0	22.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19	24.3	26.6	19.6	31.6	23.1	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	20-24	19.0	21.4	13.4	26.3	30.8	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
	25-29	13.4	9.4	22.7	10.5	23.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	30-34	13.9	12.0	13.4	15.8	15.4	44.4	25.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	35 Y MAS	22.6	23.4	25.8	5.3	7.7	.0	50.0	.0	.0	66.7	.0	.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	52.1	51.3	48.5	66.7	53.8	88.9	25.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	CASADO	30.3	31.1	35.1	14.3	23.1	.0	75.0	.0	.0	.0	.0	.0
	U. LIBRE	8.8	9.8	4.1	14.3	23.1	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	SEPARADO	5.3	3.1	10.3	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	DIVORCIADO	2.4	3.1	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VIUDO	.6	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	NO ESPECIFICA	.6	.5	.0	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	.9	.5	1.1	.0	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	16.9	16.1	14.7	19.0	23.1	33.3	25.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	SECUNDARIA	41.2	40.1	38.9	57.1	38.5	55.6	75.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TECNICO O COMERCIAL	4.2	5.2	2.1	.0	7.7	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	BACHILLERATO	24.3	24.5	27.4	19.0	23.1	11.1	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	LICENCIATURA	11.6	12.5	14.7	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
POSGRADO	.6	.5	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	ESTUDIANTE	12.3	13.8	12.6	9.5	.0	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ESTUDIA Y TRABAJA	1.5	1.6	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	LABORAL ESTABLE	33.0	31.2	35.8	33.3	41.7	11.1	75.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	LABORAL INESTABLE	15.9	19.0	8.4	4.8	16.7	44.4	25.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	DESEMPLEADO	13.8	11.6	18.9	9.5	16.7	22.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DESOCUPADO	15.6	13.2	16.8	38.1	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HOGAR	6.0	6.9	4.2	4.8	.0	11.1	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
NIVEL SOCIOECONOMICO	PENSIONADO	1.8	2.6	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ALTO	.9	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	MEDIO ALTO	14.1	15.0	14.1	10.0	7.7	12.5	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	MEDIO BAJO	61.5	58.8	63.0	70.0	76.9	50.0	100.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	BAJO	23.5	25.1	21.7	20.0	15.4	37.5	.0	.0	.0	33.3	.0	.0
	POBREZA EXTREMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
AGUASCALIENTES

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=340	n=60	n=64	n=29	n=139	n=16	N=8	n=0	n=0	n=2	n=2	n=0
SEXO	MASCULINO	80,6	58,3	70,3	89,7	95,0	68,8	75,0	,0	,0	50,0	100,0	,0
	FEMENINO	19,4	41,7	29,7	10,3	5,0	31,3	25,0	,0	,0	50,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,3	5,0	10,9	3,8	2,9	31,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	25,6	18,3	20,3	57,7	23,0	56,3	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	19,6	16,7	17,2	19,2	24,5	,0	12,5	,0	,0	,0	50,0	,0
	25-29	12,9	6,7	15,6	3,8	17,3	6,3	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	14,5	5,0	12,5	11,5	19,4	6,3	25,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	35 Y MAS	21,1	48,3	23,4	3,8	12,9	,0	37,5	,0	,0	,0	,0	50,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53,1	45,0	54,7	79,3	45,3	93,8	50,0	,0	,0	100,0	50,0	,0
	CASADO	29,1	43,3	35,9	6,9	26,6	6,3	37,5	,0	,0	,0	50,0	,0
	U. LIBRE	9,1	5,0	4,7	6,9	14,4	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	5,6	3,3	3,1	,0	10,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,9	,0	1,6	,0	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	V. UDO	,6	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	,6	,0	,0	6,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,3	,0	,0	,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,9	1,7	1,6	,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	16,4	11,9	12,5	17,2	19,7	25,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,3	20,3	34,4	37,9	49,6	56,3	75,0	,0	,0	50,0	100,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,4	10,2	4,7	,0	2,2	6,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	BACHILLERATO	24,0	32,2	26,6	34,5	21,2	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	12,0	20,3	20,3	10,3	6,6	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,6	3,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	12,4	20,3	12,9	32,1	4,3	26,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	1,6	1,7	6,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	32,5	30,5	33,9	17,9	39,1	6,7	37,5	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,9	10,2	8,1	21,4	19,6	6,7	37,5	,0	,0	100,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	13,7	8,5	16,1	3,6	18,1	6,7	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,2	6,8	12,9	25,0	16,7	40,0	12,5	,0	,0	,0	100,0	,0
	HOGAR	6,1	15,3	8,1	,0	2,2	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,6	6,8	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,0	1,7	1,6	,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	13,4	21,7	18,0	18,5	8,2	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	61,9	56,7	59,0	63,0	64,9	40,0	100,0	,0	,0	100,0	100,0	,0
	BAJO	23,8	20,0	21,3	18,5	26,1	53,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	56,9	85,0	40,6	55,2	57,6	56,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALCOHOL	27,8	11,7	56,3	10,3	26,6	12,5	37,5	,0	,0	,0	50,0	,0
	MARIGUANA	6,6	,0	1,6	34,5	5,0	6,3	12,5	,0	,0	,0	50,0	,0
	COCAÍNA	4,1	,0	,0	,0	8,6	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	2,8	1,7	1,6	,0	1,4	18,8	12,5	,0	,0	50,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,9	,0	,0	,0	,0	,0	37,5	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,9	1,7	,0	,0	,7	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



BAJA CALIFORNIA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 BAJA CALIFORNIA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=9447	n=264	n=1074	n=44	n=27	n=35	n=237	n=3121	n=3968	n=3	n=59	n=615
SEXO	MASCULINO	91.8	93.2	93.2	88.6	70.4	80.0	89.9	94.1	91.9	100.0	94.9	78.7
	FEMENINO	8.2	6.8	6.8	11.4	29.6	20.0	10.1	5.9	8.1	.0	5.1	21.3
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.4	3.0	.7	18.2	.0	2.9	.4	.0	.3	.0	.0	.7
	15-19 AÑOS	8.7	44.7	4.1	50.0	29.6	20.0	11.4	1.2	11.2	33.3	5.1	16.9
	20-24 AÑOS	14.5	18.2	6.3	4.5	22.2	8.6	16.0	5.1	22.4	.0	13.6	24.1
	25-29 AÑOS	17.3	12.5	7.4	13.6	14.8	20.0	17.3	15.2	21.3	.0	15.3	21.6
	30-34 AÑOS	16.6	6.4	12.5	2.3	11.1	20.0	15.6	17.9	17.7	.0	28.8	15.1
	35 AÑOS O MAS	42.5	15.2	69.1	11.4	22.2	28.6	39.2	60.5	27.1	66.7	37.3	21.6
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.3	1.1	8.3	4.5	7.4	.0	.4	2.6	3.1	.0	.0	1.5
	PRIMARIA	32.7	18.6	41.6	36.4	14.8	31.4	16.0	34.2	32.9	.0	22.0	23.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	.8	.7	.0	.0	.0	.0	.7	1.0	.0	.0	.3
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	41.2	50.0	29.6	50.0	51.9	48.6	38.0	41.8	41.2	100.0	59.3	52.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	.4	.6	.0	.0	.0	.4	.6	.9	.0	.0	.8
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	19.1	26.9	16.0	9.1	22.2	14.3	34.2	18.3	19.1	.0	16.9	19.7
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	2.1	1.9	2.6	.0	.0	5.7	10.1	1.8	1.7	.0	1.7	2.1
	POSGRADO	.3	.4	.7	.0	3.7	.0	.8	.1	.2	.0	.0	.3
	CASADO	19.6	11.0	24.5	4.5	25.9	22.9	24.1	18.2	20.0	.0	18.6	17.9
	SOLTERO	56.9	77.7	47.5	86.4	44.4	54.3	55.3	53.9	59.6	100.0	54.2	61.8
	DIVORCIADO	5.1	3.0	8.8	.0	7.4	2.9	6.8	6.6	3.3	.0	5.1	3.3
	SEPARADO	4.4	3.0	6.6	2.3	.0	5.7	3.4	5.2	3.5	.0	10.2	2.6
SITUACION LABORAL	VIUDO	1.0	.4	2.6	.0	.0	.0	1.3	1.3	.4	.0	.0	1.3
	UNION LIBRE	13.0	4.9	10.1	6.8	22.2	14.3	9.3	14.9	13.2	.0	11.9	13.2
	ESTUDIANTE	1.9	11.0	2.0	13.6	11.1	5.7	3.8	.4	2.0	.0	.0	2.4
	DESEMPLEADO	41.5	36.0	38.6	54.5	25.9	42.9	32.9	41.0	44.2	.0	40.7	37.7
	DESOCUPADO	17.2	18.9	16.9	22.7	18.5	17.1	20.7	16.5	15.8	66.7	37.3	25.2
	TRABAJO FIJO	18.0	20.1	19.4	.0	14.8	17.1	26.2	18.9	17.0	33.3	.0	16.1
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	17.9	12.9	19.4	6.8	25.9	11.4	11.8	20.3	17.6	.0	18.6	10.6
	AMA DE CASA	3.1	.8	2.2	2.3	3.7	5.7	2.5	2.7	3.2	.0	3.4	7.3
	JUBILADO	.5	.4	1.5	.0	.0	.0	2.1	.3	.3	.0	.0	.7
	VOLUNTARIO	58.7	38.6	54.6	45.5	22.2	40.0	57.4	79.4	51.1	66.7	62.7	22.1
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	35.3	53.8	37.2	50.0	74.1	54.3	34.6	18.5	40.1	33.3	33.9	75.9
	POR INDICACION LEGAL	1.6	1.5	3.4	4.5	.0	2.9	1.7	.7	1.7	.0	.0	1.8
OTROS	POR INDICACION MEDICA	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.3	.1	.0	.0	.2
	OTROS	4.2	6.1	4.7	.0	3.7	2.9	6.3	1.2	7.0	.0	3.4	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
BAJA CALIFORNIA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=9447	n=264	n=1074	n=44	n=35	n=237	n=3121	n=3968	n=3	n=59	n=615
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	90.9	83.3	83.9	84.1	91.4	77.6	97.6	87.8	66.7	89.8	98.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	4.4	8.3	5.5	2.3	5.7	9.7	.8	6.9	33.3	3.4	.7
	1 VEZ POR SEMANA	3.4	4.9	7.4	4.5	.0	9.3	1.3	3.9	.0	6.8	1.1
	1 A 3 VECES POR MES	1.1	1.9	2.5	6.8	2.9	2.5	.4	1.2	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.3	1.5	.7	2.3	.0	.8	.0	.2	.0	.0	.2
	9 AÑOS O MENOS	4.4	2.7	4.7	.0	5.7	5.1	6.1	3.4	.0	5.1	3.3
	10-14 AÑOS	40.1	37.1	29.1	50.0	42.9	32.1	50.4	36.2	33.3	33.9	36.3
	15-19 AÑOS	39.5	51.9	45.9	47.7	34.3	45.6	32.1	41.2	66.7	35.6	47.5
	20-24 AÑOS	9.0	6.8	11.5	.0	2.9	10.5	6.4	10.7	.0	8.5	8.1
	25-29 AÑOS	3.5	.8	3.9	2.3	2.9	4.2	2.5	4.3	.0	11.9	2.6
	30-34 AÑOS	1.7	.0	2.1	.0	2.9	.4	1.2	2.3	.0	.0	.5
	35 AÑOS Y MAS	1.8	.8	2.8	.0	8.6	2.1	1.2	2.0	.0	5.1	1.8
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	18.6	14.0	65.7	2.3	22.9	17.7	7.7	15.4	.0	15.3	15.9
	MARIGUANA	29.7	65.9	7.9	36.4	34.3	27.4	42.9	24.0	100.0	35.6	21.6
	INHALABLES	2.7	.8	1.1	36.4	.0	2.5	4.5	1.8	.0	3.4	.3
	ALUCINOGENOS	.8	.0	.0	.0	.0	.8	.4	.1	.0	.0	10.2
	HEROINA	4.8	.0	.2	.0	.0	.4	14.2	.3	.0	1.7	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.2	.0	.0	.0	.0	.4	.2	.0	.0	15.3	.0
	COCAINA	2.9	1.9	1.1	.0	2.9	19.8	2.2	3.0	.0	3.4	2.9
	TRANQUILIZANTES	.6	.0	.2	.0	20.0	.4	.9	.5	.0	1.7	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.7	.0
	ANFETAMINAS	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.2	.1	.0	15.3	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	26.3	16.3	22.8	22.7	20.0	20.3	22.4	28.4	.0	6.8	45.5
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.5	.0	.0	.0	.0	.8	1.1	.1	.0	.0	1.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.1	.0	.0	.0
	CRISTAL	12.4	1.1	.7	2.3	.0	4.2	3.1	26.2	.0	.0	2.4
	ROHYPNOL	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.1	.0	.0	.0
CRACK	.1	.0	.0	.0	.0	4.2	.1	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENEO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
BAJA CALIFORNIA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=8044	n=2804	n=252	n=1754	n=293	n=456	n=2485
SEXO	MASCULINO	92.2	95.4	95.6	91.1	89.8	95.8	88.8
	FEMENINO	7.8	4.6	4.4	8.9	10.2	4.2	11.2
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.5	.3	1.6	.5	.3	.0	.6
	15-19 AÑOS	8.2	9.8	6.3	5.3	5.8	.9	10.1
	20-24 AÑOS	13.2	13.5	5.6	11.3	13.0	3.9	16.6
	25-29 AÑOS	16.1	17.0	14.3	13.7	16.7	14.7	17.2
	30-34 AÑOS	16.6	16.1	21.0	15.6	21.2	14.3	17.5
	35 AÑOS O MAS	45.4	43.2	51.2	53.7	43.0	66.2	38.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.4	1.9	3.6	5.9	.7	2.9	3.7
	PRIMARIA	32.8	30.0	47.2	35.3	21.8	38.2	33.1
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.6	.4	.5	1.0	.9	.3
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	41.0	44.4	37.7	34.7	44.7	33.1	43.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	.4	.4	1.0	.0	1.5	.8
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	19.3	20.8	10.3	19.7	27.6	21.1	17.1
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	2.1	1.9	.4	2.6	3.8	2.2	1.9
	POSGRADO	.2	.1	.0	.3	.3	.2	.3
	SOLTERO	56.9	58.7	56.7	50.2	51.5	54.6	60.5
	CASADO	19.4	16.0	15.1	24.3	20.1	21.9	19.6
	DIVORCIADO	5.2	5.3	4.0	7.1	7.8	5.3	3.7
	SEPARADO	4.5	4.7	3.6	5.6	6.1	4.8	3.3
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.1	1.1	.4	1.3	2.4	1.8	.8
	UNION LIBRE	12.9	14.2	20.2	11.5	11.9	11.6	12.0
	9 AÑOS O MENOS	5.1	3.6	16.3	5.3	.0	1.1	6.8
	10-14 AÑOS	43.7	50.8	57.5	31.6	19.5	16.2	50.7
	15-19 AÑOS	39.6	40.9	23.8	45.4	47.4	35.7	35.5
	20-24 AÑOS	7.2	3.4	2.0	10.7	17.7	24.6	5.2
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.3	.9	.4	3.2	8.9	11.4	1.1
	30-34 AÑOS	1.0	.2	.0	1.9	3.1	5.9	.3
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.2	.0	1.9	3.4	5.0	.5
	DIARIO	82.1	83.5	81.3	57.5	66.6	95.6	97.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.8	6.1	7.5	16.0	13.0	.7	1.3
	1 VEZ POR SEMANA	8.3	7.3	7.1	21.0	16.7	1.3	.9
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	2.2	1.9	3.6	4.6	3.8	2.4	.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	.7	1.2	.4	1.0	.0	.0	.2

* Cocaína, Basuco y Crack.



Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
BAJA CALIFORNIA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
BAJA CALIFORNIA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL	
		n=494	n=138	n=1	n=136	n=10	n=3	n=153	n=67	
SEXO	MASCULINO	94.3	96.4	100.0	94.9	100.0	100.0	93.5	94.0	
	FEMENINO	5.7	3.6	.0	5.1	.0	.0	6.5	6.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	11.6	6.2	.0	3.8	.0	.0	3.3	6.1	
	15 - 18 AÑOS	88.4	93.8	100.0	96.2	100.0	100.0	96.7	93.9	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	35.4	33.3	100.0	31.6	60.0	.0	34.0	44.8	
	SECUNDARIA	50.4	49.3	.0	52.9	30.0	33.3	56.2	46.3	
	PREPA	12.3	15.9	.0	15.4	10.0	66.7	9.2	4.5	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	1.8	1.4	.0	.0	.0	.0	.7	4.5	
	ESTUDIANTE	28.1	22.5	.0	25.0	20.0	33.3	20.3	11.9	
	EMPLEADO	20.0	18.1	100.0	11.8	20.0	.0	10.5	37.3	
	SUBEMPLEADO	27.5	26.8	.0	39.7	50.0	33.3	44.4	22.4	
USA TATUAJES	HOGAR	1.2	1.4	.0	.7	.0	.0	1.3	3.0	
	NINGUNA	23.1	31.2	.0	22.8	10.0	33.3	23.5	25.4	
	SI	20.6	35.5	.0	30.1	10.0	33.3	32.0	41.8	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	79.4	64.5	100.0	69.9	90.0	66.7	68.0	58.2	
	SI	20.9	37.0	100.0	22.1	30.0	66.7	22.9	43.3	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	79.1	63.0	.0	77.9	70.0	33.3	77.1	56.7	
	SI	21.5	42.8	100.0	37.5	50.0	33.3	34.0	52.2	
TIPO DE INFRACCION	NO	78.5	57.2	.0	62.5	50.0	66.7	66.0	47.8	
	ROBO	84.8	91.3	100.0	86.8	100.0	100.0	87.6	86.6	
	VIOLACION	8.1	6.5	.0	4.4	10.0	.0	5.2	6.0	
	HOMICIDIO	5.3	3.6	.0	6.6	.0	.0	3.9	3.0	
	LESIONES A TERCEROS	5.9	1.4	.0	4.4	.0	.0	3.3	6.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	9.3	4.3	.0	9.6	10.0	.0	8.5	6.0	
	SECUESTRO	.6	1.4	.0	.7	20.0	.0	.7	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.9	8.0	.0	8.1	10.0	.0	6.5	4.5	
	CONSUMO DE DROGAS	.4	.7	100.0	.0	.0	.0	.7	3.0	
	PORTACION DE ARMA	8.1	8.7	.0	6.6	20.0	.0	7.8	3.0	
	OTROS	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	55.7	58.7	.0	57.4	90.0	66.7	54.2	65.7
		HOGAR	31.2	27.5	100.0	26.5	10.0	33.3	28.1	29.9
TRABAJO		7.5	10.9	.0	11.0	.0	.0	10.5	3.0	
ESCUELA		4.3	2.9	.0	3.7	.0	.0	5.9	1.5	
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.4	.0	.0	1.5	.0	.0	1.3	.0	
OTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
BAJA CALIFORNIA**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL **	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=0	n=2	n=0	n=0	n=1	n=0	n=5	n=9	n=0	n=3
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0
Total	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=173 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
BAJA CALIFORNIA**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=39	n=26	n=20	n=12	n=7	n=2	n=10	n=12	n=7	n=13	n=1
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	2.6	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	2.6	.0	10.0	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	.0	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	12.8	11.5	5.0	8.3	.0	.0	20.0	8.3	42.9	38.5	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	20.5	23.1	10.0	8.3	42.9	.0	40.0	75.0	28.6	23.1	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	5.1	3.8	15.0	16.7	.0	50.0	10.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	2.6	.0	5.0	8.3	14.3	.0	.0	8.3	.0	7.7	.0
SIDA	2.6	3.8	10.0	8.3	14.3	.0	10.0	.0	.0	7.7	.0
OTRAS	38.5	23.1	30.0	25.0	42.9	50.0	10.0	.0	14.3	15.4	.0
NINGUNA	10.3	11.5	15.0	16.7	.0	.0	10.0	8.3	14.3	7.7	100.0

N=173

Nota: El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas múltiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
BAJA CALIFORNIA

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1077	n=543	n=391	n=93	n=9	n=20	n=11	n=1	n=1	n=7	n=1	n=0
SEXO	MASCULINO	77,1	74,8	77,7	89,2	100,0	65,0	63,6	100,0	100,0	71,4	100,0	,0
	FEMENINO	22,9	25,2	22,3	10,8	,0	35,0	36,4	,0	,0	28,6	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,4	6,3	7,2	,0	,0	30,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	23,3	22,5	23,3	30,4	,0	35,0	9,1	100,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	17,3	15,1	19,2	16,3	55,6	10,0	36,4	,0	,0	42,9	,0	,0
	25-29	14,2	13,3	15,1	14,1	11,1	5,0	36,4	,0	100,0	14,3	100,0	,0
	30-34	13,7	13,1	14,1	16,3	33,3	10,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	25,0	29,7	21,0	22,8	,0	10,0	9,1	,0	,0	28,6	,0	,0
	SOLTERO	44,0	41,4	46,5	46,2	55,6	65,0	36,4	100,0	,0	14,3	,0	,0
	CASADO	15,6	14,7	17,4	16,1	11,1	10,0	,0	,0	,0	28,6	,0	,0
	U. LIBRE	22,7	24,1	20,5	24,7	33,3	20,0	9,1	,0	100,0	28,6	,0	,0
	SEPARADO	12,3	13,1	11,5	9,7	,0	,0	54,5	,0	,0	14,3	,0	,0
	DIVORCIADO	2,0	2,8	1,0	,0	,0	5,0	,0	,0	,0	14,3	100,0	,0
	VIUDO	,4	,6	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,0	3,3	2,8	3,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,7	1,1	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,2	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	15,4	16,8	14,0	10,9	11,1	15,0	27,3	,0	,0	42,9	,0	,0
	SECUNDARIA	45,2	47,5	40,0	51,1	44,4	70,0	54,5	,0	,0	14,3	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,3	3,0	3,6	4,3	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	28,7	25,3	33,8	30,4	33,3	10,0	18,2	100,0	,0	28,6	100,0	,0
OCUPACION	LICENCIATURA	6,6	6,1	8,1	3,3	,0	5,0	,0	,0	100,0	14,3	,0	,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	14,9	13,5	17,2	12,2	,0	35,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,2	2,5	1,8	2,2	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	25,4	24,6	26,8	25,6	55,6	5,0	18,2	,0	,0	28,6	100,0	,0
	LABORAL INESTABLE	14,9	15,0	15,4	7,8	22,2	25,0	18,2	,0	,0	28,6	,0	,0
	DESEMPLEADO	10,3	11,2	7,3	17,8	11,1	10,0	18,2	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	23,4	24,0	20,8	31,1	11,1	15,0	36,4	,0	100,0	28,6	,0	,0
	HOGAR	8,6	8,8	10,2	3,3	,0	5,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,5	,4	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,8	2,2	1,1	2,4	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	26,4	26,0	27,9	26,8	44,4	5,0	,0	,0	100,0	42,9	,0	,0
	MEDIO BAJO	50,5	49,2	50,1	57,3	44,4	50,0	81,8	100,0	,0	42,9	100,0	,0
	BAJO	20,9	22,2	21,0	13,4	,0	35,0	18,2	,0	,0	14,3	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,4	,4	,0	,0	11,1	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
BAJA CALIFORNIA

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1055	n=71	n=154	n=145	n=41	n=42	n=505	n=2	n=2	n=12	n=80	n=1
SEXO	MASCULINO	77,1	62,0	77,3	88,3	68,3	73,8	75,0	50,0	100,0	83,3	87,5	100,0
	FEMENINO	22,9	38,0	22,7	11,7	31,7	26,2	25,0	50,0	,0	16,7	12,5	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,4	4,2	4,6	12,6	4,9	52,4	3,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	23,1	26,8	13,1	56,6	26,8	47,6	16,2	50,0	50,0	41,7	3,8	,0
	20-24	17,5	9,9	11,1	17,5	24,4	,0	22,6	50,0	50,0	8,3	10,0	,0
	25-29	14,3	8,5	9,8	5,6	12,2	,0	19,0	,0	,0	16,7	22,5	,0
	30-34	13,7	11,3	17,6	2,1	9,8	,0	18,8	,0	,0	,0	8,8	,0
	35 Y MAS	25,1	39,4	43,8	5,6	22,0	,0	20,4	,0	,0	33,3	55,0	100,0
	SOLTERO	43,6	43,7	36,4	77,9	41,5	85,7	32,7	100,0	100,0	58,3	38,8	,0
ESTADO CIVIL	CASADO	15,5	31,0	30,5	6,9	14,6	,0	13,9	,0	,0	8,3	10,0	,0
	U. LIBRE	23,0	7,0	14,9	7,6	29,3	7,1	33,5	,0	,0	16,7	22,5	,0
	SEPARADO	12,4	9,9	11,7	3,4	14,6	,0	14,7	,0	,0	8,3	23,8	100,0
	DIVORCIADO	2,1	1,4	3,9	,0	,0	,0	2,2	,0	,0	8,3	3,8	,0
	VIUDO	,4	2,8	,6	,0	,0	,0	,2	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,9	4,2	1,9	4,1	,0	7,1	3,0	,0	,0	,0	1,3	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,7	1,4	,0	1,4	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	1,3	,0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	15,6	7,0	16,8	7,7	9,8	14,6	19,6	,0	,0	8,3	16,5	,0
	SECUNDARIA	45,4	43,7	42,3	38,5	36,6	70,7	46,1	,0	50,0	66,7	49,4	100,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,4	5,6	5,4	,7	,0	,0	3,8	,0	,0	,0	3,8	,0
	BACHILLERATO	28,1	26,8	26,2	43,4	43,9	14,6	25,5	50,0	50,0	8,3	22,8	,0
	LICENCIATURA	6,6	15,5	8,7	8,4	9,8	,0	4,2	50,0	,0	16,7	6,3	,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	14,6	20,0	11,4	44,8	20,0	59,0	4,5	100,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,2	7,1	1,3	4,9	2,5	2,6	,8	,0	,0	,0	3,8	,0
OCUPACION	LABORAL ESTABLE	25,6	28,6	40,3	11,2	30,0	5,1	27,1	,0	,0	16,7	21,8	100,0
	LABORAL INESTABLE	15,0	14,3	11,4	8,4	17,5	7,7	18,0	,0	,0	16,7	17,9	,0
	DESEMPLEADO	10,1	5,7	10,1	9,1	2,5	2,6	11,1	,0	50,0	25,0	14,1	,0
	DESOCUPADO	23,5	8,6	14,8	18,2	22,5	17,9	28,1	,0	50,0	41,7	34,6	,0
	HOGAR	8,5	12,9	8,7	3,5	5,0	5,1	10,3	,0	,0	,0	7,7	,0
	PENSIONADO	,5	2,9	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,8	2,9	2,0	2,2	2,8	,0	1,1	,0	,0	,0	5,4	,0
	MEDIO ALTO	26,4	42,0	32,7	37,4	19,4	9,8	20,8	,0	,0	33,3	25,7	100,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	MEDIO BAJO	50,1	46,4	46,7	48,2	58,3	48,8	51,9	100,0	100,0	58,3	45,9	,0
	BAJO	21,3	8,7	18,7	12,2	16,7	39,0	26,1	,0	,0	8,3	21,6	,0
	POBREZA EXTREMA	,4	,0	,0	,0	2,8	2,4	,2	,0	,0	,0	1,4	,0
	TABACO	50,9	70,4	44,2	50,3	53,7	47,6	49,9	50,0	50,0	33,3	57,5	,0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	35,9	25,4	48,7	37,2	31,7	26,2	36,4	,0	50,0	25,0	23,8	100,0
	MARIJUANA	8,4	2,8	3,2	11,0	7,3	4,8	9,1	,0	,0	16,7	16,3	,0
	COCAÍNA	,9	,0	1,9	,0	2,4	,0	,8	,0	,0	8,3	,0	,0
	INHALABLES	1,9	,0	,6	,7	4,9	21,4	1,0	,0	,0	8,3	1,3	,0
	ESTIMULANTES	1,0	1,4	,6	,0	,0	,0	1,8	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,2	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,7	,0	,6	,7	,0	,0	,8	,0	,0	8,3	,0	,0
	OPIACEOS	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	1,3	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



BAJA CALIFORNIA SUR



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
BAJA CALIFORNIA SUR**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.ILEGALES ***
		n=1773	n=94	n=247	n=21	n=18	n=142	n=27	n=1209	n=15
SEXO	MASCULINO	93.4	95.7	92.3	100.0	88.9	96.5	96.3	93.0	93.3
	FEMENINO	6.6	4.3	7.7	.0	11.1	3.5	3.7	7.0	6.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.3	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0
	15-19 AÑOS	13.4	20.2	5.7	14.3	16.7	12.7	3.7	14.3	46.7
	20-24 AÑOS	21.3	20.2	8.9	19.0	16.7	17.6	7.4	24.7	20.0
	25-29 AÑOS	19.9	14.9	8.9	28.6	22.2	23.2	25.9	22.1	.0
	30-34 AÑOS	16.5	11.7	13.0	23.8	5.6	17.6	3.7	17.9	6.7
	35 AÑOS O MAS	28.6	30.9	63.6	14.3	38.9	28.9	59.3	20.7	26.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.2	4.3	15.8	.0	5.6	3.5	.0	2.0	13.3
	PRIMARIA	24.3	23.4	30.4	33.3	27.8	16.9	25.9	23.8	20.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	2.1	1.6	.0	.0	.7	.0	1.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	41.3	37.2	29.1	47.6	38.9	40.8	59.3	43.8	40.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.5	.0	.8	.0	.0	1.4	.0	.4	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.8	31.9	18.2	14.3	27.8	30.3	14.8	25.2	26.7
	LICENCIATURA	3.5	1.1	4.0	4.8	.0	5.6	.0	3.5	.0
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.3	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.3	.0
	CASADO	24.5	14.9	28.7	23.8	33.3	35.2	18.5	23.5	.0
	SOLTERO	53.6	66.0	42.1	57.1	38.9	47.2	44.4	55.6	93.3
	DIVORCIADO	3.0	6.4	2.4	.0	.0	2.1	11.1	2.9	.0
	SEPARADO	4.7	3.2	8.9	9.5	5.6	3.5	7.4	4.0	6.7
	VIUDO	.6	.0	1.2	.0	.0	.0	3.7	.5	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	13.6	9.6	16.6	9.5	22.2	12.0	14.8	13.6	.0
	ESTUDIANTE	2.3	8.5	1.2	9.5	.0	2.1	.0	1.9	6.7
	DESEMPLEADO	25.9	20.2	21.5	42.9	16.7	28.9	22.2	26.6	40.0
	DESOCUPADO	11.9	11.7	6.1	4.8	11.1	7.0	14.8	13.7	13.3
	TRABAJO FIJO	29.8	28.7	36.8	19.0	38.9	41.5	25.9	27.5	6.7
	TRABAJO OCASIONAL	27.7	30.9	29.1	23.8	33.3	19.7	37.0	27.9	33.3
	AMA DE CASA	1.9	.0	3.2	.0	.0	.0	.0	2.2	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.5	.0	2.0	.0	.0	.7	.0	.2	.0
	VOLUNTARIO	49.2	36.2	43.7	33.3	83.3	52.8	77.8	50.0	60.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	41.5	45.7	47.8	38.1	16.7	36.6	18.5	41.5	26.7
	POR INDICACION LEGAL	3.7	8.5	2.4	9.5	.0	3.5	.0	3.6	13.3
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.4	.0	.0	.7	.0	.1	.0
OTROS	5.4	9.6	5.7	19.0	.0	6.3	3.7	4.9	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
BAJA CALIFORNIA SUR**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.ILEGALES ***
		n=1773	n=94	n=247	n=21	n=18	n=142	n=27	n=1209	n=15
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	69.9	64.9	61.1	71.4	88.9	47.2	88.9	74.0	73.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	10.0	9.6	8.1	14.3	.0	14.1	.0	10.3	6.7
	1 VEZ POR SEMANA	12.4	16.0	16.6	.0	.0	26.1	3.7	10.3	6.7
	1 A 3 VECES POR MES	7.6	9.6	14.2	14.3	11.1	12.7	7.4	5.3	6.7
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	6.7
	9 AÑOS O MENOS	4.3	5.3	2.0	.0	11.1	3.5	14.8	4.5	6.7
	10-14 AÑOS	39.9	44.7	29.1	76.2	44.4	38.7	51.9	40.8	53.3
	15-19 AÑOS	40.7	43.6	43.3	19.0	38.9	38.7	33.3	40.9	26.7
DROGA DE INICIO	20-24 AÑOS	8.5	4.3	13.8	4.8	5.6	8.5	.0	8.2	.0
	25-29 AÑOS	3.8	2.1	6.5	.0	.0	5.6	.0	3.2	13.3
	30-34 AÑOS	1.4	.0	2.8	.0	.0	1.4	.0	1.3	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	2.4	.0	.0	3.5	.0	1.1	.0
	ALCOHOL	23.6	12.8	75.7	4.8	33.3	20.4	18.5	14.8	.0
	MARIGUANA	32.3	62.8	7.3	47.6	.0	35.2	44.4	34.9	6.7
	INHALABLES	2.1	3.2	1.2	23.8	.0	.7	3.7	1.9	6.7
	ALUCINOGENOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	6.7
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	10.8	3.2	3.6	.0	.0	19.0	.0	12.5	6.7
TRANQUILIZANTES	.1	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	
BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
TABACO	23.2	13.8	11.3	19.0	66.7	22.5	29.6	25.6	33.3	
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	1.0	3.2	.0	.0	.0	.7	3.7	.7	26.7	
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	6.8	1.1	.8	.0	.0	.7	.0	9.5	13.3	
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	.1	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
BAJA CALIFORNIA SUR

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1633	n=572	n=37	n=419	n=192	n=2	n=411
SEXO	MASCULINO	93.3	98.8	97.3	88.5	98.4	100.0	87.8
	FEMENINO	6.7	1.2	2.7	11.5	1.6	.0	12.2
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.4	.5	.0	.5	.5	.0	.0
	15-19 AÑOS	12.7	13.6	27.0	9.5	7.3	.0	15.8
	20-24 AÑOS	20.6	24.7	24.3	12.9	24.5	50.0	20.7
	25-29 AÑOS	19.8	19.8	24.3	16.9	20.3	50.0	21.9
	30-34 AÑOS	16.8	15.0	13.5	17.4	27.1	.0	14.1
	35 AÑOS O MAS	29.8	26.4	10.8	42.7	20.3	.0	27.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.3	2.4	5.4	9.5	1.6	.0	2.7
	PRIMARIA	23.8	28.8	35.1	24.8	18.8	.0	17.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	1.4	2.7	1.2	.5	.0	.7
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	41.3	39.2	45.9	37.2	42.7	50.0	47.4
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.6	.3	.0	.2	.5	.0	1.2
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.8	25.9	10.8	21.0	29.7	.0	26.3
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	3.8	1.7	.0	5.5	5.7	50.0	4.1
	POSGRADO	.3	.2	.0	.5	.5	.0	.2
	SOLTERO	53.3	58.7	70.3	47.5	46.4	100.0	53.0
	CASADO	24.8	22.2	2.7	27.7	33.3	.0	23.6
	DIVORCIADO	2.9	3.7	.0	.7	2.6	.0	4.4
	SEPARADO	5.0	3.8	10.8	5.7	4.7	.0	5.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	.6	.2	.0	1.0	.0	.0	1.0
	UNION LIBRE	13.5	11.4	16.2	17.4	13.0	.0	12.4
	9 AÑOS O MENOS	4.5	4.0	16.2	3.8	1.0	.0	6.3
	10-14 AÑOS	41.6	44.4	67.6	32.2	20.8	50.0	54.5
	15-19 AÑOS	41.1	45.5	13.5	47.0	36.5	50.0	33.6
	20-24 AÑOS	7.5	4.0	.0	11.0	19.3	.0	4.1
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	3.2	1.6	2.7	3.3	13.0	.0	.7
	30-34 AÑOS	1.1	.2	.0	1.7	4.2	.0	.5
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.3	.0	1.0	5.2	.0	.2
	DIARIO	55.9	67.3	64.9	37.7	26.6	50.0	71.5
	2 - 3 VECES POR SEMANA	10.5	8.0	8.1	12.6	12.0	.0	11.4
	1 VEZ POR SEMANA	20.3	14.9	13.5	31.3	36.5	.0	9.7
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	12.9	9.3	13.5	18.1	24.0	50.0	7.1
	1 A 11 VECES AL AÑO	.4	.5	.0	.2	1.0	.0	.2

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
BAJA CALIFORNIA SUR



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
BAJA CALIFORNIA SUR**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	CRISTAL
		n=191	n=44	n=19	n=7	n=19	n=34
SEXO	MASCULINO	95.3	97.7	100.0	100.0	100.0	97.1
	FEMENINO	4.7	2.3	.0	.0	.0	2.9
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	19.5	6.8	10.5	.0	5.3	.0
	15 - 18 AÑOS	80.5	93.2	89.5	100.0	94.7	100.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	35.1	52.3	47.4	57.1	57.9	64.7
	SECUNDARIA	50.3	38.6	42.1	42.9	36.8	29.4
	PREPA	12.0	6.8	10.5	.0	5.3	2.9
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.6	2.3	.0	.0	.0	2.9
	ESTUDIANTE	24.6	11.4	15.8	.0	15.8	2.9
	EMPLEADO	27.7	34.1	36.8	42.9	57.9	35.3
	SUBEMPLEADO	28.8	36.4	15.8	14.3	5.3	32.4
HOGAR	HOGAR	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	NINGUNA	18.3	18.2	31.6	42.9	21.1	29.4
USA TATUAJES	SI	9.4	22.7	15.8	14.3	36.8	29.4
	NO	90.6	77.3	84.2	85.7	63.2	70.6
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	NO	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	18.3	45.5	57.9	57.1	52.6	61.8
	NO	81.7	54.5	42.1	42.9	47.4	38.2
TIPO DE INFRACCION	ROBO	69.6	79.5	78.9	85.7	94.7	94.1
	VIOLACION	3.7	2.3	5.3	14.3	5.3	5.9
	HOMICIDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	LESIONES A TERCEROS	6.8	2.3	5.3	.0	.0	.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	12.6	2.3	15.8	14.3	.0	5.9
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	9.4	15.9	10.5	28.6	.0	5.9
	CONSUMO DE DROGAS	2.6	9.1	5.3	.0	10.5	5.9
	PORTACION DE ARMA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	OTROS	22.5	.0	.0	14.3	.0	2.9
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	73.8	77.3	73.7	85.7	68.4
HOGAR		12.0	11.4	.0	14.3	10.5	23.5
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		1.0	2.3	10.5	.0	5.3	2.9
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0
LUGAR DE RECREO		7.3	2.3	.0	.0	.0	2.9
OTRO	5.8	6.8	15.8	.0	15.8	2.9	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
BAJA CALIFORNIA SUR

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=127	n=82	n=37	n=4	n=3	n=0	n=0	n=0	n=0	n=1	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	70,1	69,5	67,6	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	29,9	30,5	32,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	7,9	7,3	5,4	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	15-19	20,5	23,2	10,8	25,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	13,4	13,4	13,5	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,0	14,6	18,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	13,4	14,6	10,8	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	29,9	26,8	40,5	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	45,7	42,7	48,6	50,0	66,7	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	CASADO	25,2	29,3	21,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,0	7,3	16,2	25,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,7	9,8	5,4	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,4	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,8	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,3	6,1	8,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,5	14,8	10,8	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	40,5	42,0	32,4	75,0	33,3	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	7,1	6,2	10,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	25,4	24,7	27,0	25,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	13,5	12,3	18,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	20,5	21,3	14,7	25,0	33,3	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	5,7	6,3	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	36,9	32,5	52,9	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	14,8	13,8	11,8	25,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	2,5	2,5	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	10,7	12,5	5,9	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	7,4	10,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,6	1,3	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,7	1,3	3,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	8,5	6,6	15,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	76,9	76,3	75,8	100,0	66,7	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	BAJO	10,3	13,2	3,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	2,6	2,6	3,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
BAJA CALIFORNIA SUR

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABA CO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCA ÑA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=127	n=25	n=29	n=14	n=10	n=1	n=40	n=2	n=1	n=1	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	70,7	52,0	65,5	85,7	80,0	100,0	77,5	100,0	100,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	29,3	48,0	34,5	14,3	20,0	,0	22,5	,0	,0	100,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	8,1	24,0	3,4	7,1	10,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	15-19	21,1	,0	13,8	50,0	10,0	,0	32,5	,0	100,0	,0	,0	,0
	20-24	13,0	4,0	10,3	,0	10,0	,0	27,5	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,4	16,0	13,8	14,3	30,0	,0	12,5	50,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	13,8	12,0	6,9	14,3	30,0	,0	15,0	50,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	28,5	44,0	51,7	14,3	10,0	100,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	SOLTERO	45,5	32,0	37,9	50,0	30,0	,0	60,0	50,0	100,0	100,0	,0	,0
	CASADO	24,4	44,0	20,7	14,3	20,0	100,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,4	4,0	13,8	7,1	20,0	,0	12,5	50,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,9	8,0	13,8	21,4	10,0	,0	2,5	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,4	,0	3,4	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	VIUDO	,8	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,5	8,0	10,3	7,1	,0	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,9	8,0	20,7	7,1	20,0	,0	15,4	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	38,5	40,0	31,0	28,6	30,0	100,0	43,6	100,0	,0	100,0	,0	,0
OCUPACION	TECNICO O COMERCIAL	7,4	12,0	10,3	14,3	,0	,0	2,6	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	26,2	16,0	20,7	50,0	50,0	,0	23,1	,0	100,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	13,9	24,0	17,2	,0	,0	,0	15,4	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	21,2	16,0	17,9	57,1	22,2	,0	13,5	,0	,0	100,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	5,9	16,0	3,6	,0	11,1	,0	2,7	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	LABORAL ESTABLE	36,4	40,0	50,0	14,3	33,3	100,0	32,4	50,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,3	12,0	17,9	7,1	33,3	,0	13,5	50,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	2,5	,0	,0	7,1	,0	,0	5,4	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	11,0	4,0	,0	7,1	,0	,0	27,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	HOGAR	6,8	12,0	7,1	7,1	,0	,0	5,4	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,8	,0	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	ALTO	1,8	4,8	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	8,8	9,5	18,5	,0	,0	,0	7,9	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	77,0	85,7	63,0	91,7	90,0	100,0	71,1	100,0	100,0	100,0	,0	,0
	BAJO	9,7	,0	11,1	8,3	10,0	,0	15,8	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	POBREZA EXTREMA	2,7	,0	3,7	,0	,0	,0	5,3	,0	,0	,0	,0	,0
	TABA CO	63,4	76,0	37,9	92,9	60,0	100,0	70,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALCOHOL	30,1	24,0	62,1	,0	10,0	,0	27,5	50,0	,0	,0	,0	,0
	MARIGUANA	3,3	,0	,0	7,1	10,0	,0	,0	50,0	100,0	,0	,0	,0
	COCA ÑA	2,4	,0	,0	,0	20,0	,0	2,5	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CAMPECHE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
CAMPECHE**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=617	n=54	n=189	n=31	n=63	n=2	n=273	n=3	n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	91.9	94.4	93.7	90.3	87.3	100.0	91.2	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	8.1	5.6	6.3	9.7	12.7	.0	8.8	.0	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.9	3.7	1.1	12.9	6.3	.0	2.2	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	20.6	33.3	7.4	35.5	19.0	.0	25.6	.0	100.0	100.0
	20-24 AÑOS	19.1	20.4	9.0	25.8	15.9	.0	26.4	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	14.6	14.8	9.0	12.9	7.9	.0	20.5	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	13.0	11.1	14.3	9.7	3.2	50.0	14.3	66.7	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	29.8	16.7	59.3	3.2	47.6	50.0	11.0	33.3	.0	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.6	1.9	7.4	6.5	.0	.0	1.5	.0	.0	100.0
	PRIMARIA	33.5	38.9	39.2	35.5	12.7	.0	32.6	100.0	100.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.2	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	36.5	33.3	30.7	45.2	30.2	50.0	42.1	.0	.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.0	.0	2.1	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	18.6	24.1	14.8	12.9	30.2	50.0	18.3	.0	.0	.0
	LICENCIATURA	6.2	1.9	4.2	.0	27.0	.0	4.4	.0	.0	.0
	POSGRADO	.5	.0	1.1	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0
	CASADO	24.3	11.1	26.5	6.5	46.0	50.0	22.3	33.3	.0	.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53.8	77.8	40.7	77.4	44.4	.0	58.2	.0	100.0	100.0
	DIVORCIADO	3.9	3.7	7.9	3.2	1.6	.0	1.8	.0	.0	.0
	SEPARADO	9.2	5.6	13.2	6.5	3.2	50.0	8.1	66.7	.0	.0
	VIUDO	.6	1.9	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	8.1	.0	10.1	6.5	4.8	.0	9.5	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	8.3	18.5	3.2	16.1	7.9	.0	9.2	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	21.7	16.7	22.8	22.6	7.9	50.0	25.3	.0	.0	.0
	DESOCUPADO	12.6	13.0	12.2	16.1	11.1	.0	13.2	.0	.0	.0
	TRABAJO FIJO	23.3	20.4	25.4	19.4	44.4	.0	18.7	.0	.0	.0
	TRABAJO OCASIONAL	31.1	31.5	33.3	22.6	19.0	50.0	31.9	100.0	100.0	100.0
	AMA DE CASA	1.9	.0	1.6	3.2	4.8	.0	1.8	.0	.0	.0
	JUBILADO	1.0	.0	1.6	.0	4.8	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	61.3	68.5	51.3	67.7	85.7	100.0	59.7	66.7	100.0	100.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	31.4	22.2	40.7	22.6	7.9	.0	34.1	.0	.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	2.4	5.6	1.6	3.2	3.2	.0	2.2	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	2.1	1.9	2.6	3.2	3.2	.0	1.5	.0	.0	.0
	OTROS	2.8	1.9	3.7	3.2	.0	.0	2.6	33.3	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 CAMPECHE**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=617	n=54	n=189	n=31	n=63	n=2	n=273	n=3	n=1	n=1
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	72.6	81.5	64.0	71.0	79.4	100.0	75.5	66.7	.0	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	12.3	11.1	12.7	12.9	11.1	.0	12.5	.0	100.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	10.5	1.9	16.4	6.5	7.9	.0	9.2	33.3	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	3.6	3.7	6.9	.0	1.6	.0	2.2	.0	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.0	1.9	.0	9.7	.0	.0	.7	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.7	11.1	1.6	22.6	.0	50.0	3.7	33.3	.0	100.0
	10-14 AÑOS	42.9	40.7	32.8	58.1	30.2	.0	51.6	66.7	100.0	.0
	15-19 AÑOS	40.4	42.6	45.5	12.9	50.8	50.0	37.7	.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	9.6	5.6	15.3	6.5	17.5	.0	5.1	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	2.3	.0	4.2	.0	1.6	.0	1.8	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.2	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.2	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	42.6	24.1	76.2	9.7	22.2	50.0	32.2	.0	.0	.0
	MARIJUANA	12.0	29.6	5.3	9.7	.0	.0	16.5	.0	.0	.0
	INHALABLES	6.8	11.1	1.6	41.9	.0	50.0	6.6	33.3	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.5	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
	HEROINA	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	66.7	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	1.9	1.9	.5	.0	1.6	.0	3.3	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	32.3	25.9	16.4	38.7	76.2	.0	34.1	.0	100.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0
CRACK	3.2	1.9	.0	.0	.0	.0	7.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
CAMPECHE

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=612	n=74	n=42	n=263	n=32	n=2	n=199
SEXO	MASCULINO	91.8	97.3	92.9	92.4	87.5	100.0	89.4
	FEMENINO	8.2	2.7	7.1	7.6	12.5	.0	10.6
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.9	.0	4.8	1.1	6.3	.0	5.5
	15-19 AÑOS	20.3	25.7	14.3	11.0	31.3	.0	30.2
	20-24 AÑOS	19.3	18.9	35.7	12.2	37.5	.0	22.6
	25-29 AÑOS	14.5	17.6	11.9	16.7	9.4	.0	12.1
	30-34 AÑOS	12.9	14.9	21.4	14.8	9.4	100.0	7.5
	35 AÑOS O MAS	30.1	23.0	11.9	44.1	6.3	.0	22.1
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.4	2.7	4.8	5.7	.0	.0	1.0
	PRIMARIA	33.7	43.2	38.1	40.3	37.5	100.0	19.1
	TECNICO POST-PRIMARIA	.2	.0	.0	.4	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	36.4	35.1	47.6	31.9	43.8	.0	39.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.0	.0	.0	1.5	.0	.0	1.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	18.6	16.2	9.5	14.8	12.5	.0	27.6
	LICENCIATURA	6.2	2.7	.0	4.2	6.3	.0	11.6
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.5	.0	.0	1.1	.0	.0	.0
	SOLTERO	53.6	56.8	61.9	43.3	56.3	.0	64.3
	CASADO	24.5	21.6	19.0	27.0	18.8	50.0	24.1
	DIVORCIADO	3.9	2.7	.0	6.5	.0	.0	2.5
	SEPARADO	9.3	6.8	14.3	11.4	12.5	50.0	5.5
	VIUDO	.7	1.4	.0	1.1	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	8.0	10.8	4.8	10.6	12.5	.0	3.5
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.4	4.1	21.4	2.3	.0	.0	4.5
	10-14 AÑOS	43.1	58.1	52.4	31.9	46.9	100.0	49.2
	15-19 AÑOS	40.5	35.1	19.0	47.5	34.4	.0	39.2
	20-24 AÑOS	9.5	2.7	7.1	14.4	9.4	.0	6.0
	25-29 AÑOS	2.3	.0	.0	3.4	9.4	.0	1.0
	30-34 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.2	.0	.0	.4	.0	.0	.0
	DIARIO	62.1	78.4	71.4	46.4	68.8	50.0	73.9
	2 - 3 VECES POR SEMANA	14.2	8.1	14.3	17.1	15.6	.0	12.6
	1 VEZ POR SEMANA	14.1	2.7	4.8	23.2	3.1	50.0	9.5
	1 A 3 VECES POR MES	7.7	5.4	4.8	12.5	.0	.0	4.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.0	5.4	4.8	.8	12.5	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
CAMPECHE



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores
 usuarios de drogas 2007
 CAMPECHE**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO
		n=8	n=2
SEXO	MASCULINO	87.5	100.0
	FEMENINO	12.5	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	25.0	.0
	15 - 18 AÑOS	75.0	100.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	25.0	.0
	SECUNDARIA	50.0	50.0
	PREPA	.0	.0
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	25.0	50.0
	ESTUDIANTE	25.0	.0
	EMPLEADO	50.0	100.0
	SUBEMPLEADO	25.0	.0
USA TATUAJES	HOGAR	.0	.0
	NINGUNA	.0	.0
	SI	25.0	50.0
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	75.0	50.0
	SI	.0	.0
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	100.0	100.0
	SI	.0	.0
TIPO DE INFRACCION	ROBO	62.5	.0
	VIOLACION	25.0	50.0
	HOMICIDIO	12.5	50.0
	LESIONES A TERCEROS	.0	.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0
	SECUESTRO	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0
	PORTACION DE ARMA	.0	.0
	OTROS	.0	.0
	VIA PUBLICA	50.0	50.0
	HOGAR	25.0	.0
	TRABAJO	12.5	50.0
LUGAR DE LA INFRACCION	ESCUELA	.0	.0
	AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)	.0	.0
	LUGAR DE RECREO	.0	.0
	OTRO	12.5	.0

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
CAMPECHE**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	MARIJUANA	
		n=16	n=16	n=1	
SEXO	MASCULINO	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	12.5	12.5	.0	
	20 - 24 AÑOS	.0	.0	.0	
	25 - 29 AÑOS	6.3	6.3	.0	
	30 - 34 AÑOS	6.3	6.3	100.0	
	35 - 39 AÑOS	18.8	18.8	.0	
	40 AÑOS O MÁS	56.3	56.3	.0	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	6.3	6.3	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	25.0	25.0	.0	
	CAIDA	6.3	6.3	100.0	
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	
	QUEMADO	31.3	31.3	.0	
	GOLPES	.0	.0	.0	
	ASFIXIA	.0	.0	.0	
	APLASTAMIENTO	6.3	6.3	.0	
	ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	12.5	12.5	.0	
	VIOLACION	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	.0	.0	.0	
	ENVENENADO	.0	.0	.0	
	OTRAS	12.5	12.5	.0	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	6.3	6.3	.0
		CASA	12.5	12.5	.0
		CALLE	31.3	31.3	.0
BAÑOS PUBLICOS		6.3	6.3	100.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		.0	.0	.0	
TRABAJO		43.8	43.8	.0	
ARES DE SERVICIO		.0	.0	.0	
OTROS		.0	.0	.0	

N= 86 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
CAMPECHE**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=7	n=1	n=0	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=304 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 CAMPECHE**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=67	n=100	n=24	n=3	n=1	n=1	n=4	n=2	n=3	n=0	n=1
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	4.5	3.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	1.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	1.5	2.0	8.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	1.0	.0	.0	100.0	.0	25.0	50.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	9.0	9.0	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	.0	.0	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	1.5	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0	100.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEOMUSCULAR	3.0	1.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.5	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	6.0	3.0	4.2	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	4.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	10.4	9.0	16.7	66.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	1.5	1.0	.0	.0	.0	.0	25.0	50.0	33.3	.0	.0

N=304

Nota: El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas múltiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
CAMPECHE**

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=171	n=89	n=74	n=3	n=1	n=2	n=0	n=0	n=0	n=2	n=0	n=0
SEXO	MA SCULINO	64,9	77,5	50,0	66,7	100,0	50,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	FEMENINO	35,1	22,5	50,0	33,3	,0	50,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	16,5	10,2	25,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	20,0	23,9	17,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	12,9	14,8	9,5	,0	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	14,7	18,2	10,8	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	12,9	9,1	14,9	33,3	,0	50,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	22,9	23,9	21,6	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SOL TERO	46,2	51,7	43,2	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	22,2	15,7	28,4	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	U. LIBRE	7,6	7,9	6,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,2	9,0	6,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	4,1	5,6	1,4	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	11,1	9,0	13,5	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,8	1,1	1,4	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	17,1	19,1	13,7	33,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDA RIA	40,0	37,1	46,6	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	6,5	6,7	4,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	BACHILLERATO	20,6	20,2	20,5	33,3	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	LICENCIATURA	12,4	13,5	12,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,8	2,2	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	26,3	17,4	39,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,8	3,5	6,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	36,5	39,5	35,6	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	10,2	12,8	6,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	4,2	5,8	,0	,0	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	DESOCUPADO	12,6	15,1	8,2	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	HOGAR	4,8	4,7	2,7	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	PENSIONADO	,6	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,6	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO A LTO	17,9	14,1	24,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	61,1	71,8	49,3	66,7	100,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	BAJO	18,5	11,8	23,2	33,3	,0	100,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
POBREZA EXTREMA	1,9	2,4	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
CAMPECHE**

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=171	n=43	n=70	n=7	n=40	n=5	n=1	n=0	n=0	n=2	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	65,1	65,1	52,9	100,0	82,5	80,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	FEMENINO	34,9	34,9	47,1	,0	17,5	20,0	100,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	16,1	9,3	30,0	,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	19,6	4,7	22,9	57,1	20,5	40,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	13,1	2,3	15,7	28,6	15,4	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	25-29	14,9	14,0	8,6	14,3	25,6	40,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	13,1	23,3	10,0	,0	12,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	23,2	46,5	12,9	,0	20,5	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	45,6	30,2	52,9	71,4	45,0	60,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	22,5	34,9	18,6	,0	17,5	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	U. LIBRE	7,7	2,3	4,3	14,3	15,0	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SEPARADO	8,3	14,0	5,7	,0	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	4,1	9,3	,0	,0	7,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	11,2	7,0	18,6	14,3	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,8	2,3	1,4	,0	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	17,3	11,6	15,7	16,7	30,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	39,9	27,9	54,3	16,7	32,5	40,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	6,5	9,3	5,7	,0	2,5	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	BACHILLERATO	20,2	16,3	12,9	50,0	27,5	40,0	100,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	LICENCIATURA	12,5	25,6	10,0	16,7	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,8	7,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	26,1	12,5	42,0	42,9	10,0	40,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,8	,0	10,1	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	37,0	72,5	27,5	14,3	27,5	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	10,3	,0	7,2	14,3	22,5	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	4,2	5,0	1,4	,0	7,5	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	12,1	5,0	8,7	28,6	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	4,8	2,5	2,9	,0	7,5	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	PENSIONADO	,6	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,6	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	17,5	33,3	13,6	28,6	7,7	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	61,3	53,8	68,2	42,9	59,0	40,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	100,0
	BAJO	18,8	10,3	18,2	28,6	28,2	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,9	,0	,0	,0	5,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	51,5	62,8	34,3	71,4	60,0	100,0	100,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	ALCOHOL	43,8	37,2	62,9	14,3	30,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	MARIJUANA	1,8	,0	,0	,0	7,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	,6	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	1,2	,0	,0	14,3	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	1,2	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



COAHUILA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 COAHUILA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=691	n=52	n=120	n=39	n=6	n=3	n=220	n=216	n=23	n=11	n=
SEXO	MASCULINO	92.5	100.0	92.5	71.8	50.0	66.7	92.3	95.4	95.7	100.0	100.0
	FEMENINO	7.5	.0	7.5	28.2	50.0	33.3	7.7	4.6	4.3	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.6	3.8	.8	38.5	16.7	33.3	1.8	.0	4.3	.0	.0
	15-19 AÑOS	14.6	26.9	9.2	25.6	16.7	.0	14.5	12.0	13.0	36.4	.0
	20-24 AÑOS	17.9	30.8	8.3	5.1	.0	.0	20.5	20.8	17.4	18.2	.0
	25-29 AÑOS	22.7	17.3	12.5	15.4	16.7	.0	25.9	28.2	34.8	.0	.0
	30-34 AÑOS	16.5	9.6	13.3	10.3	.0	.0	15.9	22.7	13.0	18.2	.0
	35 AÑOS O MAS	24.6	11.5	55.8	5.1	50.0	66.7	21.4	16.2	17.4	27.3	100.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	5.8	.0	11.7	2.6	.0	.0	4.1	6.9	4.3	.0	.0
	PRIMARIA	25.9	26.9	25.8	25.6	33.3	.0	20.9	30.6	21.7	45.5	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	4.3	.0	3.3	15.4	.0	.0	5.0	4.2	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	39.8	51.9	28.3	53.8	33.3	33.3	35.0	44.4	47.8	45.5	100.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	5.6	.0	10.0	.0	16.7	.0	9.5	1.4	4.3	9.1	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	13.3	17.3	11.7	2.6	16.7	33.3	17.3	11.1	17.4	.0	.0
	LICENCIATURA	5.1	3.8	9.2	.0	.0	33.3	7.7	1.4	4.3	.0	.0
	POSGRADO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	27.9	15.4	45.0	5.1	16.7	66.7	31.4	24.5	13.0	9.1	.0
	SOLTERO	47.3	69.2	32.5	87.2	50.0	33.3	44.1	45.4	56.5	54.5	.0
	DIVORCIADO	5.4	3.8	9.2	.0	16.7	.0	4.5	4.6	8.7	.0	100.0
	SEPARADO	7.7	3.8	5.8	5.1	.0	.0	8.6	8.8	8.7	18.2	.0
	VIUDO	1.0	.0	.0	.0	16.7	.0	.0	1.9	8.7	.0	.0
	UNION LIBRE	10.7	7.7	7.5	2.6	.0	.0	11.4	14.8	4.3	18.2	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	6.5	9.6	4.2	30.8	33.3	33.3	5.5	3.2	4.3	.0	.0
	DESEMPLEADO	55.6	53.8	47.5	30.8	16.7	.0	54.5	66.2	69.6	54.5	100.0
	DESOCUPADO	11.3	19.2	11.7	17.9	16.7	.0	8.6	9.7	17.4	18.2	.0
	TRABAJO FIJO	15.1	3.8	18.3	5.1	16.7	66.7	22.7	10.6	.0	18.2	.0
	TRABAJO OCASIONAL	9.7	13.5	14.2	15.4	.0	.0	7.3	8.3	8.7	9.1	.0
	AMA DE CASA	1.7	.0	3.3	.0	16.7	.0	1.4	1.9	.0	.0	.0
	JUBILADO	.1	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	68.5	48.1	66.7	35.9	50.0	66.7	79.1	69.4	78.3	63.6	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	24.5	38.5	27.5	41.0	33.3	33.3	17.3	23.1	17.4	36.4	100.0
	POR INDICACION LEGAL	2.9	7.7	.8	.0	.0	.0	1.8	4.6	4.3	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.1	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	4.1	5.8	4.2	23.1	16.7	.0	1.8	2.8	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
COAHUILA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=691	n=52	n=120	n=39	n=6	n=3	n=220	n=216	n=23	n=11	n=1
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	85.4	78.8	83.3	61.5	66.7	66.7	80.0	99.5	78.3	81.8	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	5.4	9.6	5.8	10.3	.0	.0	8.6	.0	4.3	9.1	.0
	1 VEZ POR SEMANA	4.9	7.7	9.2	2.6	16.7	.0	6.8	.0	4.3	9.1	.0
	1 A 3 VECES POR MES	2.2	1.9	.0	5.1	.0	.0	4.1	.5	8.7	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	2.2	1.9	1.7	20.5	16.7	33.3	.5	.0	4.3	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	4.1	1.9	2.5	5.1	.0	.0	1.8	7.9	4.3	.0	.0
	10-14 AÑOS	39.8	53.8	21.7	64.1	66.7	33.3	32.3	46.3	52.2	63.6	100.0
	15-19 AÑOS	40.4	40.4	43.3	30.8	33.3	.0	44.5	38.0	34.8	36.4	.0
	20-24 AÑOS	11.9	3.8	25.8	.0	.0	33.3	15.0	6.5	4.3	.0	.0
	25-29 AÑOS	3.0	.0	5.8	.0	.0	.0	4.5	1.4	4.3	.0	.0
	30-34 AÑOS	.4	.0	.8	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.4	.0	.0	.0	.0	33.3	.9	.0	.0	.0	.0
	ALCOHOL	31.7	17.3	83.3	12.8	16.7	33.3	37.7	6.9	13.0	18.2	.0
	MARIGUANA	35.5	67.3	7.5	28.2	.0	.0	35.0	42.1	60.9	63.6	100.0
	INHALABLES	12.6	3.8	2.5	43.6	.0	.0	9.1	19.4	8.7	9.1	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	6.5	.0	.0	.0	.0	.0	.5	20.4	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.4	1.9	.8	.0	.0	.0	12.3	3.7	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	1.6	.0	.0	.0	.0	33.3	.5	4.2	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	4.6	9.6	5.8	15.4	83.3	33.3	2.7	.0	4.3	9.1	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	OTROS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	13.0	.0	.0
ROHYPNOL	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	
CRACK	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	1.4	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
COAHUILA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=672	n=245	n=87	n=219	n=44	n=45	n=32
SEXO	MASCULINO	92.4	97.1	83.9	94.1	90.9	91.1	71.9
	FEMENINO	7.6	2.9	16.1	5.9	9.1	8.9	28.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.6	2.0	10.3	.9	.0	.0	25.0
	15-19 AÑOS	15.0	15.9	20.7	9.6	18.2	6.7	37.5
	20-24 AÑOS	18.2	19.6	24.1	11.9	31.8	24.4	6.3
	25-29 AÑOS	22.6	26.1	18.4	16.9	29.5	44.4	6.3
	30-34 AÑOS	16.1	15.9	14.9	17.4	13.6	22.2	6.3
	35 AÑOS O MAS	24.6	20.4	11.5	43.4	6.8	2.2	18.8
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	5.8	2.9	10.3	7.3	2.3	8.9	6.3
	PRIMARIA	25.7	33.1	28.7	18.3	25.0	17.8	25.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	4.5	4.1	6.9	4.1	2.3	8.9	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	40.3	45.7	46.0	27.9	43.2	46.7	56.3
	TECNICO POST-SECUNDARIA	5.8	3.3	2.3	11.0	4.5	4.4	3.1
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	12.6	9.0	5.7	19.2	18.2	11.1	9.4
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	5.1	2.0	.0	11.9	4.5	2.2	.0
	POSGRADO	.1	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	SOLTERO	47.0	49.4	64.4	34.2	45.5	46.7	71.9
	CASADO	28.1	22.4	11.5	42.9	27.3	28.9	15.6
	DIVORCIADO	5.4	4.9	.0	7.3	6.8	6.7	6.3
	SEPARADO	7.6	7.8	12.6	7.3	4.5	6.7	.0
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.0	1.6	1.1	.5	.0	2.2	.0
	UNION LIBRE	10.9	13.9	10.3	7.8	15.9	8.9	6.3
	9 AÑOS O MENOS	4.2	4.9	13.8	1.4	.0	.0	3.1
	10-14 AÑOS	39.4	51.8	57.5	21.0	34.1	11.1	68.8
	15-19 AÑOS	40.5	35.5	27.6	47.9	36.4	68.9	28.1
	20-24 AÑOS	12.2	6.1	1.1	22.4	20.5	17.8	.0
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	3.0	1.6	.0	5.5	6.8	2.2	.0
	30-34 AÑOS	.4	.0	.0	1.4	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.3	.0	.0	.5	2.3	.0	.0
	DIARIO	77.5	87.3	73.6	68.0	68.2	100.0	59.4
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.3	3.3	12.6	6.4	15.9	.0	6.3
	1 VEZ POR SEMANA	10.3	4.9	5.7	19.2	13.6	.0	12.5
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	3.7	4.5	3.4	4.1	2.3	.0	3.1
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.2	.0	4.6	2.3	.0	.0	18.8

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
COAHUILA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
 COAHUILA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	
		n=84	n=31	n=6	n=7	n=17	
SEXO	MASCULINO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	.0	.0	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	14.6	6.5	16.7	.0	17.6	
	15 - 18 AÑOS	85.4	93.5	83.3	100.0	82.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	42.9	48.4	66.7	28.6	58.8	
	SECUNDARIA	47.6	51.6	33.3	71.4	35.3	
	PREPA	7.1	.0	.0	.0	5.9	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	
	NO ESTUDIO	2.4	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	ESTUDIANTE	10.7	3.2	.0	.0	5.9	
	EMPLEADO	2.4	.0	.0	.0	.0	
	SUBEMPLEADO	66.7	80.6	83.3	71.4	52.9	
	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	
USA TATUAJES	NINGUNA	20.2	16.1	16.7	28.6	41.2	
	SI	26.2	35.5	66.7	57.1	23.5	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	73.8	64.5	33.3	42.9	76.5	
	SI	22.6	32.3	33.3	28.6	29.4	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	77.4	67.7	66.7	71.4	70.6	
	SI	22.6	41.9	33.3	57.1	17.6	
TIPO DE INFRACCION	NO	77.4	58.1	66.7	42.9	82.4	
	ROBO	96.4	100.0	100.0	85.7	100.0	
	VIOLACION	2.4	3.2	.0	.0	5.9	
	HOMICIDIO	7.1	3.2	.0	14.3	11.8	
	LESIONES A TERCEROS	2.4	3.2	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	1.2	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.8	6.5	.0	14.3	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	1.2	3.2	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	15.5	19.4	.0	28.6	17.6	
	OTROS	3.6	.0	16.7	14.3	5.9	
	LUGAR DE LA INFRACCION	NO CONTESTO	96.4	100.0	83.3	85.7	94.1
		VIA PUBLICA	75.0	74.2	83.3	71.4	58.8
		HOGAR	20.2	19.4	16.7	28.6	35.3
		TRABAJO	.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		2.4	3.2	.0	.0	5.9	
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.2	.0	.0	.0	.0	
OTRO		1.2	3.2	.0	.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
COAHUILA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	COCAINA	MARIGUANA	
		n=32	n=27	n=4	n=9	
SEXO	MASCULINO	75.0	77.8	75.0	77.8	
	FEMENINO	25.0	22.2	25.0	22.2	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	6.3	7.4	.0	22.2	
	20 - 24 AÑOS	40.6	37.0	75.0	44.4	
	25 - 29 AÑOS	12.5	11.1	.0	22.2	
	30 - 34 AÑOS	12.5	11.1	25.0	11.1	
	35 - 39 AÑOS	3.1	3.7	.0	.0	
	40 AÑOS O MÁS	25.0	29.6	.0	.0	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	6.3	7.4	.0	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	28.1	29.6	25.0	11.1	
	CAIDA	.0	.0	.0	.0	
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0	
	QUEMADO	.0	.0	.0	.0	
	GOLPES	3.1	3.7	25.0	.0	
	ASFIXIA	31.3	25.9	25.0	44.4	
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	6.3	7.4	.0	.0	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	9.4	7.4	.0	33.3	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	3.1	3.7	25.0	.0	
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	
	OTRAS	12.5	14.8	.0	11.1	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	28.1	33.3	.0	22.2
		CASA	37.5	33.3	50.0	33.3
		CALLE	31.3	29.6	25.0	44.4
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		.0	.0	.0	.0	
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	
ARES DE SERVICIO		3.1	3.7	25.0	.0	
OTROS		.0	.0	.0	.0	

N=270 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
COAHUILA**

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=631	n=407	n=137	n=30	n=4	n=47	n=2	n=0	n=0	n=1	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	79,0	78,6	78,1	93,3	50,0	78,7	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	FEMENINO	21,0	21,4	21,9	6,7	50,0	21,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	17,9	15,6	23,4	3,3	25,0	31,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	32,1	33,8	28,5	33,3	25,0	27,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	16,8	17,5	13,1	26,7	,0	17,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	10,9	11,6	8,0	16,7	25,0	8,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	7,7	6,9	9,5	10,0	25,0	6,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	14,7	14,6	17,5	10,0	,0	8,5	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	58,6	55,5	67,2	50,0	25,0	70,2	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	18,0	18,2	19,0	23,3	,0	10,6	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	U. LIBRE	9,1	9,8	7,3	16,7	25,0	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	9,7	10,8	5,1	6,7	50,0	10,6	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,2	3,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,8	1,2	1,5	3,3	,0	6,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,5	,5	,0	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,6	,5	,0	,0	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,9	12,0	12,5	13,3	,0	21,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	51,3	49,1	52,2	46,7	100,0	70,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,9	5,0	2,2	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	21,6	24,2	19,9	23,3	,0	4,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	8,4	7,7	12,5	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,8	1,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	24,8	23,0	32,3	6,7	33,3	32,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,1	4,8	3,8	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	20,4	21,0	19,2	30,0	,0	10,9	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	18,3	17,9	16,9	36,7	33,3	13,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,7	8,1	6,9	10,0	,0	6,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	17,6	18,4	13,1	13,3	33,3	26,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	6,6	6,6	6,9	,0	,0	8,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,5	,3	,8	,0	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	3,0	3,1	3,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	15,5	16,5	17,6	17,2	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	51,3	50,6	59,5	37,9	50,0	41,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	29,0	28,7	17,6	44,8	50,0	54,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,2	1,0	1,5	,0	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
COAHUILA

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABA CO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=631	n=79	n=117	n=78	n=191	n=94	n=11	n=0	n=1	n=6	n=4	n=0
SEXO	MASCULINO	79,2	64,6	73,5	92,3	85,3	78,7	63,6	,0	100,0	66,7	50,0	,0
	FEMENINO	20,8	35,4	26,5	7,7	14,7	21,3	36,4	,0	,0	33,3	50,0	,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	15,7	25,3	7,8	12,8	5,8	41,5	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	15-19	32,3	15,2	33,9	51,3	24,1	45,7	36,4	,0	100,0	33,3	,0	,0
	20-24	18,3	10,1	10,4	15,4	30,9	10,6	27,3	,0	,0	,0	50,0	,0
	25-29	10,5	1,3	14,8	5,1	17,8	1,1	18,2	,0	,0	16,7	25,0	,0
	30-34	7,9	3,8	12,2	6,4	11,5	,0	9,1	,0	,0	,0	25,0	,0
	35 Y MAS	15,2	44,3	20,9	9,0	9,9	1,1	9,1	,0	,0	16,7	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	57,0	44,3	52,1	74,4	41,4	91,5	45,5	,0	100,0	66,7	50,0	,0
	CASADO	18,4	24,1	25,6	9,0	23,0	2,1	36,4	,0	,0	16,7	,0	,0
	U. LIBRE	9,6	11,4	8,5	7,7	13,6	3,2	9,1	,0	,0	16,7	,0	,0
	SEPARADO	10,2	2,5	9,4	6,4	19,4	2,1	9,1	,0	,0	,0	25,0	,0
	DIVORCIADO	2,4	8,9	1,7	1,3	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0
	VIUDO	,7	3,8	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,7	5,1	1,7	1,3	1,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,5	,0	,0	1,3	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,0	,9	,0	,5	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,1	8,9	13,2	17,1	11,6	18,3	,0	,0	,0	,0	25,0	,0
	SECUNDARIA	49,8	49,4	40,4	40,8	50,5	68,8	36,4	,0	,0	83,3	25,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,2	6,3	5,3	5,3	4,2	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	22,3	15,2	25,4	34,2	23,2	11,8	45,5	,0	,0	,0	25,0	,0
	LICENCIATURA	8,7	17,7	13,2	1,3	8,4	,0	9,1	,0	100,0	16,7	25,0	,0
	POSGRADO	,9	2,5	1,8	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	22,4	31,6	24,6	26,7	8,6	38,5	9,1	,0	100,0	16,7	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,7	3,9	1,8	6,7	3,2	5,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	20,8	26,3	27,2	13,3	24,9	5,5	18,2	,0	,0	16,7	50,0	,0
	LABORAL INESTABLE	19,0	9,2	20,2	13,3	27,6	13,2	18,2	,0	,0	33,3	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,3	3,9	7,0	8,0	10,3	6,6	36,4	,0	,0	,0	25,0	,0
	DESOCUPADO	18,5	3,9	13,2	32,0	20,0	25,3	,0	,0	,0	16,7	25,0	,0
	HOGAR	6,7	19,7	5,3	,0	4,9	5,5	18,2	,0	,0	16,7	,0	,0
	PENSIONADO	,5	1,3	,9	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	3,2	8,6	4,5	1,3	2,7	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	MEDIO ALTO	16,2	17,1	23,2	15,8	15,1	8,9	9,1	,0	100,0	16,7	25,0	,0
	MEDIO BAJO	50,2	48,6	50,9	52,6	51,1	48,9	54,5	,0	,0	33,3	25,0	,0
	BAJO	29,3	25,7	20,5	28,9	29,6	41,1	36,4	,0	,0	33,3	50,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,1	,0	,9	1,3	1,6	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABA CO	66,6	78,5	65,0	70,5	70,5	52,1	54,5	,0	100,0	33,3	25,0	,0
	ALCOHOL	20,2	17,7	29,9	20,5	13,2	19,1	45,5	,0	,0	33,3	50,0	,0
	MARIGUANA	4,8	1,3	2,6	6,4	7,4	3,2	,0	,0	,0	16,7	25,0	,0
	COCAÍNA	,7	,0	,0	,0	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	7,2	2,5	2,6	2,6	5,8	25,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,3	,0	,0	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CHIAPAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
CHIAPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	ROHYPNOL	D.MEDICAS **
		n=1016	n=82	n=766	n=31	n=1	n=128	n=3	n=1	n=4
SEXO	MASCULINO	92.2	95.1	91.9	93.5	.0	94.5	100.0	.0	50.0
	FEMENINO	7.8	4.9	8.1	6.5	100.0	5.5	.0	100.0	50.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.5	2.4	.9	6.5	.0	2.3	33.3	.0	.0
	15-19 AÑOS	9.6	14.6	6.3	51.6	.0	16.4	.0	.0	25.0
	20-24 AÑOS	15.7	23.2	11.5	19.4	100.0	32.8	33.3	.0	75.0
	25-29 AÑOS	13.8	24.4	12.1	9.7	.0	18.0	.0	100.0	.0
	30-34 AÑOS	14.6	11.0	15.1	6.5	.0	15.6	33.3	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	44.8	24.4	54.0	6.5	.0	14.8	.0	.0	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	14.6	9.8	17.5	3.3	.0	3.9	.0	.0	.0
	PRIMARIA	38.5	32.9	39.9	53.3	.0	32.0	33.3	.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	2.4	.3	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	24.7	31.7	22.6	40.0	.0	28.9	66.7	.0	25.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	3.7	.4	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.0	11.0	12.4	3.3	100.0	25.8	.0	.0	75.0
	LICENCIATURA	6.8	8.5	6.7	.0	.0	7.8	.0	100.0	.0
	POSGRADO	.2	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	19.0	8.5	21.8	3.2	.0	13.3	.0	.0	25.0
	SOLTERO	44.3	68.3	37.5	77.4	100.0	60.9	33.3	100.0	50.0
	DIVORCIADO	2.7	4.9	2.5	.0	.0	3.1	.0	.0	.0
	SEPARADO	14.1	9.8	16.4	.0	.0	7.0	.0	.0	.0
	VIUDO	1.3	1.2	1.4	3.2	.0	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	18.7	7.3	20.4	16.1	.0	15.6	66.7	.0	25.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	4.4	4.9	3.0	6.5	100.0	9.6	.0	.0	50.0
	DESEMPLEADO	20.0	27.2	18.7	22.6	.0	24.0	.0	.0	.0
	DESOCUPADO	8.5	11.1	7.4	22.6	.0	9.6	.0	100.0	.0
	TRABAJO FIJO	28.3	12.3	30.9	16.1	.0	26.4	33.3	.0	25.0
	TRABAJO OCASIONAL	36.3	43.2	36.7	32.3	.0	30.4	66.7	.0	25.0
	AMA DE CASA	1.7	.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.9	1.2	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	26.1	26.8	23.6	29.0	.0	38.3	100.0	100.0	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	68.6	63.4	71.1	64.5	100.0	58.6	.0	.0	100.0
	POR INDICACION LEGAL	1.8	3.7	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.1	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	OTROS	3.3	6.1	3.1	6.5	.0	2.3	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
CHIAPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	ROHYPNOL	D.MEDICAS **
		n=1016	n=82	n=766	n=31	n=1	n=128	n=3	n=1	n=4
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	55.0	65.4	52.1	74.2	.0	62.2	33.3	100.0	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	14.4	11.1	15.4	6.5	.0	13.4	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	16.7	7.4	17.9	9.7	.0	16.5	66.7	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	12.8	12.3	13.7	9.7	100.0	7.1	.0	.0	50.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	1.1	3.7	.9	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	5.0	9.8	4.0	12.9	.0	5.5	33.3	.0	.0
	10-14 AÑOS	36.9	56.1	32.4	54.8	.0	46.1	66.7	.0	75.0
	15-19 AÑOS	41.1	29.3	44.1	25.8	100.0	35.9	.0	.0	25.0
	20-24 AÑOS	10.2	3.7	11.5	6.5	.0	8.6	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	4.1	1.2	4.8	.0	.0	2.3	.0	100.0	.0
DROGA DE INICIO	30-34 AÑOS	1.0	.0	1.2	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.6	.0	2.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	ALCOHOL	74.2	50.0	83.9	29.0	.0	46.1	33.3	.0	25.0
	MARIGUANA	7.1	29.3	1.4	19.4	.0	22.7	33.3	.0	25.0
	INHALABLES	3.5	12.2	1.2	29.0	.0	6.3	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0
	COCAINA	1.9	1.2	.3	6.5	.0	10.9	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	12.4	7.3	13.1	16.1	.0	10.9	33.3	.0	.0
ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ROHYPNOL	.2	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	
CRACK	.5	.0	.1	.0	.0	3.1	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
 CHIAPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=1012	n=72	n=36	n=754	n=24	n=126
SEXO	MASCULINO	92.4	93.1	91.7	92.6	87.5	92.1
	FEMENINO	7.6	6.9	8.3	7.4	12.5	7.9
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.5	1.4	13.9	.4	.0	4.8
	15-19 AÑOS	9.6	16.7	27.8	6.2	16.7	19.0
	20-24 AÑOS	15.6	41.7	19.4	12.1	41.7	15.9
	25-29 AÑOS	13.7	22.2	25.0	12.2	16.7	14.3
	30-34 AÑOS	14.6	5.6	2.8	16.3	12.5	13.5
	35 AÑOS O MAS	45.0	12.5	11.1	52.8	12.5	32.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	14.6	5.6	22.2	15.4	4.2	15.2
	PRIMARIA	38.7	47.2	44.4	39.1	25.0	32.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	1.4	.0	.4	.0	.8
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	24.7	26.4	25.0	23.9	41.7	25.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	2.8	.0	.4	.0	1.6
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	13.8	11.1	8.3	13.1	29.2	18.4
	LICENCIATURA	6.7	5.6	.0	7.4	.0	6.4
	POSGRADO	.2	.0	.0	.3	.0	.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	44.2	69.4	69.4	37.7	70.8	56.3
	CASADO	19.0	6.9	8.3	21.5	12.5	15.1
	DIVORCIADO	2.7	1.4	.0	2.9	4.2	2.4
	SEPARADO	14.1	5.6	5.6	16.4	4.2	9.5
	VIUDO	1.3	1.4	2.8	1.5	.0	.0
	UNION LIBRE	18.8	15.3	13.9	20.0	8.3	16.7
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	5.0	13.9	22.2	3.1	4.2	7.1
	10-14 AÑOS	36.9	51.4	55.6	33.2	4.2	51.6
	15-19 AÑOS	41.2	30.6	19.4	43.9	58.3	34.1
	20-24 AÑOS	10.3	4.2	2.8	11.8	20.8	4.8
	25-29 AÑOS	4.1	.0	.0	5.2	4.2	.8
	30-34 AÑOS	1.0	.0	.0	1.1	4.2	.8
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.6	.0	.0	1.9	4.2	.8
	DIARIO	52.4	76.1	77.8	45.9	47.8	71.4
	2 - 3 VECES POR SEMANA	13.5	5.6	8.3	14.1	26.1	13.5
	1 VEZ POR SEMANA	16.8	8.5	11.1	19.6	17.4	6.3
	1 A 3 VECES POR MES	16.0	9.9	2.8	19.1	4.3	7.1
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.3	.0	.0	1.3	4.3	1.6

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007 CHIAPAS



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
CHIAPAS

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	
		n=619	n=17	n=2	n=7	n=11	
SEXO	MASCULINO	90.8	100.0	100.0	85.7	81.8	
	FEMENINO	9.2	.0	.0	14.3	18.2	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	21.3	11.8	50.0	.0	9.1	
	15 - 18 AÑOS	78.7	88.2	50.0	100.0	90.9	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	43.0	64.7	50.0	42.9	45.5	
	SECUNDARIA	35.7	23.5	50.0	42.9	36.4	
	PREPA	10.5	11.8	.0	14.3	9.1	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	10.8	.0	.0	.0	9.1	
	ESTUDIANTE	27.6	11.8	.0	28.6	9.1	
	EMPLEADO	36.0	70.6	.0	14.3	63.6	
	SUBEMPLEADO	22.8	11.8	100.0	42.9	9.1	
HOGAR	HOGAR	1.8	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	11.8	5.9	.0	14.3	18.2	
USA TATUAJES	SI	21.4	35.3	.0	28.6	18.2	
	NO	78.6	64.7	100.0	71.4	81.8	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	8.3	11.8	50.0	14.3	9.1	
	NO	91.7	88.2	50.0	85.7	90.9	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	16.5	52.9	100.0	14.3	54.5	
	NO	83.5	47.1	.0	85.7	45.5	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	53.8	52.9	50.0	57.1	45.5	
	VIOLACION	7.6	5.9	.0	14.3	.0	
	HOMICIDIO	2.9	.0	.0	.0	18.2	
	LESIONES A TERCEROS	9.5	5.9	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	1.9	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	.6	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	3.4	23.5	.0	14.3	18.2	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	8.1	11.8	50.0	14.3	9.1	
	OTROS	21.5	5.9	.0	.0	9.1	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	79.6	82.4	100.0	57.1	72.7
		HOGAR	11.3	17.6	.0	14.3	27.3
		TRABAJO	1.9	.0	.0	14.3	.0
		ESCUELA	.8	.0	.0	.0	.0
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.2	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		2.7	.0	.0	.0	.0	
OTRO	3.4	.0	.0	14.3	.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
CHIAPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIGUANA	OPIOIDES*
		n=	n=	n=	n=	n=	n=
SEXO	MASCULINO	89.8	89.7	.0	100.0	100.0	.0
	FEMENINO	10.2	10.3	.0	.0	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	1.7	1.7	.0	.0	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	16.9	15.5	.0	33.3	50.0	.0
	25 - 29 AÑOS	20.3	20.7	.0	.0	.0	.0
	30 - 34 AÑOS	13.6	13.8	.0	33.3	.0	.0
	35 - 39 AÑOS	10.2	10.3	.0	.0	.0	.0
	40 AÑOS O MÁS	37.3	37.9	.0	33.3	50.0	.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	13.6	13.8	.0	33.3	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	22.0	22.4	.0	.0	.0	.0
	CAIDA	3.4	3.4	.0	.0	.0	.0
	ELECTROCUTADO	1.7	1.7	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	GOLPES	1.7	1.7	.0	.0	50.0	.0
	ASFIXIA	25.4	25.9	.0	.0	.0	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	16.9	17.2	.0	33.3	50.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	10.2	10.3	.0	.0	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	3.4	1.7	.0	33.3	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	1.7	1.7	.0	.0	.0	.0
LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	16.9	17.2	.0	.0	.0	.0
	CASA	28.8	27.6	.0	33.3	.0	.0
	CALLE	42.4	43.1	.0	33.3	100.0	.0
	BAÑOS PUBLICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	10.2	10.3	.0	33.3	.0	.0
	TRABAJO	1.7	1.7	.0	.0	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=59 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
CHAPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=338	n=172	n=97	n=22	n=4	n=23	n=0	n=1	n=1	n=0	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	86,3	83,1	87,6	100,0	100,0	95,7	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	13,7	16,9	12,4	,0	,0	4,3	,0	100,0	,0	,0	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	4,1	3,5	4,2	4,5	,0	8,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	30,9	33,7	26,0	36,4	50,0	21,7	,0	100,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	20,3	23,3	15,6	13,6	25,0	26,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,6	13,4	18,8	13,6	,0	17,4	,0	,0	100,0	,0	,0	100,0
	30-34	11,6	9,3	16,7	9,1	25,0	8,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	17,5	16,9	18,8	22,7	,0	17,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	55,5	58,1	49,5	68,2	50,0	47,8	,0	100,0	100,0	,0	,0	,0
	CASADO	19,0	19,2	21,6	9,1	,0	17,4	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	U. LIBRE	12,1	9,9	13,4	18,2	25,0	17,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,5	8,1	5,2	4,5	25,0	13,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,2	,6	2,1	,0	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,2	,6	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	3,4	3,5	5,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	2,5	,6	5,2	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,9	1,2	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	16,5	15,1	14,4	9,1	25,0	43,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	35,8	36,6	37,1	36,4	25,0	26,1	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	1,6	1,7	1,0	,0	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	29,0	31,4	25,8	31,8	25,0	17,4	,0	100,0	,0	,0	,0	100,0
	LICENCIATURA	13,4	12,8	15,5	13,6	25,0	8,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	23,3	20,4	26,4	33,3	50,0	17,4	,0	100,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	5,7	6,2	4,6	,0	,0	13,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	43,0	41,4	46,0	42,9	,0	52,2	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	16,0	19,1	11,5	19,0	25,0	8,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	1,7	2,5	,0	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,0	9,3	9,2	,0	25,0	8,7	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	HOGAR	,7	,6	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,7	,6	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	12,2	13,2	6,8	19,0	50,0	10,5	,0	100,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	40,1	40,9	44,3	33,3	25,0	31,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	45,2	44,0	46,6	42,9	25,0	52,6	,0	,0	100,0	,0	,0	100,0
	POBREZA EXTREMA	2,0	1,3	2,3	4,8	,0	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
CHAPAS

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=338	n=16	n=105	n=104	n=86	n=17	n=2	n=0	n=0	n=3	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	86,2	62,5	78,1	96,2	89,5	94,1	50,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	FEMENINO	13,8	37,5	21,9	3,8	10,5	5,9	50,0	,0	,0	33,3	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	4,2	12,5	4,8	1,9	1,2	23,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	31,8	37,5	37,1	26,2	22,1	70,6	,0	,0	,0	66,7	,0	100,0
	20-24	20,7	6,3	16,2	26,2	26,7	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,0	,0	13,3	16,5	19,8	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	11,4	6,3	8,6	12,6	17,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	16,8	37,5	20,0	16,5	12,8	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	57,2	56,3	65,7	51,0	45,3	100,0	50,0	,0	,0	66,7	,0	100,0
	CASADO	17,4	18,8	12,4	19,2	24,4	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	U. LIBRE	12,0	,0	9,5	18,3	12,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,5	18,8	4,8	4,8	12,8	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,2	,0	3,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,2	6,3	,0	1,9	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,6	,0	3,8	4,8	3,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	2,4	,0	,0	6,7	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,6	,0	,0	1,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	18,0	6,3	8,6	26,0	25,6	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	35,6	25,0	39,0	28,8	32,6	82,4	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	1,5	,0	1,0	1,9	1,2	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	28,7	50,0	33,3	28,8	22,1	5,9	50,0	,0	,0	33,3	,0	100,0
	LICENCIATURA	12,9	18,8	18,1	6,7	15,1	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,3	,0	,0	,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	23,6	20,0	34,3	18,2	11,5	50,0	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	5,4	6,7	5,1	7,1	1,3	18,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	43,1	26,7	34,3	52,5	52,6	18,8	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,7	26,7	13,1	17,2	15,4	6,3	50,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	DESEMPLEADO	1,6	,0	3,0	1,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,3	13,3	9,1	2,0	17,9	6,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	,6	,0	1,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,6	6,7	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,3	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	12,5	14,3	12,1	15,5	10,7	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	39,3	50,0	44,0	29,9	41,7	46,7	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	BAJO	45,6	35,7	41,8	49,5	46,4	46,7	100,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	POBREZA EXTREMA	2,3	,0	1,1	5,2	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	53,5	81,3	48,5	54,6	56,1	29,4	100,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	ALCOHOL	30,2	6,3	44,6	22,7	25,6	35,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	MARIJUANA	6,9	6,3	3,0	9,3	11,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	1,3	,0	,0	3,1	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	7,2	6,3	2,0	9,3	6,1	35,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,3	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,3	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,3	,0	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CHIHUAHUA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
CHIHUAHUA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL n=6996	MARIGUANA n=345	ALCOHOL n=1463	INHALABLES n=310	TABACO n=33	TRANQUILIZANTES n=58	COCAINA* n=2520	HEROINA n=2170	CRISTAL n=36	ROHYPNOL n=3	D.MEDICAS ** n=16	D.ILEGALES *** n=42	
SEXO	MASCULINO	92.2	93.3	92.1	86.1	84.8	82.8	91.6	94.0	88.9	100.0	87.5	92.9	
	FEMENINO	7.8	6.7	7.9	13.9	15.2	17.2	8.4	6.0	11.1	.0	12.5	7.1	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	2.6	.8	12.6	6.1	1.7	1.0	.1	.0	.0	.0	.0	
	15-19 AÑOS	11.9	27.2	4.6	40.6	27.3	25.9	16.7	3.8	13.9	33.3	25.0	14.3	
	20-24 AÑOS	16.5	22.6	7.3	21.0	12.1	15.5	21.3	15.5	19.4	.0	12.5	23.8	
	25-29 AÑOS	18.6	15.7	8.8	9.0	9.1	17.2	20.8	24.5	25.0	33.3	25.0	19.0	
	30-34 AÑOS	17.0	11.0	12.4	7.4	9.1	10.3	16.6	23.2	19.4	33.3	18.8	9.5	
	35 AÑOS O MAS	34.7	20.9	66.1	9.4	36.4	29.3	23.5	32.9	22.2	.0	18.8	33.3	
	NO FUE A LA ESCUELA	4.3	3.5	6.8	3.9	3.0	1.7	3.1	4.2	11.1	.0	.0	2.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	46.3	42.3	50.2	55.5	30.3	48.3	39.4	51.8	25.0	33.3	31.3	38.1	
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.0	1.4	1.5	.3	.0	.0	1.0	.9	.0	.0	.0	.0	
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	32.9	35.1	25.8	32.6	48.5	24.1	36.5	32.7	55.6	.0	43.8	31.0	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.9	.9	1.5	.3	.0	1.7	.8	.8	.0	.0	.0	2.4	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	12.0	15.4	10.0	7.1	12.1	17.2	15.7	8.8	8.3	66.7	25.0	19.0	
	LICENCIATURA	2.4	1.4	4.1	.3	6.1	5.2	3.2	.7	.0	.0	.0	4.8	
	POSGRADO	.2	.0	.1	.0	.0	1.7	.3	.1	.0	.0	.0	2.4	
	ESTADO CIVIL	CASADO	18.0	9.9	26.0	4.5	12.1	20.7	20.1	13.4	11.1	.0	18.8	21.4
		SOLTERO	52.1	69.9	43.1	78.1	69.7	46.6	50.0	53.8	58.3	66.7	75.0	47.6
		DIVORCIADO	5.4	3.5	8.5	2.3	.0	1.7	5.2	4.6	5.6	.0	.0	7.1
SEPARADO		7.3	6.1	9.6	4.8	9.1	3.4	5.9	8.1	8.3	.0	.0	9.5	
VIUDO		1.3	.0	2.7	.3	6.1	.0	.6	1.4	.0	.0	.0	.0	
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	15.9	10.7	10.1	10.0	3.0	27.6	18.2	18.7	16.7	33.3	6.3	14.3	
	ESTUDIANTE	3.2	8.5	2.9	9.7	15.2	8.6	3.1	1.3	5.7	33.3	12.5	2.4	
	DESEMPLEADO	43.2	36.7	35.3	39.2	45.5	39.7	41.0	52.9	31.4	.0	18.8	52.4	
	DESOCUPADO	13.7	15.2	14.1	17.2	9.1	17.2	13.5	12.7	17.1	33.3	43.8	11.9	
	TRABAJO FIJO	19.8	15.7	22.2	15.9	21.2	22.4	24.6	14.0	8.6	33.3	6.3	19.0	
	TRABAJO OCASIONAL	18.0	22.7	22.1	16.8	9.1	8.6	16.2	17.3	37.1	.0	6.3	9.5	
	AMA DE CASA	1.6	.9	2.0	1.0	.0	1.7	1.3	1.7	.0	.0	12.5	2.4	
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.5	.3	1.5	.3	.0	1.7	.3	.2	.0	.0	.0	2.4	
	VOLUNTARIO	59.6	51.6	52.0	47.1	54.5	56.9	54.8	73.8	44.4	33.3	31.3	66.7	
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	37.1	43.8	43.3	46.5	33.3	39.7	41.7	24.8	50.0	33.3	56.3	31.0	
	POR INDICACION LEGAL	1.4	3.8	2.3	3.2	6.1	.0	1.2	.3	.0	33.3	.0	.0	
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.4	.0	3.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	1.8	.9	2.0	3.2	3.0	3.4	2.1	1.1	5.6	.0	12.5	2.4		

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 CHIHUAHUA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=6996	n=345	n=1463	n=310	n=33	n=58	n=2520	n=2170	n=36	n=3	n=16	n=42
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	90.9	95.0	84.3	92.2	97.0	87.9	88.1	97.8	91.4	66.7	81.3	95.2
	2 - 3 VECES POR SEMANA	3.7	2.6	5.5	4.2	3.0	8.6	4.9	1.0	.0	33.3	.0	2.4
	1 VEZ POR SEMANA	4.4	2.1	8.8	2.6	.0	3.4	5.5	.9	5.7	.0	18.8	.0
	1 A 3 VECES POR MES	.9	.3	1.2	.6	.0	.0	1.4	.2	2.9	.0	.0	2.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	.0	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	6.5	7.2	4.4	9.0	3.0	8.6	4.6	9.5	5.6	33.3	12.5	11.9
	10-14 AÑOS	46.7	51.6	33.8	53.2	42.4	46.6	48.5	51.6	58.3	33.3	43.8	52.4
	15-19 AÑOS	37.7	33.6	45.1	34.8	48.5	36.2	38.4	32.9	33.3	.0	37.5	31.0
	20-24 AÑOS	5.7	5.2	10.4	2.3	6.1	1.7	5.8	3.4	.0	.0	6.3	2.4
	25-29 AÑOS	1.7	.9	3.2	.6	.0	1.7	1.5	1.1	.0	33.3	.0	2.4
	30-34 AÑOS	.9	1.2	1.4	.0	.0	3.4	.7	.8	2.8	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.8	.3	1.8	.0	.0	1.7	.6	.6	.0	.0	.0	.0
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	25.2	17.1	63.0	8.4	27.3	19.0	19.5	10.5	30.6	.0	12.5
MARIGUANA	25.5	54.5	6.8	18.7	3.0	25.9	26.7	33.5	13.9	33.3	33.3	12.5	35.7
INHALABLES	8.2	5.2	2.4	39.0	9.1	6.9	5.9	10.6	8.3	.0	.0	37.5	14.3
ALUCINOGENOS	.1	.3	.1	.0	.0	1.7	.1	.1	.0	.0	.0	.0	2.4
HEROINA	1.4	.0	.1	.0	.0	.0	.2	4.0	.0	.0	.0	.0	.0
OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
COCAINA	4.4	2.0	1.3	1.0	.0	5.2	8.1	3.0	11.1	.0	.0	.0	4.8
TRANQUILIZANTES	1.2	.3	.2	.3	.0	17.2	.8	2.1	.0	.0	.0	.0	.0
BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	12.5	.0
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TABACO	32.0	19.7	25.7	31.9	60.6	22.4	35.1	35.3	8.3	33.3	33.3	12.5	21.4
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0
OTROS	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	4.8
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRISTAL	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0
ROHYPNOL	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	33.3	.0	.0
CRACK	1.4	.9	.1	.3	.0	1.7	3.4	.2	2.8	.0	.0	.0	.0
REFRACTIL OFTEN	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
CHIHUAHUA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=6866	n=1784	n=574	n=1765	n=406	n=95	n=2242
SEXO	MASCULINO	92.2	95.6	91.8	91.3	92.4	92.6	90.3
	FEMENINO	7.8	4.4	8.2	8.7	7.6	7.4	9.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	.7	4.4	.8	.7	.0	1.6
	15-19 AÑOS	12.0	15.4	18.8	6.6	11.8	3.2	12.1
	20-24 AÑOS	16.5	20.9	13.4	10.3	26.6	16.8	16.8
	25-29 AÑOS	18.4	20.0	18.3	13.7	22.4	16.8	20.2
	30-34 AÑOS	16.9	17.6	17.9	14.7	17.7	26.3	17.4
	35 AÑOS O MAS	34.9	25.4	27.2	53.8	20.7	36.8	32.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.3	3.9	5.4	5.2	3.7	7.4	3.6
	PRIMARIA	46.3	43.7	55.9	43.8	37.7	48.4	49.2
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.0	.9	1.2	1.4	.2	1.1	.9
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	32.9	36.7	30.1	30.5	35.2	33.7	32.1
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.9	.8	.5	1.4	1.5	1.1	.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	11.9	12.3	6.4	12.7	19.2	6.3	11.4
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	2.4	1.6	.3	4.8	2.0	2.1	1.8
	POSGRADO	.2	.2	.0	.2	.5	.0	.2
	SOLTERO	52.1	58.4	61.0	42.2	51.0	61.1	52.5
	CASADO	18.1	13.7	11.1	26.2	21.4	11.6	16.8
	DIVORCIADO	5.5	4.0	4.4	8.1	3.9	7.4	5.1
	SEPARADO	7.3	6.1	5.6	8.3	5.2	7.4	8.3
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.3	.8	.7	2.0	.5	2.1	1.3
	UNION LIBRE	15.7	17.0	17.2	13.3	18.0	10.5	16.0
	9 AÑOS O MENOS	6.6	5.8	11.0	3.7	1.7	.0	9.5
	10-14 AÑOS	46.8	53.8	65.3	32.7	21.2	14.7	53.4
	15-19 AÑOS	37.6	36.2	21.6	48.6	40.9	32.6	33.9
	20-24 AÑOS	5.8	3.3	1.6	9.8	19.5	21.1	2.5
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	1.6	.4	.2	2.8	8.6	10.5	.4
	30-34 AÑOS	.9	.3	.2	1.0	4.9	11.6	.2
	35 AÑOS Y MAS	.8	.1	.2	1.4	3.2	9.5	.1
	DIARIO	89.3	92.2	88.5	77.0	82.4	96.8	97.6
	2 - 3 VECES POR SEMANA	3.5	3.0	3.8	7.0	4.5	.0	.9
	1 VEZ POR SEMANA	5.5	2.9	5.6	13.4	9.9	2.1	.8
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	1.5	1.3	1.7	2.4	3.0	1.1	.6
	1 A 11 VECES AL AÑO	.2	.5	.3	.2	.2	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
CHIHUAHUA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
CHIHUAHUA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=421	n=118	n=21	n=51	n=61	n=1	n=40	
SEXO	MASCULINO	95.5	95.8	85.7	98.0	95.1	100.0	97.5	
	FEMENINO	4.5	4.2	14.3	2.0	4.9	.0	2.5	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	14.1	9.3	28.6	13.7	9.8	.0	15.0	
	15 - 18 AÑOS	85.9	90.7	71.4	86.3	90.2	100.0	85.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	36.8	38.1	61.9	35.3	31.1	.0	40.0	
	SECUNDARIA	46.6	51.7	33.3	45.1	50.8	.0	35.0	
	PREPA	15.0	8.5	.0	19.6	13.1	.0	25.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	1.7	1.7	4.8	.0	4.9	100.0	.0	
	ESTUDIANTE	28.2	16.1	19.0	27.5	18.3	100.0	27.5	
	EMPLEADO	35.3	25.4	33.3	33.3	23.3	.0	35.0	
	SUBEMPLEADO	12.4	22.0	9.5	13.7	25.0	.0	7.5	
USA TATUAJES	HOGAR	1.0	.0	4.8	5.9	.0	.0	2.5	
	NINGUNA	23.2	36.4	33.3	19.6	33.3	.0	27.5	
USA TATUAJES	SI	16.2	35.0	38.1	18.0	32.8	100.0	12.8	
	NO	83.8	65.0	61.9	82.0	67.2	.0	87.2	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	41.1	72.9	66.7	17.6	72.1	.0	22.5	
	NO	58.9	27.1	33.3	82.4	27.9	100.0	77.5	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	20.0	41.5	47.6	51.0	52.5	100.0	27.5	
	NO	80.0	58.5	52.4	49.0	47.5	.0	72.5	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	34.7	40.7	57.1	25.5	59.0	100.0	20.0	
	VIOLACION	5.2	4.2	.0	2.0	9.8	.0	2.5	
	HOMICIDIO	5.2	5.1	4.8	3.9	6.6	.0	2.5	
	LESIONES A TERCEROS	10.7	3.4	9.5	3.9	1.6	.0	12.5	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	25.4	16.1	23.8	56.9	13.1	.0	40.0	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	6.7	16.1	4.8	3.9	14.8	.0	10.0	
	CONSUMO DE DROGAS	6.9	20.3	.0	3.9	14.8	.0	5.0	
	PORTACION DE ARMA	2.9	3.4	.0	2.0	4.9	.0	2.5	
	OTROS	9.0	5.1	4.8	3.9	.0	.0	5.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	84.8	84.7	85.7	78.4	86.9	100.0	90.0
		HOGAR	9.0	10.2	14.3	13.7	9.8	.0	5.0
		TRABAJO	.7	.8	.0	2.0	.0	.0	.0
ESCUELA		1.0	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTRO	3.8	1.7	.0	5.9	3.3	.0	5.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
CHIHUAHUA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIJUANA	OPIOIDES	
		n=282	n=133	n=24	n=39	n=17	n=7	
SEXO	MASCULINO	89.7	88.0	66.7	97.4	82.4	94.6	
	FEMENINO	10.3	12.0	33.3	2.6	17.6	5.4	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.4	.8	.0	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	9.2	11.3	12.5	5.1	17.6	6.5	
	20 - 24 AÑOS	11.3	12.0	12.5	25.6	5.9	7.5	
	25 - 29 AÑOS	11.3	10.5	12.5	10.3	17.6	14.0	
	30 - 34 AÑOS	14.9	15.8	4.2	30.8	17.6	15.1	
	35 - 39 AÑOS	21.3	16.5	16.7	17.9	5.9	31.2	
	40 AÑOS O MÁS	31.6	33.1	41.7	10.3	35.3	25.8	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	10.0	12.8	25.0	.0	18.8	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	15.4	22.6	12.5	18.9	18.8	2.2	
	CAIDA	3.9	6.0	8.3	2.7	.0	1.1	
	ELECTROCUTADO	.4	.0	.0	.0	.0	1.1	
	QUEMADO	1.1	1.5	4.2	.0	.0	.0	
	GOLPES	2.5	3.0	4.2	5.4	12.5	1.1	
	ASFIXIA	10.0	13.5	4.2	24.3	6.3	4.3	
	APLASTAMIENTO	.4	.0	4.2	.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	13.9	16.5	20.8	18.9	31.3	9.8	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	5.7	9.0	.0	5.4	6.3	2.2	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	28.9	6.8	4.2	24.3	.0	69.6	
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTRAS	7.9	8.3	12.5	.0	6.3	8.7	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	9.0	14.5	13.0	.0	17.6	1.1
		CASA	29.4	22.1	21.7	35.9	47.1	37.6
CALLE		41.2	45.8	52.2	43.6	35.3	33.3	
BAÑOS PUBLICOS		.7	1.5	.0	.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		1.8	3.1	.0	2.6	.0	.0	
TRABAJO		1.1	.8	.0	5.1	.0	.0	
ARES DE SERVICIO		15.1	9.9	.0	12.8	.0	28.0	
OTROS	1.8	2.3	13.0	.0	.0	.0		

N=910 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
CHIHUAHUA**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=23	n=1	n=0	n=4	n=0	n=1	n=1	n=0	n=1	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	26.7	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	26.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	26.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=194 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
CHIHUAHUA

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO n=73	ALCOHOL n=105	ANALGESICOS n=6	TRANQUILIZANTES n=7	ANTIDEPRESIVOS n=8	ANFETAMINAS n=10	MARIGUANA n=12	INHALABLES n=1	COCAINA n=9	HEROINA n=4	ALUCINOGENOS n=1
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.5	2.9	.0	.0	12.5	.0	8.3	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	1.4	1.0	.0	.0	.0	.0	8.3	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	12.3	6.7	16.7	.0	12.5	30.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	1.4	1.0	.0	.0	12.5	10.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	1.4	7.6	.0	.0	.0	.0	8.3	.0	11.1	25.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	6.8	4.8	.0	14.3	25.0	.0	8.3	.0	11.1	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	5.5	3.8	.0	.0	25.0	30.0	8.3	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	4.1	4.8	.0	28.6	.0	.0	16.7	.0	11.1	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	4.1	4.8	.0	.0	.0	.0	8.3	100.0	22.2	25.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.4	1.0	.0	.0	.0	.0	8.3	.0	11.1	.0	.0
DIABETES MELLITUS	2.7	5.7	16.7	14.3	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	2.7	1.0	.0	14.3	12.5	10.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	16.4	18.1	.0	.0	.0	20.0	.0	.0	11.1	.0	.0
NINGUNA	4.1	4.8	.0	14.3	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=194

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1276	n=810	n=281	n=99	n=16	n=60	n=0	n=0	n=0	n=5	n=4	n=0
SEXO	MASCULINO	81,6	80,3	80,8	93,9	68,8	88,3	,0	,0	,0	60,0	75,0	,0
	FEMENINO	18,4	19,7	19,2	6,1	31,3	11,7	,0	,0	,0	40,0	25,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,6	4,7	6,4	1,0	,0	21,7	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	15-19	17,3	17,2	16,7	19,4	25,0	18,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	16,2	15,3	18,1	19,4	25,0	13,3	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	25-29	16,0	15,9	18,5	15,3	18,8	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	14,4	14,1	12,1	19,4	18,8	15,0	,0	,0	,0	40,0	50,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	30,5	32,8	28,1	25,5	12,5	23,3	,0	,0	,0	20,0	50,0	,0
	SOLTERO	43,4	42,3	43,4	43,4	37,5	58,3	,0	,0	,0	60,0	25,0	,0
	CASADO	18,9	19,8	19,6	17,2	6,3	5,0	,0	,0	,0	40,0	75,0	,0
	U. LIBRE	18,0	18,9	14,2	18,2	37,5	21,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,2	10,7	13,5	11,1	12,5	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,5	3,3	4,3	5,1	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	VIUDO	1,0	1,2	,7	,0	,0	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,9	3,7	4,3	5,1	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,9	,8	1,1	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,4	,4	,4	,0	,0	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	24,9	26,0	19,4	22,2	43,8	32,8	,0	,0	,0	40,0	50,0	,0
	SECUNDARIA	41,6	40,3	41,4	50,5	18,8	51,7	,0	,0	,0	60,0	25,0	,0
OCUPACION	TECNICO O COMERCIAL	4,3	4,4	4,7	4,0	,0	3,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	20,5	21,2	22,3	17,2	25,0	10,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	7,1	6,9	9,7	4,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0
	POSGRADO	,3	,1	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,3	9,5	17,1	5,4	7,7	18,2	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,7	2,7	3,5	1,1	7,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	LABORAL ESTABLE	36,9	37,5	38,1	38,7	30,8	23,6	,0	,0	,0	20,0	33,3	,0
	LABORAL INESTABLE	20,6	22,1	14,8	24,7	30,8	20,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0
	DESEMPLEADO	8,3	8,2	9,3	7,5	15,4	5,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	14,5	13,6	12,1	18,3	7,7	30,9	,0	,0	,0	20,0	33,3	,0
	HOGAR	5,3	5,9	4,7	4,3	,0	1,8	,0	,0	,0	40,0	,0	,0
	PENSIONADO	,4	,5	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,3	,1	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	5,7	5,5	8,1	2,4	7,1	,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0
	MEDIO BAJO	60,4	61,7	63,7	47,1	42,9	51,9	,0	,0	,0	80,0	50,0	,0
	BAJO	32,3	31,0	26,3	50,6	50,0	46,3	,0	,0	,0	20,0	25,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,3	1,6	,8	,0	,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1276	n=169	n=237	n=136	n=348	n=76	n=14	n=1	n=1	n=24	n=255	n=2
SEXO	MASCULINO	81,8	67,5	76,4	92,6	83,9	80,3	78,6	100,0	,0	66,7	90,2	50,0
	FEMENINO	18,2	32,5	23,6	7,4	16,1	19,7	21,4	,0	100,0	33,3	9,8	50,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,4	5,9	3,4	10,3	1,2	38,2	,0	,0	,0	12,5	,0	,0
	15-19	17,0	13,0	13,9	39,7	16,1	42,1	21,4	100,0	,0	8,3	4,3	50,0
	20-24	16,2	12,4	14,3	22,1	21,9	7,9	35,7	,0	100,0	4,2	12,2	,0
	25-29	16,2	10,1	17,3	11,0	20,2	5,3	7,1	,0	,0	12,5	20,8	,0
	30-34	14,4	11,8	19,0	5,9	16,1	,0	14,3	,0	,0	4,2	19,6	,0
	35 Y MAS	30,7	46,7	32,1	11,0	24,5	6,6	21,4	,0	,0	58,3	43,1	50,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	43,2	31,4	35,4	72,1	38,2	81,6	50,0	100,0	,0	54,2	36,9	50,0
	CASADO	19,1	34,9	23,2	8,1	24,4	1,3	,0	,0	,0	33,3	8,2	50,0
	U. LIBRE	18,1	10,1	19,0	10,3	20,4	6,6	28,6	,0	,0	4,2	27,8	,0
	SEPARADO	11,2	7,7	11,8	4,4	11,5	1,3	,0	,0	100,0	,0	20,4	,0
	DIVORCIADO	3,6	10,1	4,2	,0	1,7	,0	21,4	,0	,0	8,3	2,7	,0
	VIUDO	1,0	1,8	1,3	,0	,9	,0	,0	,0	,0	,0	1,6	,0
	NO ESPECIFICA	3,9	4,1	5,1	5,1	2,9	9,2	,0	,0	,0	,0	2,4	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,9	1,2	,0	,7	1,5	1,4	,0	,0	,0	,0	,8	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,4	,0	,9	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,8	,0
	PRIMARIA	24,7	16,7	21,6	17,0	23,7	18,9	7,1	,0	,0	29,2	41,1	,0
	SECUNDARIA	41,5	36,3	36,8	47,4	42,1	68,9	35,7	,0	,0	29,2	39,1	50,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,3	7,1	5,2	,0	5,8	1,4	,0	,0	,0	12,5	2,4	,0
	BACHILLERATO	20,6	25,0	23,4	30,4	21,1	9,5	35,7	100,0	100,0	8,3	12,6	,0
	LICENCIATURA	7,1	13,7	10,8	3,7	5,6	,0	21,4	,0	,0	20,8	3,2	50,0
	POSGRADO	,3	,0	1,3	,0	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	11,2	10,0	10,6	30,2	5,6	46,3	15,4	,0	,0	4,5	,0	50,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,6	2,7	4,1	2,4	4,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	37,1	50,0	46,8	24,6	39,8	7,5	38,5	,0	100,0	40,9	30,9	,0
	LABORAL INESTABLE	20,7	7,3	19,7	17,5	22,9	16,4	15,4	100,0	,0	9,1	31,8	,0
	DESEMPLEADO	8,3	8,7	4,6	10,3	8,8	4,5	7,7	,0	,0	9,1	11,2	,0
	DESOCUPADO	14,3	10,7	6,4	12,7	14,1	23,9	23,1	,0	,0	13,6	22,3	,0
	HOGAR	5,3	10,0	6,4	1,6	4,4	1,5	,0	,0	,0	22,7	3,9	50,0
	PENSIONADO	,4	,7	1,4	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,3	,0	1,4	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	5,7	9,9	4,5	2,4	8,9	,0	14,3	,0	,0	12,5	2,9	,0
	MEDIO BAJO	60,5	61,8	62,6	61,9	69,2	52,8	57,1	100,0	100,0	58,3	47,7	100,0
	BAJO	32,2	28,2	30,2	34,1	21,6	45,8	21,4	,0	,0	29,2	46,5	,0
	POBREZA EXTREMA	1,2	,0	1,4	,8	,3	1,4	7,1	,0	,0	,0	2,9	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	63,6	77,5	57,4	58,5	62,9	55,3	50,0	100,0	100,0	62,5	66,7	100,0
	ALCOHOL	21,9	17,2	36,3	25,2	22,4	17,1	14,3	,0	,0	16,7	12,2	,0
	MARIJUANA	7,8	3,6	3,4	14,1	8,6	5,3	14,3	,0	,0	8,3	11,0	,0
	COCAÍNA	1,2	,0	,8	,0	2,0	,0	14,3	,0	,0	,0	1,6	,0
	INHALABLES	4,7	1,2	1,7	2,2	3,7	22,4	7,1	,0	,0	,0	7,5	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,4	,6	,4	,0	,3	,0	,0	,0	,0	8,3	,0	,0
	OPIACEOS	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	4,2	1,2	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



DISTRITO FEDERAL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
DISTRITO FEDERAL

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1884	n=192	n=499	n=210	n=11	n=34	n=889	n=4	n=10	n=12	n=19	n=4
SEXO	MASCULINO	82.4	85.9	81.4	71.0	90.9	64.7	85.6	75.0	70.0	100.0	68.4	100.0
	FEMENINO	17.6	14.1	18.6	29.0	9.1	35.3	14.4	25.0	30.0	.0	31.6	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	5.4	5.2	2.2	30.0	27.3	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	20.5	44.3	13.2	47.1	18.2	11.8	13.4	25.0	40.0	16.7	15.8	25.0
	20-24 AÑOS	18.8	28.6	10.4	10.0	.0	5.9	24.3	.0	30.0	25.0	5.3	50.0
	25-29 AÑOS	16.1	6.3	12.0	5.7	27.3	20.6	22.6	25.0	10.0	16.7	21.1	.0
	30-34 AÑOS	11.6	5.2	10.0	2.9	.0	11.8	15.4	.0	10.0	33.3	26.3	25.0
	35 AÑOS O MAS	27.6	10.4	52.1	4.3	27.3	50.0	22.6	50.0	10.0	8.3	31.6	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	.7	.0	.8	2.4	9.1	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	13.0	4.7	12.5	26.7	9.1	20.6	12.0	25.0	.0	16.7	.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.0	1.0	.5	.0	2.9	.3	.0	.0	.0	5.3	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	41.0	41.9	26.6	56.7	72.7	20.6	45.7	.0	60.0	58.3	26.3	25.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.4	2.1	3.4	.0	.0	14.7	2.1	.0	.0	.0	5.3	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.8	36.6	19.7	13.3	9.1	17.6	28.0	75.0	10.0	16.7	31.6	75.0
	LICENCIATURA	15.8	14.7	31.6	.5	.0	23.5	10.7	.0	30.0	8.3	21.1	.0
	POSGRADO	1.7	.0	4.4	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	10.5	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	23.2	3.7	37.3	2.9	9.1	47.1	24.1	25.0	.0	16.7	21.1	.0
	SOLTERO	56.2	88.4	41.3	83.8	72.7	23.5	51.8	25.0	100.0	66.7	47.4	75.0
	DIVORCIADO	3.6	1.1	5.0	.5	.0	8.8	4.1	.0	.0	.0	5.3	.0
	SEPARADO	4.6	1.6	6.2	4.3	9.1	.0	4.6	.0	.0	.0	10.5	.0
	VIUDO	.5	.0	1.4	.0	.0	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	11.8	5.3	8.8	8.6	9.1	14.7	15.4	50.0	.0	16.7	15.8	25.0
	ESTUDIANTE	15.7	37.9	11.6	38.0	27.3	5.9	8.3	25.0	20.0	9.1	5.3	25.0
	DESEMPLEADO	15.6	17.4	12.0	16.3	9.1	8.8	16.7	25.0	50.0	27.3	21.1	25.0
	DESOCUPADO	10.8	8.9	7.6	19.2	27.3	.0	11.5	.0	.0	9.1	5.3	.0
	TRABAJO FIJO	35.4	17.4	44.4	8.7	18.2	41.2	40.2	50.0	10.0	36.4	57.9	50.0
	TRABAJO OCASIONAL	18.8	17.9	17.1	16.3	9.1	26.5	20.7	.0	20.0	18.2	10.5	.0
	AMA DE CASA	2.6	.5	3.2	1.4	.0	17.6	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
	JUBILADO	1.2	.0	4.0	.0	9.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	62.3	58.9	65.3	31.0	63.6	85.3	67.9	100.0	40.0	75.0	52.6	75.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	33.2	37.0	30.5	60.0	36.4	11.8	28.5	.0	40.0	25.0	47.4	.0
	POR INDICACION LEGAL	.7	1.0	.4	.0	.0	.0	.9	.0	20.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.7	.0	.6	1.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	3.0	3.1	3.2	8.1	.0	2.9	1.7	.0	.0	.0	.0	25.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
DISTRITO FEDERAL**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.LEGALES ***
		n=1884	n=192	n=499	n=210	n=11	n=34	n=889	n=4	n=10	n=12	n=19	n=4
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	61.5	71.4	57.1	59.5	100.0	73.5	61.2	50.0	50.0	41.7	94.7	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	21.1	13.0	19.4	21.9	.0	20.6	23.6	25.0	40.0	50.0	5.3	25.0
	1 VEZ POR SEMANA	12.2	7.3	15.8	9.0	.0	2.9	12.8	25.0	10.0	.0	.0	25.0
	1 A 3 VECES POR MES	4.2	6.3	7.2	6.2	.0	2.9	1.9	.0	.0	8.3	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.9	2.1	.4	3.3	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	5.3	10.4	3.4	9.5	9.1	.0	4.7	.0	.0	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	42.9	45.3	35.1	64.3	63.6	52.9	40.9	100.0	70.0	16.7	31.6	100.0
	15-19 AÑOS	40.6	40.6	45.5	24.8	27.3	23.5	42.9	.0	30.0	66.7	21.1	.0
	20-24 AÑOS	7.9	3.6	10.2	1.4	.0	17.6	8.5	.0	.0	16.7	21.1	.0
	25-29 AÑOS	2.2	.0	4.4	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	.0	10.5	.0
	30-34 AÑOS	.7	.0	1.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	10.5	.0
	35 AÑOS Y MAS	.3	.0	.4	.0	.0	5.9	.1	.0	.0	.0	5.3	.0
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	57.4	50.5	84.8	32.4	9.1	50.0	50.8	50.0	50.0	66.7	36.8
	MARIGUANA	9.6	21.9	1.8	6.7	.0	8.8	12.3	50.0	10.0	.0	5.3	.0
	INHALABLES	8.9	5.7	1.0	40.0	.0	26.5	6.1	.0	10.0	16.7	5.3	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	31.6	.0
	COCAINA	2.0	1.0	.4	.0	.0	.0	3.7	.0	.0	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.4	.0	.0	.0	.0	8.8	.3	.0	10.0	.0	5.3	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	5.3	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	17.8	19.3	11.6	19.5	90.9	5.9	20.6	.0	10.0	8.3	5.3	50.0
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	5.3	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	8.3	.0	.0
	CRACK	3.0	.5	.4	1.4	.0	.0	5.6	.0	.0	.0	.0	.0
	REFRACTIL OFTENOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
DISTRITO FEDERAL

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1861	n=181	n=167	n=1082	n=94	n=1	n=336
SEXO	MASCULINO	82.8	87.3	77.2	82.8	80.9	100.0	83.3
	FEMENINO	17.2	12.7	22.8	17.2	19.1	.0	16.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	5.5	1.7	19.8	3.6	4.3	.0	6.8
	15-19 AÑOS	20.7	26.5	35.3	16.5	17.0	.0	24.7
	20-24 AÑOS	18.9	29.3	16.2	18.1	27.7	100.0	14.6
	25-29 AÑOS	16.0	12.7	18.0	14.9	23.4	.0	18.5
	30-34 AÑOS	11.4	14.4	4.2	11.6	9.6	.0	13.1
	35 AÑOS O MAS	27.5	15.5	6.6	35.2	18.1	.0	22.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	.6	.0	3.0	.5	.0	.0	.3
	PRIMARIA	13.1	15.0	34.1	10.2	8.6	.0	12.2
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.0	1.8	.6	1.1	.0	.3
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	41.3	45.6	47.9	35.5	50.5	100.0	51.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.4	2.2	.0	2.9	5.4	.0	1.5
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.6	29.4	13.2	25.4	23.7	.0	25.4
	LICENCIATURA	15.8	7.2	.0	22.6	10.8	.0	8.1
ESTADO CIVIL	POSGRADO	1.6	.6	.0	2.4	.0	.0	.6
	SOLTERO	56.5	66.9	67.7	53.6	59.6	100.0	53.6
	CASADO	23.1	12.4	9.0	27.0	17.0	.0	24.9
	DIVORCIADO	3.6	1.1	.6	4.3	6.4	.0	3.6
	SEPARADO	4.6	3.9	4.2	4.9	3.2	.0	4.8
	VIUDO	.5	.0	.0	.6	.0	.0	.6
	UNION LIBRE	11.7	15.7	18.6	9.5	13.8	.0	12.6
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	5.4	3.3	11.4	5.2	.0	.0	5.7
	10-14 AÑOS	43.1	39.2	58.1	39.4	30.9	100.0	53.3
	15-19 AÑOS	40.7	45.9	24.0	45.0	36.2	.0	33.9
	20-24 AÑOS	7.8	11.6	6.6	7.4	16.0	.0	5.4
	25-29 AÑOS	2.1	.0	.0	2.4	10.6	.0	1.2
	30-34 AÑOS	.6	.0	.0	.5	5.3	.0	.6
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.2	.0	.0	.2	1.1	.0	.0
	DIARIO	43.5	51.4	49.1	33.5	48.9	100.0	66.7
	2 - 3 VECES POR SEMANA	19.9	21.5	28.7	19.6	20.2	.0	15.5
	1 VEZ POR SEMANA	21.7	11.0	13.2	28.1	17.0	.0	12.2
	1 A 3 VECES POR MES	12.1	10.5	6.6	15.6	7.4	.0	5.7
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.9	5.5	2.4	3.1	6.4	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
DISTRITO FEDERAL



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
DISTRITO FEDERAL

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=1036	n=110	n=196	n=201	n=74	n=1	n=231	
SEXO	MASCULINO	95.9	98.2	98.5	96.0	94.6	100.0	97.4	
	FEMENINO	4.1	1.8	1.5	4.0	5.4	.0	2.6	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	9.6	8.3	10.7	5.5	4.1	.0	6.6	
	15 - 18 AÑOS	90.4	91.7	89.3	94.5	95.9	100.0	93.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	24.8	38.0	40.4	25.8	50.0	.0	29.4	
	SECUNDARIA	58.3	54.6	48.2	56.1	34.7	100.0	55.0	
	PREPA	14.4	2.8	3.6	17.2	1.4	.0	14.3	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.5	4.6	7.8	1.0	13.9	.0	1.3	
	ESTUDIANTE	33.9	17.3	12.8	26.9	12.2	.0	23.8	
	EMPLEADO	14.3	19.1	14.8	12.4	9.5	.0	10.0	
	SUBEMPLEADO	40.8	50.0	60.2	48.8	63.5	100.0	53.2	
HOGAR	HOGAR	1.4	.9	.0	1.5	1.4	.0	.9	
	NINGUNA	9.7	12.7	12.2	10.4	13.5	.0	12.1	
USA TATUAJES	SI	17.4	32.7	24.5	21.9	27.0	.0	23.4	
	NO	82.6	67.3	75.5	78.1	73.0	100.0	76.6	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	2.8	10.0	5.1	2.0	8.1	.0	2.6	
	NO	97.2	90.0	94.9	98.0	91.9	100.0	97.4	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	11.7	25.5	37.2	27.9	37.8	100.0	15.2	
	NO	88.3	74.5	62.8	72.1	62.2	.0	84.8	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	89.5	80.9	91.8	89.6	79.7	.0	89.2	
	VIOLACION	2.1	.9	.5	1.5	.0	.0	1.3	
	HOMICIDIO	1.2	2.7	.5	1.5	.0	.0	1.7	
	LESIONES A TERCEROS	1.8	.0	.5	1.5	.0	.0	.4	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.4	.9	.5	1.0	.0	.0	.9	
	SECUESTRO	.4	.0	.0	.5	.0	.0	.4	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.3	12.7	4.1	4.0	17.6	100.0	4.8	
	CONSUMO DE DROGAS	.3	.9	1.0	.5	1.4	.0	.9	
	PORTACION DE ARMA	5.2	6.4	7.7	3.5	12.2	.0	3.5	
	OTROS	1.2	1.8	1.0	1.0	2.7	.0	1.7	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	89.4	90.0	90.3	83.1	93.2	100.0	84.8
		HOGAR	4.3	6.4	6.6	5.5	5.4	.0	6.5
		TRABAJO	1.4	.9	1.0	2.5	.0	.0	1.7
		ESCUELA	1.3	.0	.5	1.5	.0	.0	2.6
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.2%	.9%	1.0%	2.5%	.0%	.0%	1.3%	
OTRO	2.5%	1.8%	.5%	5.0%	1.4%	.0%	3.0%		



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
DISTRITO FEDERAL

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=5887	n=3285	n=1774	n=287	n=88	n=405	n=7	n=3	n=3	n=14	n=1	n=5
SEXO	MASCULINO	74,1	70,8	76,8	88,2	87,4	77,8	28,6	33,3	100,0	71,4	,0	60,0
	FEMENINO	25,9	29,2	23,2	11,8	12,6	22,2	71,4	66,7	,0	28,6	100,0	40,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	10,4	6,9	11,6	6,4	4,5	37,8	28,6	,0	,0	7,1	,0	,0
	15-19	26,7	22,9	30,3	29,3	18,2	41,7	14,3	66,7	,0	7,1	100,0	20,0
	20-24	15,5	16,2	15,1	22,6	27,3	4,9	14,3	33,3	33,3	7,1	,0	,0
	25-29	11,4	11,3	12,2	13,8	20,5	5,2	,0	,0	33,3	14,3	,0	,0
	30-34	9,3	10,0	9,4	7,4	15,9	3,2	,0	,0	,0	28,6	,0	,0
	35 Y MAS	26,7	32,7	21,4	20,5	13,6	7,2	42,9	,0	33,3	35,7	,0	80,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	56,3	50,6	61,0	59,6	51,1	81,5	57,1	100,0	66,7	42,9	100,0	20,0
	CASADO	17,8	21,9	13,4	13,9	19,3	5,2	,0	,0	,0	28,6	,0	60,0
	U. LIBRE	11,0	11,4	11,3	12,9	17,0	4,7	14,3	,0	,0	7,1	,0	,0
	SEPARADO	6,8	7,4	7,0	5,6	4,5	2,0	28,6	,0	,0	14,3	,0	,0
	DIVORCIADO	2,0	2,2	1,7	1,7	1,1	,7	,0	,0	33,3	7,1	,0	,0
	VIUDO	1,3	1,7	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	20,0
	NO ESPECIFICA	4,9	4,7	4,6	6,3	6,8	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,3	,2	,4	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	,3	,3	,7	1,2	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	9,4	10,4	7,5	9,5	9,4	10,3	,0	,0	,0	,0	,0	20,0
	SECUNDARIA	44,2	41,0	44,6	40,3	45,9	71,5	42,9	,0	,0	46,2	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,1	6,1	4,3	2,8	4,7	2,5	,0	,0	,0	7,7	,0	40,0
	BACHILLERATO	28,6	28,4	31,0	33,9	28,2	13,8	28,6	100,0	66,7	46,2	100,0	40,0
	LICENCIATURA	11,5	12,9	11,4	12,0	9,4	1,0	14,3	,0	33,3	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,6	,7	,5	,7	1,2	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	25,8	20,1	30,0	25,2	14,1	55,5	33,3	66,7	,0	15,4	100,0	25,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,6	4,5	5,4	3,7	5,1	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	31,3	35,1	27,6	32,9	37,2	14,1	33,3	,0	33,3	53,8	,0	25,0
	LABORAL INESTABLE	12,4	12,5	12,5	13,8	12,8	9,9	16,7	,0	,0	15,4	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,4	7,1	7,7	8,1	12,8	6,1	,0	33,3	66,7	7,7	,0	,0
	DESOCUPADO	10,8	9,8	12,0	15,0	14,1	9,7	16,7	,0	,0	7,7	,0	25,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	6,1	8,1	4,3	1,2	3,8	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	25,0
	PENSIONADO	1,8	2,8	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,3	,4	,2	,8	,0	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	11,3	12,7	10,7	11,3	6,4	3,7	50,0	,0	33,3	7,1	,0	25,0
	MEDIO BAJO	68,3	69,0	69,2	63,7	66,7	63,7	33,3	66,7	66,7	78,6	100,0	50,0
BAJO	19,2	17,2	19,5	22,7	24,4	30,9	16,7	33,3	,0	14,3	,0	25,0	
POBREZA EXTREMA	,8	,8	,4	1,6	2,6	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
DISTRITO FEDERAL

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=5887	n=3285	n=1774	n=287	n=88	n=405	n=7	n=3	n=3	n=14	n=1	n=5
SEXO	MASCULINO	74.0	50.2	70.6	87.3	89.3	76.2	72.4	47.4	84.2	66.7	62.5	60.0
	FEMENINO	26.0	49.8	29.4	12.7	10.7	23.8	27.6	52.6	15.8	33.3	37.5	40.0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	10.2	3.0	9.1	5.3	1.2	36.9	,0	10.5	,0	3.5	,0	10.0
	15-19	26.3	10.3	25.8	45.7	13.4	52.2	20.7	36.8	61.1	21.1	50.0	20.0
	20-24	15.9	7.3	16.9	23.4	25.4	6.1	13.8	26.3	38.9	14.0	12.5	20.0
	25-29	11.5	7.6	11.0	8.5	22.6	1.5	31.0	15.8	,0	10.5	25.0	20.0
	30-34	9.4	7.1	11.2	5.1	17.3	1.4	13.8	10.5	,0	10.5	,0	,0
	35 Y MAS	26.8	64.7	26.1	12.0	20.1	1.8	20.7	,0	,0	40.4	12.5	30.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	56.3	31.5	56.6	75.5	45.8	88.3	41.4	73.7	94.7	54.4	62.5	60.0
	CASADO	17.8	37.4	16.9	6.0	19.3	1.3	24.1	,0	,0	12.3	,0	30.0
	U. LIBRE	11.0	8.5	11.3	6.8	19.4	3.6	24.1	5.3	5.3	17.5	25.0	,0
	SEPARADO	6.8	8.7	7.3	3.9	9.7	1.4	6.9	10.5	,0	10.5	12.5	,0
	DIVORCIADO	2.0	4.5	1.8	,8	1.9	,2	,0	,0	,0	1.8	,0	,0
	VIUDO	1.3	4.8	,9	,2	,2	,0	,0	5.3	,0	3.5	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4.8	4.6	5.3	6.8	3.7	5.2	3.4	5.3	,0	,0	,0	10.0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,3	,2	,2	,2	,3	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	,6	,4	,5	,1	,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	9.5	12.2	7.5	5.9	10.3	8.4	24.1	5.3	,0	19.6	25.0	,0
	SECUNDARIA	43.7	28.7	38.5	36.7	42.9	73.7	27.6	36.8	21.1	32.1	25.0	40.0
	TECNICO O COMERCIAL	5.2	11.3	4.8	3.1	3.8	1.7	6.9	5.3	,0	3.6	,0	20.0
	BACHILLERATO	28.6	25.0	32.7	43.1	31.7	14.4	34.5	47.4	47.4	35.7	50.0	20.0
	LICENCIATURA	11.7	20.4	15.5	10.2	10.3	,9	6.9	5.3	31.6	8.9	,0	20.0
	POSGRADO	,6	1.5	,5	,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	25.3	11.4	28.1	38.1	7.0	58.0	8.0	33.3	56.3	16.0	16.7	11.1
	ESTUDIA Y TRABAJA	4.6	4.0	5.3	8.7	2.5	4.9	,0	6.7	12.5	6.0	,0	11.1
	LABORAL ESTABLE	31.5	45.4	32.6	20.7	40.1	8.0	36.0	26.7	,0	42.0	16.7	44.4
	LABORAL INESTABLE	12.2	7.7	11.1	12.1	19.7	8.1	24.0	,0	12.5	10.0	33.3	,0
	DESEMPLEADO	7.5	3.9	6.3	8.2	12.9	4.7	12.0	6.7	,0	8.0	16.7	,0
	DESOCUPADO	10.9	3.2	10.8	10.9	14.3	14.5	16.0	26.7	18.8	10.0	16.7	11.1
	HOGAR	6.2	16.9	5.1	1.2	3.3	1.8	4.0	,0	,0	8.0	,0	22.2
	PENSIONADO	1.8	7.5	,7	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,3	,6	,1	,3	,3	,3	,0	,0	,0	,0	,0	11.1
	MEDIO ALTO	11.4	22.7	9.3	11.5	9.4	3.9	10.7	17.6	15.8	11.5	,0	11.1
	MEDIO BAJO	68.4	66.0	69.9	73.4	67.8	67.5	71.4	70.6	78.9	59.6	62.5	66.7
	BAJO	19.2	10.6	20.3	13.7	21.8	27.1	14.3	11.8	5.3	26.9	25.0	11.1
	POBREZA EXTREMA	,7	,2	,4	1.0	,7	1.1	3.6	,0	,0	1.9	12.5	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	56.3	82.5	47.6	46.2	57.8	40.6	44.8	31.6	42.1	35.1	62.5	30.0
	ALCOHOL	29.9	15.2	48.2	31.9	28.7	28.2	44.8	47.4	52.6	36.8	25.0	40.0
	MARIJUANA	4.9	1.4	1.8	18.8	5.0	3.0	3.4	,0	5.3	14.0	,0	10.0
	COCAÍNA	1.5	,0	,3	,9	4.7	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	6.8	,8	2.1	1.9	3.0	27.5	,0	,0	,0	5.3	,0	,0
	ESTIMULANTES	,1	,1	,0	,0	,1	,1	6.9	10.5	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,1	,0	,0	,0	,0	,1	,0	10.5	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,1	,0	,0	,0	,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,2	,0	,0	,2	,5	,1	,0	,0	,0	7.0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	12.5	,0
	OTRAS	,1	,0	,0	,2	,1	,0	,0	,0	,0	1.8	,0	20.0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



DURANGO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
DURANGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL n=2306	MARIGUANA n=197	ALCOHOL n=620	INHALABLES n=79	TABACO n=61	TRANQUILIZANTES n=42	COCAINA* n=370	HEROINA n=41	CRISTAL n=873	ROHYPNOL n=4	D.MEDICAS ** n=13	D.ILEGALES *** n=6
SEXO	MASCULINO	92.7	95.4	93.9	98.7	63.9	78.6	96.2	92.7	92.1	100.0	76.9	83.3
	FEMENINO	7.3	4.6	6.1	1.3	36.1	21.4	3.8	7.3	7.9	.0	23.1	16.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.6	1.0	1.5	6.3	1.6	4.8	1.9	.0	1.0	25.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	14.9	27.4	7.6	19.0	9.8	14.3	15.4	4.9	17.5	25.0	7.7	16.7
	20-24 AÑOS	20.2	19.8	8.9	39.2	16.4	9.5	20.3	19.5	27.6	.0	.0	50.0
	25-29 AÑOS	17.5	16.8	10.3	20.3	11.5	19.0	17.6	19.5	22.8	.0	23.1	.0
	30-34 AÑOS	14.8	14.7	14.5	6.3	9.8	16.7	17.3	29.3	14.1	50.0	15.4	16.7
	35 AÑOS O MAS	31.1	20.3	57.3	8.9	50.8	35.7	27.6	26.8	17.0	.0	53.8	16.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.0	3.6	4.8	8.9	.0	7.1	1.4	7.3	1.6	.0	7.7	.0
	PRIMARIA	28.9	31.5	31.6	49.4	18.0	19.0	23.8	34.1	27.7	75.0	23.1	16.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.5	.6	.0	.0	2.4	.5	.0	.3	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	38.3	38.1	31.8	32.9	11.5	31.0	41.6	39.0	44.8	25.0	15.4	16.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.3	1.0	1.8	.0	3.3	4.8	1.1	2.4	.9	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	18.6	19.3	16.9	8.9	27.9	19.0	20.8	14.6	18.7	.0	30.8	50.0
	LICENCIATURA	8.8	6.1	11.6	.0	36.1	14.3	10.0	2.4	5.8	.0	15.4	16.7
	POSGRADO	.6	.0	.8	.0	3.3	2.4	.8	.0	.1	.0	7.7	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	28.4	16.2	37.1	19.0	47.5	23.8	28.4	12.2	25.2	.0	46.2	33.3
	SOLTERO	47.6	60.9	39.0	72.2	32.8	47.6	46.8	58.5	49.2	100.0	30.8	66.7
	DIVORCIADO	6.2	5.1	7.9	2.5	4.9	9.5	5.4	12.2	5.7	.0	.0	.0
	SEPARADO	6.8	5.6	7.4	1.3	4.9	7.1	8.4	4.9	6.8	.0	7.7	.0
	VIUDO	1.1	1.0	1.9	.0	1.6	2.4	.8	.0	.6	.0	7.7	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	9.9	11.2	6.6	5.1	8.2	9.5	10.3	12.2	12.5	.0	7.7	.0
	ESTUDIANTE	4.8	10.7	3.7	3.8	14.8	2.4	4.1	.0	4.1	.0	.0	33.3
	DESEMPLEADO	25.1	23.4	21.2	32.9	9.8	38.1	25.5	41.5	27.3	.0	23.1	33.3
	DESOCUPADO	8.3	7.6	7.6	5.1	4.9	14.3	7.3	9.8	9.4	50.0	.0	16.7
	TRABAJO FIJO	30.2	27.9	35.5	16.5	47.5	23.8	36.9	17.1	25.1	.0	53.8	.0
	TRABAJO OCASIONAL	28.3	28.4	27.0	40.5	8.2	14.3	24.9	31.7	31.7	50.0	15.4	16.7
	AMA DE CASA	1.9	1.5	1.1	1.3	9.8	7.1	.8	.0	2.3	.0	7.7	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	1.3	.5	3.9	.0	4.9	.0	.5	.0	.1	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	38.9	30.5	38.4	24.1	62.3	45.2	43.0	46.3	38.0	.0	76.9	50.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	56.7	64.5	56.6	73.4	31.1	50.0	53.5	51.2	57.7	100.0	23.1	50.0
	POR INDICACION LEGAL	2.1	2.5	2.3	1.3	.0	2.4	1.6	.0	2.5	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.6	.0	.6	.0	6.6	.0	.3	2.4	.3	.0	.0	.0
OTROS	1.7	2.5	2.1	1.3	.0	2.4	1.6	.0	1.5	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
DURANGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=2306	n=197	n=620	n=79	n=61	n=42	n=370	n=41	n=873	n=4	n=13	n=6
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	68.6	82.7	59.4	70.9	91.8	81.0	58.6	95.1	72.2	100.0	92.3	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	7.7	5.1	7.1	8.9	3.3	4.8	9.2	2.4	8.8	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	16.9	8.1	24.2	16.5	4.9	7.1	22.4	2.4	13.7	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	3.4	1.5	5.5	.0	.0	2.4	3.5	.0	2.9	.0	.0	33.3
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	3.5	2.5	3.9	3.8	.0	4.8	6.2	.0	2.4	.0	7.7	16.7
	9 AÑOS O MENOS	7.1	6.6	5.7	11.4	1.6	4.8	7.6	7.3	8.0	.0	15.4	16.7
	10-14 AÑOS	47.7	53.3	39.4	63.3	39.3	45.2	49.7	61.0	50.1	100.0	23.1	66.7
	15-19 AÑOS	36.2	36.5	40.9	25.3	42.6	38.1	33.2	24.4	35.5	.0	30.8	16.7
	20-24 AÑOS	5.8	2.5	8.9	.0	11.5	4.8	6.8	4.9	4.1	.0	15.4	.0
	25-29 AÑOS	1.6	.5	2.6	.0	.0	.0	1.6	2.4	1.5	.0	7.7	.0
	30-34 AÑOS	.7	.0	1.3	.0	3.3	.0	.8	.0	.5	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.8	.5	1.3	.0	1.6	7.1	.3	.0	.3	.0	7.7	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	35.9	27.9	58.5	13.9	9.8	23.8	34.3	12.2	28.2	.0	23.1	33.3
	MARIGUANA	11.9	32.0	4.2	15.2	1.6	19.0	15.1	31.7	10.7	.0	.0	33.3
	INHALABLES	3.9	4.6	1.5	22.8	.0	9.5	5.1	2.4	3.2	.0	7.7	16.7
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	.0
	COCAINA	2.9	1.5	.8	.0	.0	.0	7.6	7.3	3.1	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.5	.5	.3	.0	.0	9.5	.3	2.4	.2	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.2	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	42.3	32.5	34.0	48.1	88.5	35.7	35.7	41.5	49.7	100.0	46.2	16.7
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	7.7	.0
	OTROS	.1	.5	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	1.8	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	4.6	.0	7.7	.0
	ROHYPNOL	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.1	.0	.0	.0
	CRACK	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
DURANGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=2240	n=274	n=90	n=828	n=71	n=1	n=976	
SEXO	MASCULINO	93.0	97.4	93.3	91.2	84.5	100.0	94.0	
	FEMENINO	7.0	2.6	6.7	8.8	15.5	.0	6.0	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.6	1.1	2.2	1.0	4.2	.0	1.9	
	15-19 AÑOS	14.9	16.4	18.9	11.1	16.9	.0	17.2	
	20-24 AÑOS	19.8	24.5	24.4	15.7	28.2	100.0	20.8	
	25-29 AÑOS	17.5	24.5	20.0	15.7	22.5	.0	16.4	
	30-34 AÑOS	14.8	10.6	21.1	15.2	18.3	.0	14.8	
	35 AÑOS O MAS	31.5	23.0	13.3	41.3	9.9	.0	28.9	
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.1	2.6	10.0	2.8	2.8	.0	2.9	
	PRIMARIA	29.0	32.5	44.4	23.3	28.2	.0	31.6	
	TECNICO POST-PRIMARIA	.4	1.1	.0	.5	1.4	.0	.2	
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	38.1	43.4	27.8	35.1	46.5	100.0	39.3	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.3	.7	1.1	1.8	.0	.0	1.0	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	18.7	14.6	15.6	20.7	16.9	.0	18.5	
	LICENCIATURA	8.9	5.1	1.1	14.4	4.2	.0	6.4	
	POSGRADO	.6	.0	.0	1.4	.0	.0	.1	
	ESTADO CIVIL	SOLTERO	47.6	58.8	52.8	42.6	53.5	100.0	47.6
		CASADO	28.5	17.9	24.7	31.6	18.3	.0	29.8
DIVORCIADO		6.2	5.1	6.7	8.2	8.5	.0	4.6	
SEPARADO		6.9	8.4	5.6	7.9	8.5	.0	5.6	
VIUDO		1.1	.4	2.2	1.6	.0	.0	.9	
EDAD DE INICIO	UNION LIBRE	9.8	9.5	7.9	8.1	11.3	.0	11.4	
	9 AÑOS O MENOS	7.2	6.2	12.2	4.7	4.2	.0	9.3	
	10-14 AÑOS	48.5	55.5	67.8	39.5	36.6	.0	53.2	
	15-19 AÑOS	36.2	33.2	18.9	42.9	36.6	100.0	32.8	
	20-24 AÑOS	5.5	3.6	1.1	8.7	12.7	.0	3.2	
	25-29 AÑOS	1.4	.7	.0	1.8	5.6	.0	1.1	
	30-34 AÑOS	.7	.4	.0	1.1	2.8	.0	.3	
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.6	.4	.0	1.2	1.4	.0	.1	
	DIARIO	65.8	79.6	73.3	39.4	57.7	100.0	84.3	
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.7	5.8	8.9	10.1	7.0	.0	3.9	
	1 VEZ POR SEMANA	19.4	8.0	12.2	37.3	23.9	.0	7.8	
	1 A 3 VECES POR MES	4.2	3.3	.0	8.2	7.0	.0	1.1	
	1 A 11 VECES AL AÑO	3.8	3.3	5.6	5.0	4.2	.0	2.9	

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
DURANGO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
DURANGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	CRISTAL
		n=308	n=109	n=30	n=110	n=39	n=	n=67
SEXO	MASCULINO	93.2	92.7	96.7	96.4	94.9	94.0	88.1
	FEMENINO	6.8	7.3	3.3	3.6	5.1	6.0	11.9
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	10.6	6.4	11.5	7.4	8.3	9.8	3.4
	15 - 18 AÑOS	89.4	93.6	88.5	92.6	91.7	90.2	96.6
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	46.1	58.7	53.3	50.0	46.2	46.3	58.2
	SECUNDARIA	43.2	32.1	36.7	40.0	41.0	41.6	35.8
	PREPA	6.5	2.8	.0	7.3	2.6	5.4	1.5
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	4.2	6.4	10.0	2.7	10.3	6.7	4.5
	ESTUDIANTE	16.2	7.3	13.3	15.5	.0	12.8	3.0
	EMPLEADO	46.4	47.7	43.3	55.5	38.5	49.0	46.3
	SUBEMPLEADO	19.5	23.9	30.0	17.3	33.3	20.8	19.4
USA TATUAJES	HOGAR	1.6	.0	.0	1.8	.0	2.0	1.5
	NINGUNA	16.2	21.1	13.3	10.0	28.2	15.4	29.9
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	28.7	40.4	26.7	27.5	20.5	30.9	49.3
	NO	71.3	59.6	73.3	72.5	79.5	69.1	50.7
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	24.0	45.9	66.7	24.5	56.4	26.2	20.9
	NO	76.0	54.1	33.3	75.5	43.6	73.8	79.1
TIPO DE INFRACCION	SI	26.7	44.0	43.3	36.7	30.8	25.7	44.8
	NO	73.3	56.0	56.7	63.3	69.2	74.3	55.2
	ROBO	47.1	51.4	40.0	44.5	71.8	54.4	61.2
	VIOLACION	9.4	8.3	20.0	10.9	5.1	7.4	4.5
	HOMICIDIO	8.4	10.1	13.3	12.7	5.1	6.7	3.0
	LESIONES A TERCEROS	14.9	10.1	16.7	17.3	7.7	11.4	6.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	2.3	4.6	10.0	.0	10.3	3.4	.0
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	10.7	14.7	.0	6.4	.0	9.4	17.9
	CONSUMO DE DROGAS	.6	.9	.0	.0	.0	.7	1.5
	PORTACION DE ARMA	3.2	.9	3.3	4.5	.0	4.0	3.0
	OTROS	6.5	5.5	3.3	5.5	10.3	6.0	6.0
LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	58.4	58.7	40.0	55.5	38.5	56.4	65.7
	HOGAR	21.4	25.7	43.3	17.3	51.3	19.5	16.4
	TRABAJO	2.6	2.8	6.7	3.6	5.1	2.7	3.0
	ESCUELA	.3	.0	.0	.9	.0	.0	.0
	AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	LUGAR DE RECREO	1.3	.0	3.3	3.6	2.6	2.0	.0
OTRO	15.9	12.8	6.7	19.1	2.6	19.5	14.9	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
DURANGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIJUANA	OPIOIDES
		n=124	n=106	n=5	n=5	n=3	n=1
SEXO	MASCULINO	97.6	98.1	80.0	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	2.4	1.9	20.0	.0	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	7.3	5.7	40.0	.0	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	10.5	12.3	20.0	.0	.0	.0
	25 - 29 AÑOS	16.1	16.0	.0	20.0	33.3	.0
	30 - 34 AÑOS	15.3	11.3	20.0	40.0	.0	.0
	35 - 39 AÑOS	12.9	13.2	20.0	20.0	66.7	.0
	40 AÑOS O MÁS	37.9	41.5	.0	20.0	.0	100.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	11.3	13.2	.0	.0	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	19.4	22.6	.0	.0	.0	.0
	CAIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	GOLPES	.8	.9	.0	.0	.0	.0
	ASFIXIA	21.8	17.9	40.0	20.0	66.7	100.0
	APLASTAMIENTO	.8	.9	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	12.9	13.2	.0	40.0	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	6.5	4.7	.0	40.0	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	8.9	5.7	60.0	.0	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	17.7	20.8	.0	.0	33.3	.0
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	21.0	24.5	.0	.0	.0
CASA		40.3	35.8	100.0	40.0	66.7	100.0
CALLE		29.0	29.2	.0	60.0	33.3	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0	.0
AREAS RECREATIVAS		4.0	4.7	.0	.0	.0	.0
TRABAJO		.8	.9	.0	.0	.0	.0
ARES DE SERVICIO		4.0	3.8	.0	.0	.0	.0
OTROS		.8	.9	.0	.0	.0	.0

N= 1493 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 DURANGO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL n=8	MARIGUANA n=7	INHALABLES n=2	COCAINA * n=7	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=11	HEROINA n=0	CRISTAL** n=1	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=3	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	20.0	.0	.0	.0	.0	14.3	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	42.9	.0	.0	100.0	.0
CONTUSIONES	80.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	42.9	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=1128 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
DURANGO**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIJUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=273	n=336	n=72	n=69	n=37	n=9	n=18	n=5	n=10	n=2	n=4
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.5	3.9	2.8	8.7	2.7	.0	5.6	.0	10.0	.0	25.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.7	.0	2.8	4.3	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	5.5	6.0	13.9	14.5	13.5	33.3	5.6	.0	10.0	.0	25.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.7	.6	1.4	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.4	.3	.0	1.4	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	5.1	6.0	4.2	4.3	2.7	.0	5.6	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.7	.6	2.8	1.4	5.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	.0	.9	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	10.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	2.2	1.8	1.4	.0	.0	11.1	5.6	20.0	20.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	3.3	2.4	.0	1.4	.0	11.1	.0	.0	10.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	4.0	4.5	1.4	10.1	10.8	.0	5.6	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	2.9	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	.7	.6	11.1	5.8	5.4	11.1	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	16.5	16.7	19.4	24.6	24.3	11.1	16.7	40.0	10.0	.0	.0
NINGUNA	4.4	4.8	8.3	5.8	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=1128

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
DURANGO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	A LUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS	
		N=444	n=249	n=150	n=25	n=6	n=10	n=3	n=0	n=0	n=0	n=0	n=1	
SEXO	MASCULINO	77,0	72,3	83,3	88,0	50,0	100,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	
	FEMENINO	23,0	27,7	16,7	12,0	50,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	100,0	
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	10-14	10,6	10,9	10,0	12,0	16,7	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	15-19	34,1	35,9	29,3	36,0	50,0	40,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	
	20-24	17,8	19,0	18,7	12,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	
	25-29	11,5	7,7	17,3	20,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	30-34	9,0	8,1	9,3	4,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	16,9	18,5	15,3	16,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	
	SOLTERO	56,3	56,6	54,7	52,0	66,7	70,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	CASADO	22,3	21,7	26,7	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	U. LIBRE	11,3	10,4	12,0	16,0	16,7	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	SEPARADO	5,2	5,2	2,7	12,0	16,7	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	DIVORCIADO	2,7	3,2	2,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	VIUDO	,5	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	NO ESPECIFICA	1,8	2,4	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,7	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
		SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
PRIMARIA		15,6	16,1	12,8	32,0	16,7	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
SECUNDARIA		41,9	41,1	40,3	48,0	66,7	50,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	
TECNICO O COMERCIAL		2,7	2,8	2,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
BACHILLERATO		27,8	26,6	32,2	20,0	16,7	20,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	
LICENCIATURA		10,6	10,9	12,1	,0	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
POSGRADO		,2	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OCUPACION		ESTUDIANTE	25,2	22,6	31,9	12,0	16,7	20,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0
		ESTUDIA Y TRABAJA	4,5	3,8	5,7	8,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	25,9	23,0	29,8	28,0	33,3	20,0	33,3	,0	,0	,0	,0		
	LABORAL INESTABLE	17,3	17,9	17,7	24,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	DESEMPLEADO	7,8	9,8	3,5	12,0	16,7	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	DESOCUPADO	13,3	14,9	8,5	12,0	16,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	HOGAR	5,5	7,7	2,1	4,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	PENSIONADO	,5	,4	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,5	,4	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	MEDIO ALTO	4,6	4,7	5,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
	MEDIO BAJO	64,9	65,2	70,2	37,5	40,0	50,0	100,0	,0	,0	,0	,0		
	BAJO	29,6	29,2	22,7	62,5	60,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0		
	POBREZA EXTREMA	,5	,4	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
DURANGO**

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=444	n=42	n=97	n=51	n=94	n=39	n=103	n=0	n=0	n=9	n=3	n=1
SEXO	MASCULINO	77.0	52.4	72.2	90.2	81.9	84.6	78.6	.0	.0	77.8	66.7	.0
	FEMENINO	23.0	47.6	27.8	9.8	18.1	15.4	21.4	.0	.0	22.2	33.3	100.0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10-14	10.7	7.3	7.2	11.8	11.7	28.2	5.8	.0	.0	33.3	.0	.0
	15-19	33.6	19.5	29.9	56.9	19.1	53.8	35.0	.0	.0	55.6	33.3	.0
	20-24	18.0	7.3	17.5	9.8	23.4	12.8	26.2	.0	.0	.0	.0	.0
	25-29	11.6	9.8	13.4	11.8	12.8	.0	15.5	.0	.0	.0	.0	.0
	30-34	9.1	9.8	12.4	2.0	12.8	5.1	6.8	.0	.0	11.1	33.3	.0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	16.9	46.3	19.6	7.8	20.2	.0	10.7	.0	.0	.0	33.3	100.0
	SOLTERO	56.0	38.1	50.5	78.4	47.9	87.2	50.5	.0	.0	100.0	33.3	.0
	CASADO	22.6	45.2	26.8	15.7	23.4	5.1	20.4	.0	.0	.0	33.3	.0
	U. LIBRE	11.4	4.8	11.3	5.9	18.1	5.1	14.6	.0	.0	.0	.0	.0
	SEPARADO	5.2	4.8	5.2	.0	5.3	2.6	8.7	.0	.0	.0	33.3	.0
	DIVORCIADO	2.5	2.4	3.1	.0	3.2	.0	3.9	.0	.0	.0	.0	.0
	VIUDO	.5	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
	NO ESPECIFICA	1.8	2.4	3.1	.0	2.1	.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	.7	.0	1.0	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	.5	2.4	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	15.8	21.4	14.4	17.6	9.7	20.5	19.6	.0	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA	41.9	28.6	30.9	39.2	44.1	66.7	45.1	.0	.0	77.8	33.3	.0
	TECNICO O COMERCIAL	2.7	7.1	1.0	.0	4.3	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	100.0
	BACHILLERATO	27.7	28.6	36.1	37.3	29.0	7.7	22.5	.0	.0	22.2	.0	.0
	LICENCIATURA	10.5	9.5	16.5	5.9	12.9	5.1	6.9	.0	.0	.0	66.7	.0
	POSGRADO	.2	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	25.0	20.0	22.8	35.3	24.4	44.7	13.0	.0	.0	66.7	.0	.0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4.3	.0	5.4	11.8	3.3	2.6	3.3	.0	.0	.0	.0	.0
	LABORAL ESTABLE	26.0	32.5	30.4	13.7	35.6	.0	29.3	.0	.0	.0	.0	100.0
	LABORAL INESTABLE	17.3	12.5	19.6	15.7	18.9	13.2	18.5	.0	.0	.0	66.7	.0
	DESEMPLEADO	7.9	5.0	6.5	5.9	4.4	5.3	16.3	.0	.0	11.1	.0	.0
	DESOCUPADO	13.5	7.5	8.7	15.7	11.1	28.9	15.2	.0	.0	22.2	.0	.0
	HOGAR	5.5	22.5	5.4	2.0	2.2	5.3	4.3	.0	.0	.0	.0	.0
	PENSIONADO	.5	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	33.3	.0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	.5	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	MEDIO ALTO	4.6	13.2	5.7	4.3	5.6	.0	1.0	.0	.0	11.1	.0	.0
	MEDIO BAJO	65.0	55.3	68.2	59.6	67.4	50.0	72.4	.0	.0	44.4	100.0	100.0
	BAJO	29.4	31.6	23.9	34.0	27.0	50.0	25.5	.0	.0	44.4	.0	.0
	POBREZA EXTREMA	.5	.0	.0	2.1	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	TABACO	56.3	76.2	56.7	45.1	48.9	56.4	62.1	.0	.0	33.3	66.7	.0
	ALCOHOL	33.7	21.4	40.2	37.3	39.4	17.9	31.1	.0	.0	44.4	33.3	.0
	MARIJUANA	5.5	2.4	1.0	15.7	8.5	10.3	1.0	.0	.0	11.1	.0	.0
	COCAÍNA	1.4	.0	1.0	2.0	2.1	.0	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
	INHALABLES	2.3	.0	1.0	.0	1.1	15.4	1.0	.0	.0	11.1	.0	.0
	ESTIMULANTES	.7	.0	.0	.0	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	.0
	DE DISEÑO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ALUCINOGENAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DEPRESORES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIACEOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



GUANAJUATO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
GUANAJUATO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1471	n=283	n=354	n=457	n=43	n=35	n=253	n=4	n=30	n=7	n=4
SEXO	MASCULINO	94.7	98.9	92.1	96.5	97.7	91.4	92.1	75.0	86.7	71.4	100.0
	FEMENINO	5.3	1.1	7.9	3.5	2.3	8.6	7.9	25.0	13.3	28.6	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	5.6	6.0	1.7	10.3	2.3	.0	2.8	.0	10.0	28.6	.0
	15-19 AÑOS	33.3	36.7	17.2	51.4	32.6	31.4	21.7	.0	33.3	.0	.0
	20-24 AÑOS	19.0	21.2	12.7	19.9	11.6	5.7	24.5	.0	30.0	28.6	60.0
	25-29 AÑOS	15.3	15.2	18.4	10.5	11.6	8.6	21.7	50.0	13.3	.0	.0
	30-34 AÑOS	11.0	11.7	14.4	5.0	16.3	17.1	14.2	25.0	13.3	.0	20.0
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	15.8	9.2	35.6	2.8	25.6	37.1	15.0	25.0	.0	42.9	20.0
	NO FUE A LA ESCUELA	4.6	5.0	3.7	6.4	4.8	2.9	3.2	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	52.1	58.7	40.7	70.0	33.3	42.9	37.3	50.0	30.0	28.6	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.0	.8	.7	.0	2.9	.4	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	30.4	31.0	34.2	21.5	50.0	34.3	33.7	25.0	53.3	28.6	60.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.2	.4	1.1	.0	.0	8.6	3.6	.0	3.3	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	6.6	3.9	8.8	1.3	9.5	5.7	14.3	25.0	10.0	28.6	20.0
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	4.4	1.1	10.5	.2	2.4	2.9	7.1	.0	3.3	14.3	20.0
	POSGRADO	.1	.0	.3	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0
	CASADO	24.9	21.6	43.8	8.1	51.2	34.3	27.0	25.0	20.0	42.9	20.0
	SOLTERO	63.3	70.3	39.0	85.1	39.5	51.4	56.3	25.0	70.0	42.9	60.0
	DIVORCIADO	1.9	.4	4.5	.0	2.3	5.7	2.8	25.0	.0	.0	.0
	SEPARADO	3.4	2.8	4.5	2.2	4.7	5.7	4.4	.0	.0	14.3	.0
	VIUDO	.5	.0	1.7	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	20.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	5.9	4.9	6.5	4.6	.0	2.9	9.5	25.0	10.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	6.9	7.5	8.8	4.7	7.3	5.7	7.4	.0	7.1	28.6	.0
	DESEMPLEADO	13.4	11.5	13.1	10.9	22.0	17.1	15.6	.0	42.9	14.3	20.0
	DESOCUPADO	15.6	13.6	9.4	25.5	4.9	2.9	12.3	25.0	7.1	28.6	40.0
	TRABAJO FIJO	37.8	43.4	42.6	29.7	53.7	31.4	40.7	.0	21.4	14.3	40.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	24.3	22.9	22.7	28.8	7.3	34.3	21.8	50.0	21.4	14.3	.0
	AMA DE CASA	1.2	1.1	1.4	.4	.0	2.9	2.1	25.0	.0	.0	.0
	JUBILADO	.8	.0	2.0	.0	4.9	5.7	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	17.7	9.5	23.5	3.5	4.7	34.3	33.7	25.0	80.0	85.7	80.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	13.6	6.0	22.7	6.8	4.7	5.7	23.0	75.0	16.7	14.3	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	POR INDICACION LEGAL	66.1	82.7	49.0	89.3	88.4	60.0	38.1	.0	3.3	.0	20.0
	POR INDICACION MEDICA	.2	.4	.0	.2	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0
	OTROS	2.4	1.4	4.8	.2	2.3	.0	4.8	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
GUANAJUATO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1471	n=283	n=354	n=457	n=43	n=35	n=253	n=4	n=30	n=7	n=5
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	87.7	95.1	75.4	98.0	100.0	88.6	81.0	75.0	60.0	71.4	20.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	5.0	2.8	8.5	1.1	.0	2.9	9.1	.0	13.3	28.6	20.0
	1 VEZ POR SEMANA	5.0	1.4	12.1	.4	.0	8.6	5.9	25.0	16.7	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	2.0	.4	3.1	.2	.0	.0	4.0	.0	10.0	.0	60.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.3	.4	.8	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	2.5	2.1	1.1	2.4	.0	.0	4.3	.0	3.3	14.3	40.0
	10-14 AÑOS	43.5	35.0	33.3	56.4	51.2	48.6	41.5	50.0	56.7	28.6	20.0
	15-19 AÑOS	45.2	52.3	55.9	36.3	48.8	25.7	42.3	50.0	33.3	14.3	40.0
	20-24 AÑOS	5.7	7.8	6.2	4.2	.0	5.7	6.3	.0	6.7	14.3	.0
	25-29 AÑOS	1.6	1.4	2.3	.2	.0	8.6	3.2	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.8	1.4	.6	.4	.0	2.9	1.2	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.7	.0	.6	.0	.0	8.6	1.2	.0	.0	28.6	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	28.9	7.4	76.6	5.0	32.6	11.4	33.2	.0	26.7	.0	.0
	MARIGUANA	19.2	71.0	.8	3.5	.0	20.0	19.0	75.0	6.7	.0	60.0
	INHALABLES	36.2	16.3	7.6	90.6	9.3	28.6	10.7	.0	3.3	28.6	40.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.5	1.1	.6	.4	.0	5.7	26.9	.0	13.3	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	1.4	.7	1.1	.0	.0	25.7	1.2	.0	3.3	14.3	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.4	.0	.3	.0	.0	5.7	.0	.0	3.3	28.6	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	6.7	3.5	12.4	.4	58.1	2.9	5.5	.0	10.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	28.6	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.9	.0	.6	.0	.0	.0	.4	.0	33.3	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
GUANAJUATO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1430	n=283	n=533	n=425	n=89	n=1	n=99
SEXO	MASCULINO	95.1	97.9	97.0	93.9	88.8	100.0	87.9
	FEMENINO	4.9	2.1	3.0	6.1	11.2	.0	12.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	5.4	3.5	9.9	1.4	4.5	.0	4.0
	15-19 AÑOS	33.6	33.9	50.1	17.2	22.5	.0	25.3
	20-24 AÑOS	19.2	23.0	18.4	14.6	33.7	.0	20.2
	25-29 AÑOS	15.3	14.5	12.6	20.0	15.7	.0	12.1
	30-34 AÑOS	10.9	13.1	5.3	15.5	12.4	100.0	13.1
	35 AÑOS O MAS	15.5	12.0	3.8	31.3	11.2	.0	25.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.6	4.6	5.6	4.7	1.1	.0	2.0
	PRIMARIA	52.4	56.2	69.4	35.3	48.9	100.0	26.5
	TECNICO POST-PRIMARIA	.4	.0	.8	.5	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	30.3	30.2	23.3	34.1	33.0	.0	50.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.3	1.8	.0	1.9	1.1	.0	4.1
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	6.5	5.7	.6	12.7	11.4	.0	9.2
	LICENCIATURA	4.4	1.4	.4	10.4	4.5	.0	8.2
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.1	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	SOLTERO	63.5	67.1	83.7	40.3	56.2	100.0	50.5
	CASADO	24.8	24.4	9.0	41.0	28.1	.0	38.4
	DIVORCIADO	1.9	1.1	.0	4.2	3.4	.0	3.0
	SEPARADO	3.4	2.5	2.1	5.9	.0	.0	5.1
	VIUDO	.6	.0	.2	.9	.0	.0	3.0
	UNION LIBRE	5.9	4.9	5.1	7.5	12.4	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	2.5	2.8	3.8	1.6	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	43.7	31.8	57.6	35.5	28.1	.0	53.5
	15-19 AÑOS	45.8	53.7	34.5	55.5	41.6	100.0	44.4
	20-24 AÑOS	5.5	9.2	3.4	4.7	14.6	.0	1.0
	25-29 AÑOS	1.5	1.1	.4	2.1	7.9	.0	1.0
	30-34 AÑOS	.6	1.4	.4	.0	3.4	.0	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.4	.0	.0	.5	4.5	.0	.0
	DIARIO	85.7	91.5	96.4	67.1	82.0	.0	96.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	5.9	3.9	2.6	11.3	9.0	.0	3.0
	1 VEZ POR SEMANA	5.4	1.8	.2	15.5	4.5	100.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	2.5	1.8	.6	5.6	4.5	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.5	1.1	.2	.5	.0	.0	1.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
GUANAJUATO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
GUANAJUATO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=69	n=11	n=10	n=26	n=6	n=28	
SEXO	MASCULINO	91.3	81.8	100.0	96.2	83.3	96.4	
	FEMENINO	8.7	18.2	.0	3.8	16.7	3.6	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	21.2	27.3	11.1	8.0	25.0	11.1	
	15 - 18 AÑOS	78.8	72.7	88.9	92.0	75.0	88.9	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	47.1	54.5	60.0	65.4	50.0	53.6	
	SECUNDARIA	39.7	27.3	20.0	23.1	50.0	35.7	
	PREPA	8.8	9.1	10.0	3.8	.0	3.6	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	4.4	9.1	10.0	7.7	.0	7.1	
	ESTUDIANTE	16.7	9.1	10.0	7.7	.0	10.7	
	EMPLEADO	19.7	45.5	40.0	26.9	66.7	28.6	
	SUBEMPLEADO	28.8	27.3	20.0	34.6	16.7	32.1	
USA TATUAJES	HOGAR	3.0	.0	.0	3.8	.0	3.6	
	NINGUNA	31.8	18.2	30.0	26.9	16.7	25.0	
	SI	13.0	27.3	50.0	30.8	33.3	28.6	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	87.0	72.7	50.0	69.2	66.7	71.4	
	SI	20.3	45.5	70.0	23.1	16.7	21.4	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	79.7	54.5	30.0	76.9	83.3	78.6	
	SI	7.2	27.3	30.0	15.4	.0	14.3	
TIPO DE INFRACCION	NO	92.8	72.7	70.0	84.6	100.0	85.7	
	ROBO	27.5	18.2	20.0	15.4	33.3	21.4	
	VIOLACION	18.8	.0	.0	19.2	.0	10.7	
	HOMICIDIO	15.9	36.4	70.0	26.9	16.7	28.6	
	LESIONES A TERCEROS	15.9	9.1	10.0	34.6	33.3	25.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	5.8	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	1.4	.0	.0	.0	.0	3.6	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	10.1	27.3	.0	3.8	16.7	10.7	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	7.2	9.1	.0	.0	.0	3.6	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	72.5	54.5	60.0	69.2	83.3	67.9
		HOGAR	18.8	27.3	30.0	23.1	16.7	25.0
TRABAJO		1.4	9.1	.0	.0	.0	.0	
ESCUELA		1.4	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.4	.0	.0	3.8	.0	3.6	
OTRO	4.3	9.1	10.0	3.8	.0	3.6		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
GUANAJUATO**

		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA
		n=21	n=18	n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	90.5	88.9	100.0	100.0
	FEMENINO	9.5	11.1	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	9.5	5.6	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	33.3	33.3	100.0	.0
	25 - 29 AÑOS	4.8	5.6	.0	.0
	30 - 34 AÑOS	14.3	16.7	.0	100.0
	35 - 39 AÑOS	9.5	11.1	.0	.0
	40 AÑOS O MÁS	28.6	27.8	.0	.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	23.8	27.8	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	19.0	22.2	.0	.0
	CAIDA	4.8	5.6	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	4.8	.0	.0	.0
	GOLPES	.0	.0	.0	.0
	ASFIXIA	33.3	33.3	.0	100.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0
	OBJETO	4.8	.0	100.0	.0
	PUNZO-CORTANTE	.0	.0	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	.0	.0	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	9.5	11.1	.0	.0
LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	4.8	5.6	.0	.0
	CASA	23.8	22.2	.0	100.0
	CALLE	52.4	55.6	100.0	.0
	BAÑOS PUBLICOS	4.8	5.6	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	4.8	5.6	.0	.0
	TRABAJO	.0	.0	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	.0	.0	.0	.0
	OTROS	9.5	5.6	.0	.0

N= 102 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
GUANAJUATO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=15	n=1	n=1	n=1	n=0	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	27.3	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=554 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
GUANAJUATO**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=97	n=115	n=35	n=15	n=7	n=3	n=5	n=1	n=3	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.2	6.1	2.9	6.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	8.2	7.0	28.6	40.0	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	10.3	9.6	14.3	20.0	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	1.0	1.7	.0	.0	.0	.0	20.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	2.1	1.7	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	1.0	1.7	11.4	6.7	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	10.3	5.2	22.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	3.1	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	9.3	6.1	5.7	13.3	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	12.4	15.7	11.4	6.7	14.3	.0	20.0	.0	33.3	.0	.0
NINGUNA	17.5	21.7	.0	13.3	14.3	33.3	40.0	.0	33.3	.0	.0

N= 554

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
GUANAJUATO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1035	n=572	n=301	n=50	n=9	n=84	n=8	n=0	n=0	n=6	n=0	n=5
SEXO	MASCULINO	75,7	74,7	78,4	82,0	77,8	76,2	50,0	,0	,0	66,7	,0	20,0
	FEMENINO	24,3	25,3	21,6	18,0	22,2	23,8	50,0	,0	,0	33,3	,0	80,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	16,9	17,3	10,0	4,1	11,1	46,4	12,5	,0	,0	20,0	,0	20,0
	15-19	26,1	23,1	30,0	30,6	33,3	26,2	50,0	,0	,0	,0	,0	60,0
	20-24	15,1	14,0	18,0	14,3	11,1	14,3	12,5	,0	,0	20,0	,0	,0
	25-29	11,8	11,4	12,0	22,4	33,3	4,8	25,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	30-34	8,9	8,6	11,0	12,2	11,1	2,4	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	21,2	25,7	19,0	16,3	,0	6,0	,0	,0	,0	20,0	,0	20,0
	SOLTERO	58,0	54,9	56,8	58,0	66,7	81,0	62,5	,0	,0	50,0	,0	80,0
	CASADO	26,7	29,4	28,6	20,0	22,2	8,3	12,5	,0	,0	33,3	,0	,0
	U. LIBRE	5,8	5,2	6,6	8,0	,0	6,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	5,2	5,8	3,7	12,0	11,1	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	20,0
	DIVORCIADO	2,1	2,8	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	,9	1,0	,0	,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,4	1,0	1,3	2,0	,0	1,2	12,5	,0	,0	16,7	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,1	,9	1,0	4,0	,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,6	,4	,7	2,0	,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,0	22,5	18,7	22,0	22,2	26,2	37,5	,0	,0	66,7	,0	20,0
	SECUNDARIA	47,0	45,3	46,0	42,0	55,6	65,5	62,5	,0	,0	,0	,0	60,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,9	2,8	4,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	BACHILLERATO	19,6	19,6	23,7	26,0	,0	6,0	,0	,0	,0	,0	,0	20,0
	LICENCIATURA	6,5	8,3	5,7	2,0	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,3	,2	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	23,7	22,7	20,1	8,0	22,2	48,2	50,0	,0	,0	20,0	,0	60,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,0	4,1	4,4	4,0	,0	2,4	12,5	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,6	29,4	31,6	32,0	11,1	15,7	,0	,0	,0	,0	,0	40,0
	LABORAL INESTABLE	15,5	13,6	18,4	26,0	22,2	9,6	25,0	,0	,0	40,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,2	9,2	7,5	6,0	33,3	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	10,9	9,4	10,5	20,0	11,1	16,9	12,5	,0	,0	20,0	,0	,0
	HOGAR	7,9	10,1	6,5	4,0	,0	2,4	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,2	1,6	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,7	,9	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	8,8	10,2	9,1	6,4	11,1	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	55,6	54,6	61,1	55,3	33,3	48,8	62,5	,0	,0	16,7	,0	40,0
	BAJO	32,9	32,1	28,1	34,0	44,4	48,8	37,5	,0	,0	66,7	,0	60,0
	POBREZA EXTREMA	2,0	2,2	1,1	4,3	11,1	1,2	,0	,0	,0	16,7	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
GUANAJUATO

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1035	n=192	n=201	n=120	n=217	n=208	n=41	n=0	n=4	n=23	n=5	n=7
SEXO	MASCULINO	75,7	54,7	80,6	87,5	88,0	77,4	75,6	,0	50,0	43,5	40,0	28,6
	FEMENINO	24,3	45,3	19,4	12,5	12,0	22,6	24,4	,0	50,0	56,5	60,0	71,4
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	16,6	9,4	5,0	10,0	2,8	57,2	4,9	,0	,0	4,3	,0	14,3
	15-19	26,2	10,9	26,4	50,8	20,0	34,1	17,1	,0	75,0	13,0	40,0	28,6
	20-24	15,4	8,3	16,9	15,8	25,6	6,3	34,1	,0	25,0	8,7	20,0	14,3
	25-29	11,8	7,3	15,9	5,0	23,7	,5	17,1	,0	,0	34,8	,0	14,3
	30-34	8,9	6,3	11,9	9,2	14,0	1,4	17,1	,0	,0	4,3	20,0	14,3
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	21,2	57,8	23,9	9,2	14,0	,5	9,8	,0	,0	34,8	20,0	14,3
	SOLTERO	58,1	34,9	50,7	73,3	45,6	93,8	53,7	,0	100,0	26,1	60,0	71,4
	CASADO	26,6	45,8	31,3	11,7	34,6	2,4	24,4	,0	,0	56,5	20,0	28,6
	U. LIBRE	5,7	2,6	7,0	5,0	10,1	1,4	12,2	,0	,0	8,7	20,0	,0
	SEPARADO	5,2	8,3	6,0	4,2	7,4	,5	7,3	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,2	4,7	3,5	1,7	1,4	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	3,1	,0	,0	,0	,0	2,4	,0	,0	8,7	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	1,4	,5	1,5	4,2	,9	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,1	1,6	,5	2,5	1,4	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,6	2,1	,5	,0	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,0	29,3	16,2	26,9	20,4	18,4	29,3	,0	,0	30,4	,0	14,3
	SECUNDARIA	46,8	27,2	39,1	45,4	49,1	70,0	43,9	,0	75,0	47,8	80,0	42,9
	TECNICO O COMERCIAL	2,9	8,4	1,5	1,7	1,9	1,0	4,9	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	19,7	17,3	30,5	22,7	20,8	8,7	22,0	,0	25,0	13,0	,0	42,9
OCUPACION	LICENCIATURA	6,6	13,6	11,2	,8	6,5	1,0	,0	,0	,0	4,3	20,0	,0
	POSGRADO	,3	,5	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	4,3	,0	,0
	ESTUDIANTE	23,5	13,2	14,7	30,5	5,7	58,2	15,0	,0	,0	13,6	,0	42,9
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,0	3,7	4,1	4,2	2,4	6,7	2,5	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,5	32,3	39,6	25,4	38,7	6,3	25,0	,0	25,0	31,8	40,0	28,6
	LABORAL INESTABLE	15,6	13,8	20,8	17,8	17,9	6,7	27,5	,0	25,0	13,6	20,0	,0
	DESEMPLEADO	8,4	4,2	6,1	9,3	17,0	5,8	5,0	,0	,0	9,1	20,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	DESOCUPADO	10,9	4,8	8,6	11,9	15,1	13,5	15,0	,0	25,0	4,5	,0	14,3
	HOGAR PENSIONADO	8,1	22,8	5,6	,8	3,3	2,9	10,0	,0	25,0	27,3	20,0	14,3
	ALTO	1,1	5,3	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	,7	1,6	1,1	,8	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	9,0	15,8	8,5	5,9	9,6	4,4	5,1	,0	75,0	,0	20,0	14,3
	BAJO	55,7	59,0	55,3	47,1	55,8	59,7	48,7	,0	25,0	52,2	80,0	57,1
	POBREZA EXTREMA	32,7	20,2	33,5	42,0	33,2	35,4	46,2	,0	,0	39,1	,0	28,6
DROGA DE INICIO	TABACO	1,9	3,3	1,6	4,2	1,0	,5	,0	,0	,0	8,7	,0	,0
	TABACO	55,5	75,5	49,3	47,5	52,1	55,8	36,6	,0	25,0	56,5	80,0	28,6
	ALCOHOL	29,4	19,8	43,3	30,0	32,7	17,8	43,9	,0	50,0	30,4	20,0	28,6
	MARIGUANA	4,8	2,6	3,5	11,7	6,0	2,4	7,3	,0	,0	4,3	,0	14,3
	COCAÍNA	,9	,0	,5	,0	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	7,8	1,0	3,0	8,3	4,1	23,6	2,4	,0	25,0	4,3	,0	,0
	ESTIMULANTES	,8	,5	,0	1,7	,5	,5	7,3	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,4	,0	,0	,0	,9	,0	2,4	,0	,0	4,3	,0	,0
OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OTRAS	,5	,5	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	28,6	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



GUERRERO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
GUERRERO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1999	n=164	n=953	n=121	n=23	n=1	n=679	n=17	n=31	n=7	n=3
SEXO	MASCULINO	93.3	97.6	92.2	96.7	87.0	100.0	93.2	100.0	93.5	100.0	100.0
	FEMENINO	6.7	2.4	7.8	3.3	13.0	.0	6.8	.0	6.5	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.8	4.9	1.6	9.9	13.0	.0	2.5	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	17.2	25.6	7.8	33.1	26.1	.0	24.9	17.6	32.3	.0	.0
	20-24 AÑOS	17.3	21.3	10.7	24.8	17.4	.0	23.3	23.5	38.7	.0	.0
	25-29 AÑOS	14.9	14.6	12.1	10.7	8.7	.0	19.4	29.4	9.7	42.9	.0
	30-34 AÑOS	11.7	7.9	11.1	5.0	17.4	.0	14.0	23.5	12.9	14.3	33.3
	35 AÑOS O MAS	36.2	25.6	56.8	16.5	17.4	100.0	15.9	5.9	6.5	42.9	66.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	10.0	7.3	14.9	12.4	8.7	.0	4.1	.0	3.2	.0	.0
	PRIMARIA	37.5	47.6	40.0	41.3	43.5	.0	30.9	41.2	38.7	28.6	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.0	.7	1.7	.0	.0	.3	.0	.0	.0	33.3
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	32.6	32.9	25.2	34.7	39.1	.0	41.8	41.2	45.2	14.3	33.3
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.6	.0	.6	.8	.0	.0	.6	.0	3.2	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.2	9.1	12.0	7.4	8.7	.0	19.4	17.6	9.7	57.1	33.3
	LICENCIATURA	4.3	3.0	6.3	1.7	.0	100.0	2.7	.0	.0	.0	.0
	POSGRADO	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	29.2	18.3	40.0	9.1	21.7	.0	22.0	5.9	16.1	14.3	33.3
	SOLTERO	48.3	63.4	34.8	78.5	73.9	.0	56.2	82.4	61.3	42.9	33.3
	DIVORCIADO	3.0	1.2	4.1	.8	4.3	100.0	1.8	5.9	3.2	.0	33.3
	SEPARADO	9.3	3.0	11.2	5.8	.0	.0	9.0	.0	6.5	42.9	.0
	VIUDO	1.6	2.4	2.4	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	8.6	11.6	7.5	5.8	.0	.0	10.3	5.9	12.9	.0	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	3.7	6.2	2.4	3.3	17.4	.0	4.3	5.9	6.5	.0	.0
	DESEMPLEADO	14.9	15.4	11.9	15.0	17.4	.0	19.1	11.8	12.9	28.6	.0
	DESOCUPADO	10.9	13.6	6.7	22.5	8.7	.0	13.2	29.4	16.1	28.6	33.3
	TRABAJO FIJO	21.3	17.9	24.8	11.7	17.4	.0	19.5	35.3	12.9	.0	.0
	TRABAJO OCASIONAL	48.2	46.3	52.7	47.5	34.8	.0	43.5	17.6	51.6	42.9	66.7
	AMA DE CASA	.6	.6	.7	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.5	.0	.7	.0	4.3	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	12.8	11.6	9.8	10.7	8.7	.0	17.4	17.6	19.4	28.6	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	83.4	80.5	87.4	81.8	91.3	100.0	78.9	82.4	80.6	71.4	66.7
	POR INDICACION LEGAL	1.5	3.7	1.4	2.5	.0	.0	.9	.0	.0	.0	33.3
	POR INDICACION MEDICA	.2	.6	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	2.2	3.7	1.3	5.0	.0	.0	2.8	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
GUERRERO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1999	n=164	n=953	n=121	n=23	n=1	n=679	n=17	n=31	n=7	n=3
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	59.8	78.7	50.1	57.0	82.6	100.0	68.3	70.6	58.1	42.9	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	10.5	7.3	11.5	10.7	8.7	.0	9.3	5.9	25.8	14.3	.0
	1 VEZ POR SEMANA	19.4	7.3	26.3	19.0	4.3	.0	13.8	5.9	9.7	42.9	.0
	1 A 3 VECES POR MES	8.4	6.1	10.1	9.1	4.3	.0	6.6	17.6	6.5	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.9	.6	2.0	4.1	.0	.0	1.9	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	5.4	6.7	4.5	10.7	13.0	.0	5.2	5.9	3.2	14.3	.0
	10-14 AÑOS	43.3	49.4	37.0	59.5	47.8	.0	46.7	58.8	54.8	28.6	66.7
	15-19 AÑOS	38.2	35.4	38.8	24.8	34.8	100.0	41.2	23.5	32.3	42.9	.0
	20-24 AÑOS	7.7	4.9	12.0	1.7	.0	.0	3.8	5.9	6.5	14.3	.0
	25-29 AÑOS	3.3	1.2	4.8	.8	.0	.0	2.2	.0	3.2	.0	33.3
	30-34 AÑOS	1.1	1.8	1.2	1.7	4.3	.0	.6	5.9	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.6	1.7	.8	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	57.5	29.9	82.0	25.6	39.1	.0	38.3	29.4	45.2	.0	.0
	MARIGUANA	17.7	48.2	5.0	21.5	.0	.0	27.4	29.4	25.8	14.3	33.3
	INHALABLES	4.2	5.5	.9	25.6	4.3	.0	4.4	5.9	6.5	14.3	.0
	ALUCINOGENOS	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	14.3	33.3
	HEROINA	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	11.8	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.3	2.4	.8	.0	.0	.0	12.8	5.9	12.9	14.3	.0
	TRANQUILIZANTES	.4	.0	.2	.8	.0	100.0	.4	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	13.5	13.4	10.4	24.0	56.5	.0	14.6	17.6	3.2	42.9	33.3
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.2	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.8	.0	.2	1.7	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
GUERRERO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1983	n=354	n=84	n=1149	n=123	n=3	n=270
SEXO	MASCULINO	93.4	97.7	100.0	92.3	92.7	100.0	90.4
	FEMENINO	6.6	2.3	.0	7.7	7.3	.0	9.6
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.8	4.2	8.3	1.7	2.4	.0	4.1
	15-19 AÑOS	17.1	28.2	33.3	10.9	31.7	.0	17.8
	20-24 AÑOS	17.1	21.2	19.0	13.1	26.8	33.3	24.1
	25-29 AÑOS	14.8	17.8	15.5	12.6	23.6	66.7	15.6
	30-34 AÑOS	11.7	12.4	4.8	13.0	7.3	.0	10.0
	35 AÑOS O MAS	36.4	16.1	19.0	48.8	8.1	.0	28.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	10.0	6.5	9.5	11.7	4.1	33.3	10.4
	PRIMARIA	37.6	39.0	53.6	37.6	27.6	.0	35.9
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.3	.0	.8	.0	.0	.7
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	32.7	41.0	23.8	28.4	44.7	66.7	36.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.6	.6	1.2	.6	.0	.0	.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.1	10.7	9.5	15.3	20.3	.0	11.9
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	4.2	1.7	2.4	5.4	3.3	.0	3.7
	POSGRADO	.2	.3	.0	.2	.0	.0	.0
	SOLTERO	48.3	66.0	72.6	38.3	61.0	33.3	54.1
	CASADO	29.3	17.3	7.1	36.0	21.1	33.3	27.0
	DIVORCIADO	2.9	.6	2.4	3.7	2.4	.0	3.3
	SEPARADO	9.3	6.5	9.5	10.9	7.3	.0	7.0
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.6	.8	.0	2.2	.0	.0	1.5
	UNION LIBRE	8.6	8.8	8.3	9.0	8.1	33.3	7.0
	9 AÑOS O MENOS	5.4	4.8	15.5	3.9	.8	.0	11.9
	10-14 AÑOS	43.4	54.5	66.7	37.6	26.0	33.3	54.1
	15-19 AÑOS	38.1	36.4	13.1	41.4	52.0	33.3	27.8
	20-24 AÑOS	7.7	2.3	2.4	10.0	13.0	33.3	4.1
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	3.2	.8	.0	4.4	5.7	.0	1.1
	30-34 AÑOS	1.1	1.1	1.2	1.1	1.6	.0	.7
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.0	1.2	1.5	.8	.0	.4
	DIARIO	54.2	77.4	70.2	40.4	49.6	100.0	79.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	9.8	7.1	10.7	11.1	12.2	.0	7.0
	1 VEZ POR SEMANA	23.3	9.3	10.7	31.9	25.2	.0	8.9
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	11.1	5.1	4.8	15.0	11.4	.0	4.8
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.5	1.1	3.6	1.7	1.6	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
GUERRERO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
GUERRERO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=122	n=83	n=22	n=80	n=51	n=1	n=84	
SEXO	MASCULINO	97.5	97.6	100.0	97.5	96.1	100.0	98.8	
	FEMENINO	2.5	2.4	.0	2.5	3.9	.0	1.2	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	7.5	3.7	9.1	5.1	8.0	.0	8.5	
	15 - 18 AÑOS	92.5	96.3	90.9	94.9	92.0	100.0	91.5	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	53.3	53.0	63.6	53.8	52.9	100.0	48.8	
	SECUNDARIA	39.3	39.8	27.3	37.5	39.2	.0	41.7	
	PREPA	3.3	3.6	.0	3.8	2.0	.0	4.8	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	4.1	3.6	9.1	5.0	5.9	.0	4.8	
	ESTUDIANTE	4.1	6.1	.0	5.1	2.0	.0	6.0	
	EMPLEADO	43.8	41.5	40.9	44.3	41.2	.0	47.0	
	SUBEMPLEADO	44.6	45.1	54.5	43.0	41.2	.0	41.0	
	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	7.4	7.3	4.5	7.6	15.7	100.0	6.0	
USA TATUAJES	SI	40.2	48.2	27.3	43.8	39.2	.0	36.9	
	NO	59.8	51.8	72.7	56.3	60.8	100.0	63.1	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	24.6	22.9	45.5	22.5	25.5	.0	23.8	
	NO	75.4	77.1	54.5	77.5	74.5	100.0	76.2	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	6.6	7.3	4.5	6.3	12.0	.0	6.0	
	NO	93.4	92.7	95.5	93.7	88.0	100.0	94.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	65.6	67.5	81.8	62.5	51.0	100.0	65.5	
	VIOLACION	1.6	1.2	.0	2.5	3.9	.0	1.2	
	HOMICIDIO	2.5	1.2	4.5	3.8	3.9	.0	2.4	
	LESIONES A TERCEROS	5.7	6.0	4.5	6.3	2.0	.0	6.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	4.9	6.0	.0	6.3	9.8	.0	7.1	
	SECUESTRO	1.6	2.4	.0	2.5	.0	.0	2.4	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	18.0	16.9	4.5	17.5	27.5	.0	16.7	
	CONSUMO DE DROGAS	.8	.0	.0	.0	2.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	2.5	2.4	13.6	2.5	3.9	.0	2.4	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	94.2	93.9	86.4	92.5	96.0	100.0	96.3
		HOGAR	2.5	2.4	4.5	2.5	2.0	.0	1.2
		TRABAJO	.8	1.2	.0	1.3	2.0	.0	.0
	ESCUELA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LUGAR DE RECREO	.8	1.2	.0	1.3	.0	.0	1.2	
	OTRO	1.7	1.2	9.1	2.5	.0	.0	1.2	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
GUERRERO**

		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	COCAINA	MARIJUANA	
		n=17	n=10	n=4	n=3	
SEXO	MASCULINO	94.1	90.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	5.9	10.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	5.9	10.0	.0	.0	
	20 - 24 AÑOS	29.4	20.0	50.0	100.0	
	25 - 29 AÑOS	17.6	20.0	.0	.0	
	30 - 34 AÑOS	11.8	20.0	.0	.0	
	35 - 39 AÑOS	17.6	.0	50.0	.0	
	40 AÑOS O MÁS	17.6	30.0	.0	.0	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	11.8	10.0	.0	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	23.5	.0	75.0	100.0	
	CAIDA	.0	.0	.0	.0	
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0	
	QUEMADO	.0	.0	.0	.0	
	GOLPES	5.9	10.0	.0	.0	
	ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	
	APLASTAMIENTO	11.8	20.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	11.8	10.0	.0	.0	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0	.0	.0	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	.0	.0	.0	.0	
	ENVENENADO	5.9	10.0	.0	.0	
	OTRAS	29.4	40.0	25.0	.0	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	5.9	10.0	.0	.0
		CASA	23.5	30.0	25.0	.0
		CALLE	52.9	50.0	75.0	100.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		.0	.0	.0	.0	
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	
ARES DE SERVICIO		.0	.0	.0	.0	
OTROS		17.6	10.0	.0	.0	

N= 869 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
GUERRERO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=6	n=2	n=1	n=6	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=329 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 GUERRERO**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=64	n=69	n=29	n=11	n=4	n=6	n=4	n=2	n=7	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	6.3	2.9	3.4	18.2	25.0	16.7	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	3.1	5.8	6.9	18.2	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	10.9	10.1	6.9	.0	.0	16.7	.0	.0	14.3	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	12.5	13.0	3.4	.0	.0	16.7	50.0	.0	28.6	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	1.6	1.4	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	14.3	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	3.1	4.3	3.4	9.1	25.0	33.3	.0	.0	14.3	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	7.8	8.7	.0	9.1	.0	.0	75.0	100.0	42.9	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	3.1	2.9	.0	9.1	.0	16.7	.0	.0	14.3	.0	.0
AFECCION OSTEOMUSCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.6	1.4	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	4.7	2.9	10.3	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	14.1	18.8	31.0	27.3	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=329

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
GUERRERO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=622	n=355	n=179	n=42	n=20	n=21	n=0	n=0	n=1	n=4	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	81,0	81,3	76,5	92,9	85,0	85,7	,0	,0	100,0	75,0	,0	,0
	FEMENINO	19,0	18,7	23,5	7,1	15,0	14,3	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,2	5,7	6,2	7,3	,0	19,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	28,9	27,4	31,5	29,3	26,3	33,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	20-24	20,5	20,8	17,4	22,0	42,1	19,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	25-29	15,8	16,2	16,3	12,2	10,5	9,5	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	30-34	12,0	14,0	9,0	12,2	15,8	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	16,6	16,0	19,7	17,1	5,3	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	54,0	53,2	54,7	52,4	50,0	66,7	,0	,0	,0	75,0	,0	,0
	CASADO	20,6	21,4	17,9	19,0	40,0	19,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,6	11,8	10,1	19,0	10,0	9,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,7	7,6	9,5	4,8	,0	,0	,0	,0	100,0	25,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,6	2,3	,6	,0	,0	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,5	,3	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4,0	3,4	6,1	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,8	,9	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,0	,9	1,1	,0	,0	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,4	13,5	11,8	7,1	30,0	19,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,4	40,9	38,2	50,0	45,0	52,4	,0	,0	,0	75,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,8	4,3	3,4	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	24,3	22,8	27,5	28,6	20,0	23,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	15,0	16,4	16,3	9,5	5,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,3	,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	19,0	16,5	23,7	25,0	7,1	15,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	6,3	7,8	3,5	7,5	7,1	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	29,1	30,2	24,3	40,0	57,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	17,5	19,0	14,5	12,5	21,4	25,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,6	6,5	6,9	5,0	7,1	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,6	14,6	20,8	10,0	,0	30,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,5	5,0	5,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,3	,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,0	1,2	,6	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	6,4	8,0	5,4	4,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	57,7	56,1	66,3	41,5	60,0	42,1	,0	,0	100,0	50,0	,0	,0
	BAJO	33,8	33,1	27,7	53,7	35,0	52,6	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,0	1,5	,0	,0	,0	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
GUERRERO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIJUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=622	n=52	n=139	n=80	n=269	n=22	n=15	n=2	n=5	n=10	n=16	n=1
SEXO	MASCULINO	81,1	71,2	69,6	88,8	88,5	81,8	73,3	,0	60,0	70,0	75,0	100,0
	FEMENINO	18,9	28,8	30,4	11,3	11,5	18,2	26,7	100,0	40,0	30,0	25,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,0	5,8	8,8	11,7	1,5	31,8	6,7	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	28,9	23,1	27,7	40,3	23,9	54,5	40,0	50,0	80,0	70,0	,0	,0
	20-24	20,3	5,8	19,0	19,5	26,1	,0	13,3	,0	20,0	20,0	25,0	,0
	25-29	16,0	9,6	13,1	14,3	20,9	4,5	20,0	,0	,0	,0	18,8	,0
	30-34	12,1	19,2	9,5	5,2	14,9	4,5	13,3	,0	,0	,0	18,8	,0
	35 Y MAS	16,7	36,5	21,9	9,1	12,7	4,5	6,7	50,0	,0	10,0	37,5	100,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53,8	51,9	58,3	62,5	46,5	86,4	60,0	100,0	100,0	60,0	31,3	,0
	CASADO	20,9	30,8	19,4	16,3	23,4	4,5	20,0	,0	,0	10,0	25,0	,0
	U. LIBRE	11,6	7,7	6,5	8,8	16,4	4,5	6,7	,0	,0	10,0	25,0	,0
	SEPARADO	7,7	5,8	11,5	3,8	8,6	,0	,0	,0	,0	10,0	,0	100,0
	DIVORCIADO	1,5	1,9	,0	1,3	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	12,5	,0
	VIUDO	,5	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	6,3	,0
	NO ESPECIFICA	3,9	1,9	2,9	7,5	3,3	4,5	13,3	,0	,0	10,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,8	1,9	1,5	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,0	3,8	1,5	,0	,4	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,6	11,5	11,0	13,9	14,0	22,7	,0	,0	,0	20,0	31,3	100,0
	SECUNDARIA	40,6	38,5	30,1	48,1	44,5	59,1	40,0	,0	40,0	30,0	25,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,8	9,6	5,1	1,3	2,3	4,5	6,7	,0	20,0	10,0	,0	,0
	BACHILLERATO	24,5	15,4	26,5	29,1	24,5	9,1	33,3	100,0	,0	40,0	18,8	,0
	LICENCIATURA	15,3	19,2	24,3	7,6	12,8	,0	20,0	,0	40,0	,0	25,0	,0
	POSGRADO	,3	,0	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCCUPACION	ESTUDIANTE	18,7	30,2	22,6	20,5	11,2	36,8	8,3	50,0	60,0	60,0	6,7	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	6,4	7,0	6,8	15,1	4,0	5,3	,0	,0	20,0	10,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	29,2	25,6	23,3	21,9	37,8	21,1	,0	,0	,0	,0	46,7	100,0
	LABORAL INESTABLE	17,6	11,6	17,3	21,9	17,7	15,8	33,3	,0	,0	,0	26,7	,0
	DESEMPLEADO	6,8	,0	6,8	9,6	7,2	,0	16,7	,0	,0	10,0	6,7	,0
	DESOCUPADO	16,5	7,0	15,8	11,0	19,7	21,1	33,3	50,0	,0	20,0	6,7	,0
	HOGAR	4,4	14,0	7,5	,0	2,4	,0	8,3	,0	20,0	,0	6,7	,0
	PENSIONADO	,4	4,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,1	,0	1,6	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	12,5	,0
	MEDIO ALTO	6,3	16,0	8,9	5,4	3,2	,0	7,1	,0	20,0	,0	18,8	,0
	MEDIO BAJO	58,3	68,0	60,5	56,8	60,6	38,1	50,0	100,0	40,0	40,0	25,0	100,0
	BAJO	33,3	16,0	29,0	35,1	34,3	57,1	42,9	,0	40,0	60,0	43,8	,0
	POBREZA EXTREMA	1,1	,0	,0	2,7	1,2	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	57,3	78,8	54,7	58,8	53,9	68,2	46,7	50,0	60,0	50,0	62,5	,0
	ALCOHOL	28,8	15,4	38,1	23,8	28,6	9,1	46,7	50,0	40,0	40,0	12,5	100,0
	MARIJUANA	6,7	3,8	2,9	13,8	7,8	,0	6,7	,0	,0	,0	12,5	,0
	COCAÍNA	3,3	1,9	1,4	1,3	5,6	,0	,0	,0	,0	,0	6,3	,0
	INHALABLES	3,3	,0	2,2	1,3	3,7	22,7	,0	,0	,0	,0	6,3	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,2	,0	,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,5	,0	,7	,0	,4	,0	,0	,0	,0	10,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



HIDALGO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
HIDALGO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1696	n=88	n=985	n=116	n=12	n=463	n=8	n=7	n=8	n=4
SEXO	MASCULINO	90.3	88.6	90.7	87.9	66.7	92.7	87.5	85.7	25.0	100.0
	FEMENINO	9.7	11.4	9.3	12.1	33.3	7.3	12.5	14.3	75.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.3	2.3	1.2	17.2	.0	.6	.0	14.3	.0	.0
	15-19 AÑOS	12.7	39.8	6.9	32.8	.0	14.9	.0	14.3	37.5	50.0
	20-24 AÑOS	16.3	28.4	10.7	28.4	33.3	22.2	25.0	14.3	.0	50.0
	25-29 AÑOS	12.4	15.9	8.6	12.1	16.7	19.4	12.5	42.9	25.0	.0
	30-34 AÑOS	12.6	6.8	11.4	3.4	8.3	19.0	12.5	14.3	12.5	.0
	35 AÑOS O MAS	43.6	6.8	61.2	6.0	41.7	23.8	50.0	.0	25.0	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.1	2.3	14.6	4.3	16.7	.4	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	29.0	11.4	36.8	42.6	25.0	13.2	.0	42.9	25.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	4.5	1.2	.0	8.3	.2	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	29.9	46.6	22.7	33.9	16.7	40.0	50.0	42.9	50.0	50.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.2	1.1	.9	1.7	16.7	1.1	.0	.0	12.5	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	19.8	25.0	14.7	14.8	8.3	31.7	12.5	.0	12.5	25.0
	LICENCIATURA	9.6	9.1	8.6	2.6	8.3	13.2	37.5	14.3	.0	25.0
	POSGRADO	.4	.0	.5	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	23.1	3.4	31.6	4.3	8.3	14.9	.0	14.3	12.5	.0
	SOLTERO	45.4	83.0	33.4	82.8	66.7	53.1	62.5	42.9	37.5	100.0
	DIVORCIADO	4.2	3.4	4.2	.9	8.3	4.8	12.5	14.3	12.5	.0
	SEPARADO	11.3	2.3	12.8	4.3	8.3	11.4	25.0	.0	25.0	.0
	VIUDO	2.0	.0	2.6	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	14.0	8.0	15.3	7.8	8.3	14.3	.0	28.6	12.5	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	5.1	10.2	4.0	7.8	8.3	5.7	.0	14.3	.0	.0
	DESEMPLEADO	24.7	23.9	18.2	27.0	8.3	38.6	62.5	.0	.0	25.0
	DESOCUPADO	10.2	20.5	6.8	27.8	25.0	9.4	12.5	42.9	37.5	25.0
	TRABAJO FIJO	31.8	19.3	38.6	8.7	25.0	27.0	.0	14.3	25.0	25.0
	TRABAJO OCASIONAL	25.1	23.9	28.1	27.8	33.3	18.4	25.0	28.6	25.0	25.0
	AMA DE CASA	2.6	2.3	3.6	.0	.0	.9	.0	.0	12.5	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.6	.0	.8	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	44.6	47.7	35.9	45.7	25.0	61.8	62.5	85.7	25.0	75.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	52.7	50.0	60.9	50.9	66.7	36.7	25.0	14.3	75.0	25.0
	POR INDICACION LEGAL	1.7	2.3	2.1	1.7	8.3	.6	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.2	.0	.0	.2	12.5	.0	.0	.0
	OTROS	.8	.0	.8	1.7	.0	.6	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
HIDALGO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1696	n=88	n=985	n=116	n=12	n=5	n=463	n=8	n=7	n=8	n=4
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	64.4	77.3	55.9	80.2	83.3	80.0	75.2	87.5	57.1	75.0	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	12.9	11.4	12.4	11.2	.0	.0	15.1	12.5	.0	25.0	25.0
	1 VEZ POR SEMANA	13.4	1.1	18.7	7.8	8.3	.0	6.5	.0	28.6	.0	25.0
	1 A 3 VECES POR MES	7.1	9.1	9.8	.0	8.3	20.0	2.6	.0	14.3	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.1	1.1	3.1	.9	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	8.7	12.5	8.7	12.9	8.3	20.0	6.3	25.0	14.3	.0	25.0
	10-14 AÑOS	42.1	56.8	34.7	63.8	50.0	40.0	47.9	75.0	85.7	50.0	50.0
	15-19 AÑOS	36.3	27.3	38.2	21.6	33.3	.0	39.3	.0	.0	37.5	25.0
	20-24 AÑOS	7.5	2.3	10.2	1.7	8.3	20.0	4.8	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	2.1	.0	3.0	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	12.5	.0
	30-34 AÑOS	1.3	.0	1.8	.0	.0	20.0	.6	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	2.0	1.1	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	74.9	45.5	88.7	35.3	25.0	20.0	63.7	62.5	57.1	75.0	50.0
	MARIGUANA	7.9	37.5	1.8	9.5	.0	.0	14.7	.0	28.6	.0	50.0
	INHALABLES	6.2	9.1	1.4	43.1	.0	.0	6.7	12.5	14.3	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.1	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	2.2	.0	.4	.9	.0	20.0	6.5	12.5	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.2	.0	.0	.0	.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	7.5	6.8	7.4	11.2	75.0	.0	5.6	.0	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0
	OTROS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.6	.0	.2	.0	.0	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
HIDALGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1689	n=134	n=105	n=1271	n=51	n=1	n=127
SEXO	MASCULINO	90.6	90.3	91.4	91.0	92.2	.0	85.8
	FEMENINO	9.4	9.7	8.6	9.0	7.8	100.0	14.2
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.3	3.0	10.5	1.4	2.0	.0	3.9
	15-19 AÑOS	12.7	26.1	24.8	9.0	25.5	.0	20.5
	20-24 AÑOS	16.3	22.4	25.7	14.2	29.4	.0	17.3
	25-29 AÑOS	12.4	14.2	13.3	11.8	17.6	.0	14.2
	30-34 AÑOS	12.7	11.9	12.4	12.0	13.7	.0	19.7
	35 AÑOS O MAS	43.6	22.4	13.3	51.5	11.8	100.0	24.4
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.1	1.5	2.9	11.1	2.0	.0	5.5
	PRIMARIA	29.0	21.6	45.2	29.5	17.6	.0	22.8
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	2.2	1.0	.6	.0	.0	4.7
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	30.0	46.3	36.5	25.9	47.1	.0	41.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	2.2	.0	1.2	.0	.0	.8
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	19.7	22.4	10.6	20.1	25.5	.0	18.1
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	9.6	3.7	3.8	11.1	7.8	100.0	5.5
	POSGRADO	.4	.0	.0	.4	.0	.0	.8
	SOLTERO	45.4	60.4	67.6	39.6	51.0	100.0	66.9
	CASADO	23.1	10.4	8.6	27.2	13.7	.0	11.8
	DIVORCIADO	4.3	3.7	1.9	4.9	.0	.0	2.4
	SEPARADO	11.3	10.4	11.4	10.9	11.8	.0	15.0
EDAD DE INICIO	VIUDO	2.0	3.0	.0	2.2	2.0	.0	.0
	UNION LIBRE	14.0	11.9	10.5	15.2	21.6	.0	3.9
	9 AÑOS O MENOS	8.7	2.2	17.1	8.5	.0	.0	14.2
	10-14 AÑOS	42.0	42.5	61.0	39.7	27.5	100.0	55.1
	15-19 AÑOS	36.4	51.5	20.0	36.8	41.2	.0	28.3
	20-24 AÑOS	7.5	3.0	1.9	8.6	21.6	.0	.8
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.1	.0	.0	2.3	7.8	.0	1.6
	30-34 AÑOS	1.2	.0	.0	1.6	2.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	2.0	.7	.0	2.6	.0	.0	.0
	DIARIO	48.6	47.0	69.5	43.3	58.8	100.0	81.9
	2 - 3 VECES POR SEMANA	14.6	23.9	12.4	14.3	21.6	.0	6.3
	1 VEZ POR SEMANA	20.8	10.4	11.4	24.5	15.7	.0	4.7
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	13.5	14.2	5.7	15.2	3.9	.0	6.3
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.5	4.5	1.0	2.8	.0	.0	.8

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
HIDALGO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
HIDALGO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=115	n=12	n=11	n=61	n=7	n=44	
SEXO	MASCULINO	91.3	100.0	100.0	96.7	100.0	97.7	
	FEMENINO	8.7	.0	.0	3.3	.0	2.3	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	15.8	.0	9.1	5.0	.0	11.6	
	15 - 18 AÑOS	84.2	100.0	90.9	95.0	100.0	88.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	34.8	33.3	63.6	37.7	28.6	36.4	
	SECUNDARIA	52.2	58.3	27.3	50.8	57.1	52.3	
	PREPA	11.3	8.3	9.1	9.8	14.3	9.1	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	1.7	.0	.0	1.6	.0	2.3	
	ESTUDIANTE	38.3	8.3	18.2	32.8	14.3	29.5	
	EMPLEADO	42.6	50.0	63.6	42.6	42.9	45.5	
	SUBEMPLEADO	8.7	.0	.0	8.2	.0	9.1	
HOGAR	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	10.4	41.7	18.2	16.4	42.9	15.9	
USA TATUAJES	SI	16.5	33.3	72.7	24.6	28.6	27.3	
	NO	83.5	66.7	27.3	75.4	71.4	72.7	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	7.0	33.3	36.4	6.6	28.6	9.1	
	NO	93.0	66.7	63.6	93.4	71.4	90.9	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	20.0	41.7	45.5	31.1	42.9	25.0	
	NO	80.0	58.3	54.5	68.9	57.1	75.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	31.3	41.7	54.5	34.4	42.9	38.6	
	VIOLACION	13.0	.0	.0	11.5	.0	6.8	
	HOMICIDIO	10.4	8.3	18.2	11.5	.0	6.8	
	LESIONES A TERCEROS	21.7	33.3	27.3	19.7	28.6	20.5	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	4.3	.0	9.1	6.6	.0	9.1	
	SECUESTRO	.9	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	6.1	16.7	.0	4.9	14.3	9.1	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	2.6	.0	.0	1.6	.0	.0	
	OTROS	12.2	16.7	9.1	13.1	28.6	13.6	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	63.5	66.7	72.7	65.6	57.1	70.5
		HOGAR	27.0	33.3	27.3	24.6	42.9	18.2
		TRABAJO	2.6	.0	.0	3.3	.0	4.5
ESCUELA		1.7	.0	.0	.0	.0	.0	
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		2.6	.0	.0	3.3	.0	2.3	
OTRO	2.6	.0	.0	3.3	.0	4.5		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 HIDALGO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=84	n=10	n=4	n=2	n=0	n=2	n=0	n=0	n=2	n=1
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	21.6	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	9.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	13.7	10.0	33.3	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	20.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	100.0	.0
CONTUSIONES	41.2	60.0	33.3	50.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	3.9	.0	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=2449 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
HIDALGO**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=483	n=659	n=247	n=65	n=28	n=28	n=24	n=13	n=16	n=4	n=3
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	4.1	3.6	6.1	9.2	7.1	3.6	4.2	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.4	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.4	.3	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	9.1	10.3	18.6	16.9	7.1	3.6	8.3	.0	6.3	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.8	.5	3.2	6.2	.0	3.6	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.6	1.6	4.6	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	6.0	6.5	5.3	12.3	7.1	.0	8.3	7.7	.0	.0	33.3
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	3.3	3.8	2.8	3.1	.0	.0	.0	7.7	6.3	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	5.6	6.2	7.7	6.2	3.6	3.6	4.2	.0	12.5	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	6.2	6.2	2.0	6.2	14.3	17.9	45.8	30.8	37.5	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	3.9	2.9	8.9	1.5	.0	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	12.6	10.8	10.5	7.7	.0	10.7	.0	7.7	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	2.5	2.6	2.4	3.1	3.6	3.6	4.2	7.7	6.3	25.0	33.3
DIABETES MELLITUS	5.0	4.7	15.8	15.4	14.3	3.6	4.2	7.7	.0	25.0	.0
SIDA	.0	.2	.4	1.5	3.6	.0	.0	.0	6.3	.0	.0
OTRAS	20.3	23.5	29.6	24.6	25.0	17.9	.0	.0	.0	25.0	.0
NINGUNA	23.6	20.6	12.1	7.7	17.9	25.0	25.0	38.5	25.0	25.0	33.3

N=2449

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
HIDALGO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=281	n=168	n=98	n=7	n=0	n=8	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	84,0	85,1	83,7	71,4	,0	75,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	16,0	14,9	16,3	28,6	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	9,3	4,8	14,3	14,3	,0	37,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	37,7	38,7	34,7	42,9	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	16,4	14,9	20,4	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	11,0	13,7	7,1	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	5,7	6,0	4,1	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	19,9	22,0	19,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	61,9	58,3	66,3	57,1	,0	87,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	17,1	20,2	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,0	11,9	9,2	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	6,8	8,3	4,1	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,4	,6	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	1,8	,6	3,1	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,7	12,5	9,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	37,9	36,3	37,1	42,9	,0	75,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,0	6,0	4,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	32,1	31,0	34,0	42,9	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	13,2	13,7	13,4	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,1	,6	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	29,4	23,4	38,1	28,6	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,9	3,6	5,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	33,0	35,9	30,9	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	18,3	20,4	13,4	57,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	3,2	4,8	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,7	9,6	8,2	14,3	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	2,5	2,4	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,1	,0	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	16,0	16,1	15,3	28,6	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	43,8	40,5	55,1	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	36,3	40,5	23,5	57,1	,0	87,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	2,8	3,0	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
HIDALGO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=281	n=77	n=55	n=38	n=43	n=56	n=2	n=0	n=2	n=1	n=0	n=2
SEXO	MASCULINO	83,7	81,8	81,8	89,5	86,0	87,5	,0	,0	50,0	,0	,0	100,0
	FEMENINO	16,3	18,2	18,2	10,5	14,0	12,5	100,0	,0	50,0	100,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	8,7	3,9	3,6	2,6	,0	32,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	38,0	23,4	36,4	71,1	20,9	48,2	50,0	,0	100,0	,0	,0	50,0
	20-24	16,7	7,8	23,6	23,7	27,9	8,9	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	10,9	7,8	10,9	2,6	27,9	8,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	5,8	6,5	7,3	,0	14,0	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	19,9	50,6	18,2	,0	9,3	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	50,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	61,2	37,7	70,9	89,5	39,5	80,4	100,0	,0	100,0	,0	,0	50,0
	CASADO	17,4	36,4	12,7	10,5	16,3	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	50,0
	U. LIBRE	11,2	11,7	10,9	,0	25,6	8,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	6,9	7,8	3,6	,0	16,3	5,4	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,4	3,9	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,8	2,6	,0	,0	2,3	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,5	13,0	11,1	,0	18,6	8,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	37,8	26,0	24,1	42,1	41,9	64,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,1	5,2	3,7	7,9	2,3	5,4	,0	,0	,0	,0	,0	50,0
	BACHILLERATO	32,0	32,5	37,0	44,7	27,9	19,6	100,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	13,5	19,5	24,1	5,3	9,3	1,8	,0	,0	,0	100,0	,0	50,0
OCUPACION	POSGRADO	1,1	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	28,8	15,6	36,4	42,1	7,3	42,9	100,0	,0	50,0	,0	,0	50,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,0	5,2	1,8	5,3	4,9	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	33,2	57,1	32,7	15,8	34,1	14,3	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	18,2	10,4	10,9	21,1	34,1	21,4	,0	,0	50,0	,0	,0	50,0
	DESEMPLEADO	3,3	1,3	3,6	2,6	9,8	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,9	6,5	12,7	13,2	4,9	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	2,6	3,9	1,8	,0	4,9	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,1	2,6	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	16,3	23,4	18,2	13,2	18,6	5,4	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	43,5	44,2	49,1	36,8	32,6	48,2	50,0	,0	50,0	100,0	,0	50,0
	BAJO	36,2	24,7	29,1	47,4	48,8	42,9	,0	,0	50,0	,0	,0	50,0
	POBREZA EXTREMA	2,9	5,2	1,8	2,6	,0	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	59,8	66,2	47,3	65,8	72,1	48,2	,0	,0	100,0	100,0	,0	100,0
	ALCOHOL	34,8	32,5	49,1	31,6	20,9	37,5	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MARIGUANA	2,5	,0	3,6	,0	7,0	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	2,9	1,3	,0	2,6	,0	10,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



JALISCO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
JALISCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=4697	n=728	n=1009	n=232	n=223	n=106	n=2049	n=27	n=295	n=21	n=7
SEXO	MASCULINO	93.7	96.2	90.1	94.4	85.7	87.7	95.9	100.0	92.2	90.5	100.0
	FEMENINO	6.3	3.8	9.9	5.6	14.3	12.3	4.1	.0	7.8	9.5	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.9	1.1	.9	3.0	1.3	.0	.6	.0	1.4	.0	.0
	15-19 AÑOS	13.5	24.0	7.0	25.0	17.5	10.4	11.3	.0	15.3	14.3	14.3
	20-24 AÑOS	21.8	29.3	11.7	26.7	18.8	12.3	23.7	14.8	27.5	23.8	14.3
	25-29 AÑOS	18.9	15.9	14.1	25.0	12.1	19.8	21.4	18.5	25.4	9.5	57.1
	30-34 AÑOS	13.7	10.9	14.1	6.0	13.5	14.2	15.3	29.6	14.2	9.5	.0
	35 AÑOS O MAS	31.1	18.8	52.2	14.2	36.8	43.4	27.8	37.0	16.3	42.9	14.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.9	4.0	5.2	5.6	5.4	1.9	3.4	11.1	1.0	4.8	.0
	PRIMARIA	37.7	38.9	35.2	51.7	41.3	42.5	37.1	44.4	33.2	23.8	14.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	.7	.5	.9	.9	.4	.9	.4	.0	1.7	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	35.2	37.9	29.9	35.3	33.6	26.4	37.0	25.9	39.0	38.1	42.9
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.5	.8	2.2	.4	2.2	3.8	1.5	.0	1.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.3	14.4	15.7	5.2	11.7	15.1	16.2	14.8	20.0	19.0	28.6
	LICENCIATURA	5.2	3.0	9.6	.9	5.4	8.5	4.2	3.7	3.7	9.5	14.3
	POSGRADO	.6	.4	1.4	.0	.0	.9	.3	.0	.3	4.8	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	26.8	18.5	39.6	6.9	26.9	26.4	26.2	18.5	25.1	28.6	.0
	SOLTERO	48.1	58.4	35.1	73.7	47.1	40.6	47.4	44.4	56.3	38.1	71.4
	DIVORCIADO	2.9	1.5	4.0	.0	4.5	3.8	3.0	3.7	2.0	.0	.0
	SEPARADO	6.9	3.6	8.0	4.3	4.9	12.3	8.2	14.8	4.1	4.8	.0
	VIUDO	1.2	1.0	2.9	.4	2.2	.9	.4	3.7	.7	4.8	.0
	UNION LIBRE	14.1	17.0	10.4	14.7	14.3	16.0	14.8	14.8	11.9	23.8	28.6
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	3.4	5.1	4.4	2.6	3.6	3.8	2.4	.0	3.8	.0	28.6
	DESEMPLEADO	17.7	12.0	16.7	12.5	13.5	17.0	20.0	22.2	25.3	19.0	14.3
	DESOCUPADO	10.8	8.5	9.6	11.2	11.2	14.2	11.5	11.1	13.3	19.0	.0
	TRABAJO FIJO	41.1	48.5	40.9	31.9	42.2	40.6	40.5	40.7	35.2	47.6	14.3
	TRABAJO OCASIONAL	24.2	24.8	22.1	40.9	22.0	19.8	24.3	25.9	19.5	14.3	42.9
	AMA DE CASA	2.4	1.1	5.0	.4	7.6	4.7	1.1	.0	2.7	.0	.0
	JUBILADO	.4	.0	1.3	.4	.0	.0	.2	.0	.3	.0	.0
	VOLUNTARIO	43.1	25.5	43.6	28.4	46.6	41.5	48.7	63.0	52.5	52.4	71.4
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	20.4	15.0	28.6	14.7	14.8	23.6	18.9	7.4	25.4	9.5	14.3
	POR INDICACION LEGAL	35.0	58.9	24.9	55.2	35.9	33.0	31.5	29.6	20.0	33.3	14.3
	POR INDICACION MEDICA	1.0	.5	2.2	.9	.4	1.9	.5	.0	2.0	4.8	.0
	OTROS	.5	.0	.7	.9	2.2	.0	.4	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
JALISCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=4697	n=728	n=1009	n=232	n=223	n=106	n=2049	n=27	n=295	n=21	n=
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	63.1	83.4	53.1	56.5	88.8	59.4	59.0	59.3	63.7	61.9	42.9
	2 - 3 VECES POR SEMANA	9.6	7.4	9.4	10.3	3.6	4.7	11.1	11.1	10.5	4.8	14.3
	1 VEZ POR SEMANA	18.5	4.7	25.7	23.3	4.5	16.0	21.3	14.8	16.3	23.8	14.3
	1 A 3 VECES POR MES	6.0	2.6	8.7	6.5	2.2	11.3	6.0	7.4	5.8	4.8	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.9	1.9	3.1	3.4	.9	8.5	2.6	7.4	3.7	4.8	28.6
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	6.2	7.8	3.4	9.5	5.4	3.8	7.0	18.5	4.4	4.8	14.3
	10-14 AÑOS	39.5	41.1	31.5	50.4	41.4	40.0	39.9	66.7	48.1	23.8	14.3
	15-19 AÑOS	41.7	42.6	48.2	35.8	43.2	40.0	39.7	11.1	35.2	61.9	71.4
	20-24 AÑOS	7.4	5.0	9.5	3.4	6.3	10.5	7.5	3.7	8.9	4.8	.0
	25-29 AÑOS	2.7	2.1	3.7	.4	2.3	2.9	2.8	.0	2.4	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.3	.7	1.8	.0	.5	2.9	1.5	.0	.3	4.8	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.3	.7	2.0	.4	.9	.0	1.4	.0	.7	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	32.2	20.1	68.4	16.8	15.2	34.0	22.7	14.8	31.2	19.0	42.9
	MARIGUANA	22.4	47.5	7.8	16.8	9.0	32.1	22.4	40.7	19.7	23.8	28.6
	INHALABLES	6.5	5.9	1.2	36.2	.9	5.7	7.0	3.7	3.4	9.5	.0
	ALUCINOGENOS	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.7	.0	14.3
	HEROINA	.1	.3	.0	.0	.0	.0	.0	7.4	.0	4.8	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.8	.0
	COCAINA	8.4	1.6	2.4	.9	1.3	2.8	15.5	.0	10.8	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.9	.7	.4	.4	.0	15.1	.6	.0	1.0	.0	14.3
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	9.5	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	24.3	22.5	18.8	28.4	73.1	10.4	22.9	33.3	21.4	23.8	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	1.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	.3	4.8
	CRISTAL	.9	.4	.1	.4	.4	.0	.2	.0	10.5	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	3.0	.1	.7	.0	.0	.0	.0	6.2	.0	1.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
JALISCO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=4599	n=1052	n=304	n=1514	n=582	n=6	n=1141
SEXO	MASCULINO	93.8	96.9	92.4	91.4	92.8	100.0	94.8
	FEMENINO	6.2	3.1	7.6	8.6	7.2	.0	5.2
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.9	1.1	1.6	.8	.7	.0	.8
	15-19 AÑOS	13.5	16.2	15.8	9.4	9.6	.0	17.7
	20-24 AÑOS	21.9	22.7	24.3	16.1	28.7	16.7	24.7
	25-29 AÑOS	19.0	20.6	21.7	16.3	21.1	.0	19.2
	30-34 AÑOS	13.7	13.8	13.5	13.6	16.8	16.7	12.3
	35 AÑOS O MAS	31.1	25.6	23.0	43.7	23.0	66.7	25.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.0	3.8	5.9	4.1	4.0	.0	3.6
	PRIMARIA	37.9	41.1	54.6	31.2	34.0	16.7	41.5
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.6	1.0	.9	.2	.0	.4
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	35.1	39.5	30.6	30.5	38.7	33.3	36.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.5	.7	.7	2.4	.7	.0	1.6
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.1	12.5	7.2	19.1	17.9	33.3	12.9
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	5.2	1.7	.0	10.6	3.8	16.7	3.2
	POSGRADO	.6	.2	.0	1.2	.9	.0	.1
	SOLTERO	48.0	52.9	61.5	39.7	49.8	33.3	49.9
	CASADO	26.8	20.8	12.5	35.9	28.0	16.7	23.7
	DIVORCIADO	2.8	2.0	1.6	3.7	3.6	16.7	2.4
	SEPARADO	6.9	7.0	6.6	7.6	7.4	.0	5.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.2	.6	.7	2.1	.5	16.7	1.1
	UNION LIBRE	14.2	16.6	17.1	11.0	10.7	16.7	17.4
	9 AÑOS O MENOS	6.2	7.0	12.8	3.4	.9	.0	10.3
	10-14 AÑOS	39.6	44.3	55.6	34.1	19.6	16.7	48.6
	15-19 AÑOS	41.8	39.6	29.9	49.3	43.1	50.0	36.4
	20-24 AÑOS	7.3	5.5	1.3	8.3	18.0	33.3	3.4
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.7	2.2	.3	2.6	9.1	.0	.5
	30-34 AÑOS	1.2	.9	.0	.9	5.0	.0	.2
	35 AÑOS Y MAS	1.2	.5	.0	1.3	4.3	.0	.6
	DIARIO	68.8	81.1	65.9	47.8	62.9	50.0	89.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.4	6.1	8.7	12.4	10.0	16.7	4.2
	1 VEZ POR SEMANA	14.9	6.9	16.1	26.6	19.3	.0	4.0
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	5.3	3.6	3.7	9.5	5.7	16.7	1.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.7	2.3	5.7	3.6	2.1	16.7	1.3

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
JALISCO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
 JALISCO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	CRISTAL	
		n=485	n=229	n=93	n=72	n=113	n=61	n=45	
SEXO	MASCULINO	94.8	97.4	96.8	100.0	96.5	100.0	95.6	
	FEMENINO	5.2	2.6	3.2	.0	3.5	.0	4.4	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	12.2	9.6	14.0	6.9	7.1	6.6	8.9	
	15 - 18 AÑOS	87.8	90.4	86.0	93.1	92.9	93.4	91.1	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	53.2	57.6	59.1	44.4	53.1	50.8	53.3	
	SECUNDARIA	35.7	32.3	31.2	44.4	35.4	41.0	44.4	
	PREPA	5.4	4.4	3.2	4.2	6.2	4.9	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	5.8	5.7	6.5	6.9	5.3	3.3	2.2	
	ESTUDIANTE	9.7	5.2	10.8	4.2	7.1	3.3	6.7	
	EMPLEADO	33.0	37.6	39.8	43.1	31.0	39.3	26.7	
	SUBEMPLEADO	34.8	36.2	29.0	40.3	38.9	44.3	51.1	
HOGAR	HOGAR	3.5	.4	2.2	.0	2.7	.0	.0	
	NINGUNA	19.0	20.5	18.3	12.5	20.4	13.1	15.6	
USA TATUAJES	SI	25.6	32.8	33.3	15.3	33.6	19.7	42.2	
	NO	74.4	67.2	66.7	84.7	66.4	80.3	57.8	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	17.1	27.1	32.3	8.3	25.7	9.8	15.6	
	NO	82.9	72.9	67.7	91.7	74.3	90.2	84.4	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	16.3	21.9	30.1	20.8	28.6	21.3	40.0	
	NO	83.7	78.1	69.9	79.2	71.4	78.7	60.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	82.7	82.5	82.8	86.1	85.0	83.6	93.3	
	VIOLACION	4.5	2.2	2.2	1.4	1.8	1.6	.0	
	HOMICIDIO	3.3	3.9	4.3	1.4	2.7	1.6	.0	
	LESIONES A TERCEROS	2.5	2.6	3.2	4.2	.0	3.3	2.2	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.8	1.7	.0	1.4	.9	1.6	4.4	
	SECUESTRO	1.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.5	5.2	7.5	4.2	7.1	6.6	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.8	.9	.0	1.4	1.8	1.6	.0	
	PORTACION DE ARMA	.6	.4	2.2	1.4	.9	1.6	.0	
	OTROS	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	68.5	71.2	73.1	68.1	69.9	68.9	57.8
		HOGAR	15.3	11.4	12.9	5.6	15.9	6.6	13.3
		TRABAJO	.4	.9	.0	.0	.0	1.6	2.2
ESCUELA		.6	.9	.0	.0	.9	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.9	1.3	4.3	1.4	.0	1.6	2.2	
OTRO	13.4	14.4	9.7	25.0	13.3	21.3	24.4		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
JALISCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIJUANA	OPIOIDES
		n=719	n=653	n=29	n=50	n=23	n=1
SEXO	MASCULINO	89.3	89.9	65.5	91.8	91.3	100.0
	FEMENINO	10.7	10.1	34.5	8.2	8.7	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.7	.8	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.6	.6	.0	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	5.1	4.7	13.8	10.0	8.7	.0
	20 - 24 AÑOS	14.0	14.1	10.3	16.0	8.7	.0
	25 - 29 AÑOS	19.5	19.3	17.2	18.0	8.7	100.0
	30 - 34 AÑOS	15.2	14.7	10.3	20.0	21.7	.0
	35 - 39 AÑOS	13.2	13.2	10.3	14.0	30.4	.0
CAUSA DE MUERTE	40 AÑOS O MÁS	31.7	32.6	37.9	22.0	21.7	.0
	ATROPELLADO	13.8	14.4	.0	6.0	4.3	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	27.3	28.9	20.7	4.0	4.3	.0
	CAIDA	4.7	4.7	6.9	6.0	8.7	.0
	ELECTROCUTADO	.6	.6	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	.8	.6	3.4	2.0	.0	.0
	GOLPES	3.3	3.2	.0	6.0	4.3	.0
	ASFIXIA	17.1	17.5	6.9	24.0	30.4	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	13.9	14.2	13.8	14.0	21.7	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	3.8	3.2	10.3	14.0	4.3	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	2.6	1.7	20.7	2.0	.0	100.0
	ENVENENADO	.1	.2	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	12.0	10.7	17.2	22.0	21.7	.0
	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	40.8	43.0	20.7	10.0	8.7	.0
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	CASA	38.1	36.3	55.2	54.0	60.9
CALLE		17.5	17.0	24.1	32.0	26.1	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0	.0
AREAS RECREATIVAS		2.4	2.5	.0	2.0	4.3	.0
TRABAJO		1.3	1.2	.0	2.0	.0	.0
ARES DE SERVICIO		.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

N=2911 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 JALISCO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=51	n=25	n=9	n=20	n=3	n=6	n=0	n=2	n=0	n=1
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	10.5	14.3	.0	9.1	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	5.3	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	26.3	21.4	.0	9.1	.0	20.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	5.3	14.3	.0	36.4	.0	60.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	34.2	14.3	83.3	18.2	.0	20.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	5.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	13.2	28.6	16.7	27.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	100.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=1304 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 JALISCO**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=345	n=377	n=79	n=30	n=20	n=8	n=57	n=21	n=56	n=0	n=1
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	1.4	1.3	2.5	3.3	.0	.0	1.8	.0	3.6	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.9	.5	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0
HIPERTENSION	3.2	4.5	7.6	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	1.3	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	1.4	.8	3.8	6.7	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	4.9	4.8	5.1	6.7	10.0	.0	5.3	.0	5.4	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	1.4	1.3	3.8	3.3	.0	.0	1.8	.0	1.8	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	1.7	1.9	.0	10.0	5.0	.0	7.0	14.3	3.6	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.3	.8	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	4.3	4.0	7.6	6.7	.0	.0	1.8	4.8	1.8	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.4	1.6	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	1.7	2.7	2.5	10.0	.0	.0	1.8	.0	3.6	.0	.0
SIDA	.3	.3	.0	.0	.0	.0	1.8	4.8	.0	.0	.0
OTRAS	13.0	11.9	19.0	13.3	20.0	12.5	15.8	23.8	12.5	.0	100.0
NINGUNA	50.1	50.9	43.0	50.0	60.0	75.0	57.9	42.9	53.6	.0	.0

N=1304

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
JALISCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=2069	n=1175	n=587	n=166	n=41	n=69	n=10	n=0	n=1	n=12	n=4	n=2
SEXO	MASCULINO	81,0	80,2	79,4	92,2	85,4	87,0	70,0	,0	100,0	41,7	100,0	100,0
	FEMENINO	19,0	19,8	20,6	7,8	14,6	13,0	30,0	,0	,0	58,3	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,0	6,1	5,5	4,8	2,4	13,0	12,5	,0	,0	8,3	,0	,0
	15-19	18,6	17,5	20,0	21,7	9,8	24,6	12,5	,0	100,0	16,7	,0	,0
	20-24	17,8	18,7	15,9	16,3	26,8	14,5	25,0	,0	,0	,0	50,0	50,0
	25-29	16,7	16,7	15,9	16,9	26,8	20,3	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	12,4	11,3	13,2	15,1	17,1	10,1	,0	,0	,0	50,0	,0	50,0
	35 Y MAS	28,4	29,5	29,5	25,3	17,1	17,4	25,0	,0	,0	25,0	50,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	47,4	46,6	46,7	50,6	46,3	62,3	50,0	,0	100,0	25,0	25,0	100,0
	CASADO	27,3	27,9	28,3	24,7	29,3	10,1	20,0	,0	,0	58,3	25,0	,0
	U. LIBRE	13,2	12,5	13,8	15,1	12,2	14,5	20,0	,0	,0	8,3	25,0	,0
	SEPARADO	7,0	7,1	6,5	6,6	12,2	8,7	10,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,9	2,6	1,0	,0	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	,9	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,4	2,3	2,4	3,0	,0	1,4	,0	,0	,0	8,3	25,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,9	1,0	,7	1,2	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,5	1,4	1,9	,6	,0	1,5	,0	,0	,0	8,3	,0	,0
	PRIMARIA	25,2	25,3	20,5	30,5	31,7	41,2	40,0	,0	,0	25,0	50,0	50,0
	SECUNDARIA	40,1	39,8	40,0	43,9	41,5	36,8	20,0	,0	100,0	50,0	50,0	50,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,2	3,4	3,1	3,7	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	19,1	18,6	21,8	17,1	14,6	13,2	30,0	,0	,0	8,3	,0	,0
	LICENCIATURA	9,4	10,0	10,9	3,0	9,8	2,9	10,0	,0	,0	8,3	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,6	,5	1,0	,0	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	9,7	8,9	12,2	5,2	7,5	14,9	20,0	,0	,0	9,1	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,0	2,9	3,0	1,9	2,5	7,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	35,5	33,4	39,2	36,1	37,5	37,3	40,0	,0	100,0	36,4	25,0	,0
	LABORAL INESTABLE	17,7	18,5	16,5	21,3	10,0	10,4	10,0	,0	,0	18,2	,0	100,0
	DESEMPLEADO	11,3	11,6	9,9	15,5	10,0	11,9	10,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,1	16,7	13,3	18,7	27,5	13,4	20,0	,0	,0	9,1	75,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,9	6,8	5,6	1,3	5,0	3,0	,0	,0	,0	27,3	,0	,0
	PENSIONADO	,8	1,2	,4	,0	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,8	1,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	14,6	15,6	15,4	11,3	9,8	6,1	,0	,0	,0	20,0	,0	50,0
	MEDIO BAJO	64,6	62,8	65,7	66,9	85,4	66,7	37,5	,0	100,0	80,0	75,0	50,0
	BAJO	19,0	19,5	17,6	20,6	4,9	24,2	62,5	,0	,0	,0	25,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,0	1,2	,6	1,3	,0	3,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
JALISCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=2069	n=325	n=402	n=236	n=714	n=127	n=147	n=3	n=11	n=41	n=5	n=3
SEXO	MASCULINO	81,1	50,2	79,9	91,9	90,2	85,8	88,4	100,0	100,0	73,2	80,0	33,3
	FEMENINO	18,9	49,8	20,1	8,1	9,8	14,2	11,6	,0	,0	26,8	20,0	66,7
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,8	2,2	5,5	8,1	1,8	37,8	3,4	,0	,0	4,9	,0	,0
	15-19	18,6	8,4	14,0	41,9	12,6	38,6	25,5	,0	27,3	26,8	,0	33,3
	20-24	18,0	10,9	12,3	18,6	24,6	6,3	26,2	66,7	45,5	7,3	50,0	,0
	25-29	17,0	11,5	16,8	12,3	22,8	5,5	20,7	,0	9,1	17,1	,0	,0
	30-34	12,5	12,1	13,0	4,7	16,1	5,5	13,1	,0	18,2	12,2	,0	,0
	35 Y MAS	28,1	55,0	38,3	14,4	22,0	6,3	11,0	33,3	,0	31,7	50,0	66,7
ESTADO CIVIL	SOLTERO	47,2	31,1	38,8	72,9	41,0	83,5	61,2	66,7	81,8	48,8	20,0	33,3
	CASADO	27,3	38,8	34,3	12,7	29,1	6,3	14,3	33,3	9,1	34,1	40,0	33,3
	U. LIBRE	13,3	12,9	13,4	6,8	16,9	6,3	15,0	,0	,0	9,8	,0	,0
	SEPARADO	7,1	9,2	6,7	5,1	8,5	1,6	6,8	,0	,0	4,9	,0	,0
	DIVORCIADO	1,8	3,4	2,2	,4	2,0	,8	,0	,0	9,1	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	2,8	1,7	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	33,3
	NO ESPECIFICA	2,3	1,8	2,7	2,1	2,2	1,6	2,7	,0	,0	2,4	40,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,0	,6	1,0	,9	1,0	,8	2,1	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,5	3,1	1,5	,4	1,3	1,6	,7	,0	,0	2,4	,0	,0
	PRIMARIA	25,0	23,6	25,9	21,4	25,4	32,0	26,4	,0	,0	24,4	20,0	33,3
	SECUNDARIA	40,0	33,9	36,8	48,7	38,0	53,6	43,8	33,3	27,3	51,2	40,0	66,7
	TECNICO O COMERCIAL	3,1	5,9	2,3	,9	3,5	,0	1,4	,0	,0	7,3	20,0	,0
	BACHILLERATO	19,2	14,9	19,1	23,1	21,6	11,2	19,4	33,3	36,4	12,2	20,0	,0
	LICENCIATURA	9,5	16,5	12,8	4,3	8,7	,8	6,3	33,3	27,3	2,4	,0	,0
	POSGRADO	,7	1,6	,5	,4	,6	,0	,0	,0	9,1	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	9,5	5,8	10,8	20,3	2,9	33,1	8,7	,0	9,1	10,3	20,0	33,3
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,9	3,2	3,1	5,5	2,2	1,7	,7	33,3	18,2	2,6	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	35,8	38,3	43,0	24,0	40,0	12,4	25,4	,0	9,1	59,0	,0	33,3
	LABORAL INESTABLE	17,7	10,6	15,5	18,9	22,5	13,2	21,7	,0	18,2	5,1	,0	33,3
	DESEMPLEADO	11,3	7,7	9,3	12,4	13,6	9,9	12,3	66,7	9,1	7,7	20,0	,0
	DESOCUPADO	16,1	13,2	11,9	16,6	16,1	23,1	28,3	,0	36,4	5,1	60,0	,0
	HOGAR	6,0	18,0	5,7	1,8	2,6	6,6	2,9	,0	,0	7,7	,0	,0
	PENSIONADO	,8	3,2	,8	,5	,1	,0	,0	,0	,0	2,6	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,8	1,7	,8	,5	,8	,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	14,7	23,7	14,9	9,5	14,5	9,0	7,9	,0	44,4	14,3	,0	,0
	MEDIO BAJO	64,5	57,2	67,5	68,6	68,6	58,2	49,3	66,7	55,6	71,4	80,0	100,0
	BAJO	19,1	16,4	16,0	20,5	16,0	27,0	41,4	33,3	,0	14,3	20,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,9	1,0	,8	,9	,2	5,7	,7	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	56,9	75,1	45,5	55,5	57,6	53,5	53,1	,0	54,5	51,2	40,0	33,3
	ALCOHOL	28,5	18,8	45,3	23,3	25,8	22,8	29,9	66,7	36,4	24,4	20,0	33,3
	MARIGUANA	7,9	3,4	6,2	16,1	7,7	7,9	10,2	33,3	,0	12,2	,0	,0
	COCAÍNA	2,0	,6	1,0	,8	4,1	,0	1,4	,0	9,1	,0	,0	33,3
	INHALABLES	3,3	,9	1,5	3,8	3,6	15,0	2,0	,0	,0	2,4	,0	,0
	ESTIMULANTES	,4	,3	,2	,0	,4	,0	2,7	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,5	,6	,2	,0	,6	,0	,0	,0	,0	9,8	,0	,0
	OPIACEOS	,2	,0	,0	,4	,0	,0	,7	,0	,0	,0	40,0	,0
	OTRAS	,1	,3	,0	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



ESTADO DE MEXICO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.LEGALES ***
		n=1955	n=228	n=1131	n=226	n=3	n=2	n=330	n=5	n=1	n=4	n=25
SEXO	MASCULINO	94.3	98.7	94.2	88.9	100.0	100.0	95.2	100.0	100.0	100.0	96.0
	FEMENINO	5.7	1.3	5.8	11.1	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	4.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.4	.0	.7	7.5	.0	.0	.9	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	10.9	17.1	5.9	21.7	.0	.0	17.0	20.0	.0	25.0	4.0
	20-24 AÑOS	15.0	20.2	8.2	22.6	.0	.0	30.3	20.0	.0	.0	8.0
	25-29 AÑOS	13.6	16.7	10.8	12.8	.0	50.0	21.2	20.0	100.0	25.0	12.0
	30-34 AÑOS	13.5	16.2	13.0	12.8	.0	.0	13.0	20.0	.0	50.0	20.0
	35 AÑOS O MAS	45.5	29.8	61.4	22.6	100.0	50.0	17.6	20.0	.0	.0	56.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	6.1	3.1	8.2	6.6	.0	.0	.9	.0	.0	25.0	4.0
	PRIMARIA	37.2	32.0	42.0	40.7	33.3	50.0	23.0	20.0	.0	25.0	28.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	.9	1.1	.4	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.1	36.8	31.2	45.1	66.7	.0	52.1	20.0	100.0	25.0	40.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.8	3.1	1.7	1.3	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	13.1	18.0	12.1	5.3	.0	50.0	17.0	40.0	.0	25.0	28.0
	LICENCIATURA	3.0	6.1	2.8	.0	.0	.0	3.6	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.6	.0	.8	.4	.0	.0	.0	20.0	.0	.0	.0
	CASADO	27.3	19.7	32.9	12.8	33.3	50.0	23.9	40.0	.0	.0	16.0
	SOLTERO	42.4	56.1	33.8	59.7	66.7	.0	51.2	40.0	.0	75.0	32.0
	DIVORCIADO	3.2	2.6	4.3	1.8	.0	.0	.9	.0	.0	.0	4.0
	SEPARADO	10.2	6.1	12.4	9.7	.0	.0	5.2	.0	.0	25.0	24.0
	VIUDO	2.4	1.3	3.5	1.3	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	14.5	14.0	13.1	14.6	.0	50.0	18.5	20.0	100.0	.0	24.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	3.6	6.1	2.1	4.4	.0	.0	6.1	40.0	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	24.6	26.8	23.0	28.3	.0	50.0	25.8	20.0	.0	50.0	28.0
	DESOCUPADO	11.0	11.4	10.7	17.3	.0	50.0	7.9	20.0	100.0	.0	4.0
	TRABAJO FIJO	25.1	24.6	26.3	13.7	.0	.0	28.8	20.0	.0	.0	40.0
	TRABAJO OCASIONAL	32.8	29.8	34.3	34.5	100.0	.0	28.8	.0	.0	50.0	28.0
	AMA DE CASA	1.7	.4	1.9	1.3	.0	.0	2.7	.0	.0	.0	.0
	JUBILADO	1.1	.9	1.7	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	26.4	18.0	30.8	25.2	66.7	.0	17.3	20.0	.0	25.0	40.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	64.7	57.0	67.8	69.9	33.3	.0	57.6	80.0	100.0	75.0	44.0
	POR INDICACION LEGAL	8.5	24.6	1.1	4.0	.0	100.0	25.2	.0	.0	.0	16.0
	POR INDICACION MEDICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.3	.4	.3	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1955	n=228	n=1131	n=226	n=3	n=2	n=330	n=5	n=1	n=4	n=25
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	71.5	74.0	75.4	70.0	.0	100.0	58.9	20.0	100.0	50.0	78.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.1	7.3	4.3	9.4	.0	.0	9.3	.0	.0	.0	8.7
	1 VEZ POR SEMANA	13.6	8.7	12.6	14.3	.0	.0	19.3	40.0	.0	50.0	13.0
	1 A 3 VECES POR MES	7.0	5.9	6.5	3.6	66.7	.0	11.2	40.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	1.7	4.1	1.2	2.7	33.3	.0	1.2	.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	4.4	3.5	5.0	6.2	.0	.0	2.4	.0	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	35.0	37.3	35.1	44.7	66.7	.0	25.2	40.0	.0	25.0	52.0
	15-19 AÑOS	41.7	45.2	40.1	42.0	33.3	100.0	45.5	60.0	100.0	50.0	20.0
	20-24 AÑOS	11.8	10.1	12.8	5.8	.0	.0	13.6	.0	.0	25.0	16.0
	25-29 AÑOS	3.6	1.8	4.1	.9	.0	.0	5.2	.0	.0	.0	4.0
	30-34 AÑOS	1.5	1.3	1.3	.0	.0	.0	3.3	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	2.0	.9	1.6	.4	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	8.0
	ALCOHOL	65.2	20.2	96.5	19.5	.0	.0	26.7	.0	100.0	25.0	16.0
	MARIGUANA	11.6	73.7	1.1	5.3	.0	.0	9.7	40.0	.0	.0	.0
	INHALABLES	10.7	4.4	1.4	72.6	.0	.0	4.8	.0	.0	25.0	8.0
	ALUCINOGENOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	8.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.4	.0	.0	.0	20.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.6	.9	.2	.4	.0	.0	30.9	40.0	.0	.0	4.0
	TRANQUILIZANTES	.1	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	50.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	.7	.0	.4	.9	100.0	.0	.9	.0	.0	.0	4.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.9	.4	.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	60.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	4.7	.4	.3	.4	.0	.0	26.1	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTEN	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1929	n=227	n=209	n=1275	n=202	n=2	n=14
SEXO	MASCULINO	94.3	98.2	88.5	94.4	96.0	50.0	100.0
	FEMENINO	5.7	1.8	11.5	5.6	4.0	50.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.5	.4	6.2	1.0	.5	.0	.0
	15-19 AÑOS	11.0	14.1	23.4	7.6	16.3	50.0	7.1
	20-24 AÑOS	15.1	21.6	20.6	10.5	31.2	50.0	7.1
	25-29 AÑOS	13.6	16.3	14.8	12.2	18.3	.0	14.3
	30-34 AÑOS	13.4	15.4	12.0	13.2	14.4	.0	7.1
	35 AÑOS O MAS	45.4	32.2	23.0	55.5	19.3	.0	64.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	6.2	3.1	7.7	7.3	1.0	.0	7.1
	PRIMARIA	37.3	33.9	39.2	39.8	23.8	50.0	35.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.1	.9	1.4	1.1	1.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	37.0	34.8	43.5	34.1	51.0	50.0	35.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.8	3.1	1.4	1.8	1.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	13.0	16.7	6.2	12.5	18.8	.0	21.4
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	3.0	7.0	.5	2.7	3.5	.0	.0
	POSGRADO	.6	.4	.0	.8	.0	.0	.0
	SOLTERO	42.5	47.6	60.3	38.0	46.0	100.0	50.0
	CASADO	27.4	21.6	12.0	31.0	27.2	.0	28.6
	DIVORCIADO	3.3	2.6	2.9	3.9	.5	.0	.0
	SEPARADO	10.0	8.4	9.1	11.4	4.0	.0	14.3
EDAD DE INICIO	VIUDO	2.4	.9	1.0	3.4	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	14.4	18.9	14.8	12.4	22.3	.0	7.1
	9 AÑOS O MENOS	4.5	3.1	8.6	4.5	.5	.0	21.4
	10-14 AÑOS	34.9	36.6	47.8	35.5	15.3	50.0	42.9
	15-19 AÑOS	41.9	45.8	37.3	41.7	43.6	50.0	35.7
	20-24 AÑOS	11.8	10.6	4.8	12.0	19.8	.0	.0
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	3.6	1.8	1.0	3.8	7.4	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.5	1.3	.0	1.2	5.4	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.9	.9	.5	1.4	7.9	.0	.0
	DIARIO	67.7	67.4	66.0	71.8	46.0	50.0	42.9
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.1	6.6	12.0	4.4	10.4	.0	7.1
	1 VEZ POR SEMANA	14.8	11.0	12.4	14.3	25.7	.0	7.1
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	8.2	8.4	4.8	7.5	15.3	50.0	14.3
	1 A 11 VECES AL AÑO	3.1	6.6	4.8	2.0	2.5	.0	28.6

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
ESTADO DE MEXICO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL	
		n=179	n=79	n=94	n=4	n=64	n=1	n=1	n=3	
SEXO	MASCULINO	93.3	94.9	93.6	100.0	92.2	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	6.7	5.1	6.4	.0	7.8	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	7.8	5.1	9.6	25.0	7.8	.0	.0	33.3	
	15 - 18 AÑOS	92.2	94.9	90.4	75.0	92.2	100.0	100.0	66.7	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	41.3	38.0	45.7	25.0	42.2	.0	.0	100.0	
	SECUNDARIA	47.5	50.6	45.7	75.0	48.4	.0	100.0	.0	
	PREPA	6.1	6.3	3.2	.0	4.7	100.0	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	5.0	5.1	5.3	.0	4.7	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	15.1	12.7	19.1	.0	3.1	100.0	.0	.0	
	EMPLEADO	30.2	25.3	27.7	50.0	39.1	.0	.0	33.3	
	SUBEMPLEADO	42.5	44.3	40.4	50.0	50.0	.0	100.0	66.7	
HOGAR	HOGAR	.6	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	11.7	17.7	11.7	.0	7.8	.0	.0	.0	
USA TATUAJES	SI	21.8	19.0	22.3	25.0	23.4	.0	.0	.0	
	NO	78.2	81.0	77.7	75.0	76.6	100.0	100.0	100.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	25.1	27.8	29.8	.0	35.9	.0	.0	.0	
	NO	74.9	72.2	70.2	100.0	64.1	100.0	100.0	100.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	19.6	22.8	19.1	75.0	18.8	.0	100.0	.0	
	NO	80.4	77.2	80.9	25.0	81.3	100.0	.0	100.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	96.6	94.9	96.8	100.0	96.9	100.0	100.0	100.0	
	VIOLACION	3.4	3.8	5.3	.0	3.1	.0	.0	.0	
	HOMICIDIO	1.7	2.5	1.1	.0	1.6	.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	1.1	.0	2.1	.0	.0	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.5	7.6	3.2	.0	7.8	.0	.0	33.3	
	CONSUMO DE DROGAS	1.1	2.5	.0	25.0	1.6	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	7.8	11.4	5.3	75.0	7.8	.0	.0	.0	
	OTROS	.6	.0	.0	.0	1.6	.0	.0	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	79.3	82.3	77.7	100.0	70.3	100.0	100.0	66.7
		HOGAR	15.1	11.4	18.1	.0	18.8	.0	.0	33.3
		TRABAJO	.6	1.3	.0	.0	1.6	.0	.0	.0
ESCUELA		.6	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		1.1	1.3	2.1	.0	3.1	.0	.0	.0	
OTRO	3.4	2.5	2.1	.0	6.3	.0	.0	.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
ESTADO DE MEXICO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	OTROS
		n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	100.0	100.0
	FEMENINO	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	.0	.0
	25 - 29 AÑOS	.0	.0
	30 - 34 AÑOS	.0	.0
	35 - 39 AÑOS	.0	.0
	40 AÑOS O MÁS	100.0	100.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	.0	.0
	CAIDA	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0
	GOLPES	.0	.0
	ASFIXIA	.0	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0
	INTOXICADO	100.0	100.0
	ENVENENADO	.0	.0
	OTRAS	.0	.0
	.0	.0	
LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	.0	.0
	CASA	100.0	100.0
	CALLE	.0	.0
	BAÑOS PUBLICOS	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	.0	.0
	TRABAJO	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	.0	.0
	OTROS	.0	.0

N=458 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
ESTADO DE MEXICO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=9	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	77.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=198 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 ESTADO DE MEXICO**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO n=55	ALCOHOL n=65	ANALGESICOS n=2	TRANQUILIZANTES n=2	ANTIDEPRESIVOS n=0	ANFETAMINAS n=0	MARIGUANA n=0	INHALABLES n=0	COCAINA n=1	HEROINA n=0	ALUCINOGENOS n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	1.8	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	7.3	6.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	1.8	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	3.6	4.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	10.9	10.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	3.6	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	18.2	10.8	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	7.3	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	3.6	3.1	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	1.5	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0
OTRAS	25.5	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	5.5	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N= 198

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=2855	n=1754	n=798	n=122	n=37	n=133	n=3	n=0	n=0	n=5	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	79,0	77,2	78,9	94,3	89,2	86,5	66,7	,0	,0	80,0	,0	100,0
	FEMENINO	21,0	22,8	21,1	5,7	10,8	13,5	33,3	,0	,0	20,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,0	5,3	5,7	4,1	2,7	19,8	33,3	,0	,0	20,0	,0	,0
	15-19	26,8	24,4	32,5	29,5	16,2	25,2	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	20-24	17,7	18,0	16,6	18,9	40,5	13,7	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	25-29	15,7	15,4	16,5	13,9	16,2	16,8	33,3	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	11,2	10,9	11,2	13,9	10,8	13,0	33,3	,0	,0	20,0	,0	,0
	35 Y MAS	22,5	26,0	17,6	19,7	13,5	11,5	,0	,0	,0	40,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53,8	50,7	58,9	60,7	37,8	62,4	66,7	,0	,0	40,0	,0	100,0
	CASADO	21,5	23,4	19,4	15,6	37,8	9,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,5	11,4	10,2	13,1	16,2	18,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,2	9,1	6,9	6,6	5,4	6,0	33,3	,0	,0	40,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,0	2,3	1,8	,0	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,0	1,1	,8	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,1	2,0	2,1	2,5	2,7	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESC	,2	,2	,1	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,1	,4	,0	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,8	14,0	11,4	14,9	16,2	25,2	33,3	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	43,8	43,7	40,2	46,3	48,6	62,6	66,7	,0	,0	40,0	,0	100,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,5	5,1	4,3	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	BACHILLERATO	28,0	27,2	33,0	31,4	21,6	7,6	,0	,0	,0	40,0	,0	,0
	LICENCIATURA	9,2	9,4	10,5	4,1	13,5	3,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,2	,3	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	18,8	17,0	22,4	19,1	5,4	21,5	33,3	,0	,0	50,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,4	2,7	5,2	3,6	,0	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	30,3	31,4	27,9	28,2	51,4	24,8	33,3	,0	,0	25,0	,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	23,8	23,2	22,4	34,5	24,3	29,8	33,3	,0	,0	25,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,5	6,3	7,3	7,3	8,1	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,6	10,1	9,0	5,5	10,8	9,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	7,0	8,2	5,4	1,8	,0	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,6	,9	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,4	,4	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	18,6	18,8	18,5	18,6	21,6	16,8	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	55,6	56,6	55,4	54,0	54,1	44,8	100,0	,0	,0	60,0	,0	100,0
	BAJO	25,1	23,8	25,4	27,4	24,3	38,4	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,3	,3	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
ESTADO DE MEXICO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=2855	n=555	n=549	n=366	n=803	n=346	n=36	n=4	n=12	n=26	n=5	n=0
SEXO	MASCULINO	78,8	57,1	74,9	88,8	90,4	82,7	80,6	25,0	66,7	84,6	100,0	,0
	FEMENINO	21,2	42,9	25,1	11,2	9,6	17,3	19,4	75,0	33,3	15,4	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,1	3,4	5,8	4,1	1,0	25,0	2,8	,0	8,3	3,8	20,0	,0
	15-19	27,5	9,4	30,6	47,0	17,9	53,2	27,8	75,0	50,0	19,2	,0	,0
	20-24	18,3	10,3	17,5	21,4	25,8	11,3	22,2	,0	25,0	15,4	20,0	,0
	25-29	15,2	12,8	12,8	11,0	24,2	6,7	16,7	,0	8,3	19,2	20,0	,0
	30-34	10,6	9,9	9,1	7,4	17,4	2,0	5,6	25,0	,0	15,4	20,0	,0
	35 Y MAS	22,3	54,2	24,2	9,1	13,7	1,7	25,0	,0	8,3	26,9	20,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53,8	31,0	56,8	77,6	43,2	84,1	52,8	75,0	83,3	57,7	20,0	,0
	CASADO	21,5	36,8	23,1	6,8	25,0	2,3	30,6	,0	8,3	11,5	40,0	,0
	U. LIBRE	11,3	11,4	7,3	6,3	18,2	7,8	8,3	25,0	8,3	3,8	20,0	,0
	SEPARADO	8,2	10,6	7,5	5,2	10,7	2,9	5,6	,0	,0	15,4	,0	,0
	DIVORCIADO	2,0	4,7	2,2	1,1	1,5	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,0	3,6	,4	,5	,1	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,1	2,0	2,7	2,5	1,2	2,3	2,8	,0	,0	11,5	20,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,2	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,5	,4	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,3	20,1	12,2	8,9	11,1	14,2	19,4	,0	,0	15,4	,0	,0
	SECUNDARIA	43,3	31,8	39,1	40,8	46,3	62,9	55,6	25,0	50,0	42,3	20,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,7	11,3	4,5	2,8	2,6	1,7	,0	,0	,0	7,7	,0	,0
	BACHILLERATO	28,5	21,4	30,1	38,3	31,8	19,1	22,2	50,0	50,0	26,9	60,0	,0
	LICENCIATURA	9,5	13,5	13,4	8,9	8,2	2,0	2,8	,0	,0	7,7	20,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,2	,5	,4	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	19,0	8,8	24,6	34,5	5,2	42,5	15,2	50,0	50,0	8,3	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,5	2,8	3,7	5,8	2,7	3,4	6,1	,0	,0	8,3	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	31,5	35,4	35,0	16,2	41,6	11,6	45,5	50,0	8,3	25,0	50,0	,0
	LABORAL INESTABLE	21,6	24,4	17,7	27,4	22,9	15,3	9,1	,0	8,3	37,5	25,0	,0
	DESEMPLEADO	6,7	2,4	5,7	5,5	11,9	5,2	3,0	,0	,0	4,2	,0	,0
	DESOCUPADO	10,0	3,7	8,1	8,5	12,5	16,8	21,2	,0	33,3	8,3	25,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR PENSIONADO	7,0	20,2	4,7	1,8	3,1	5,2	,0	,0	,0	8,3	,0	,0
	ALTO	,6	2,4	,4	,3	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	4	,8	,2	,9	,1	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	19,0	23,7	20,1	22,0	16,6	13,1	8,6	25,0	25,0	26,1	,0	,0
	BAJO	55,7	55,6	57,8	51,9	56,4	52,0	71,4	25,0	50,0	69,6	100,0	,0
	POBREZA EXTREMA	24,7	19,8	21,3	25,2	26,7	34,6	17,1	50,0	25,0	4,3	,0	,0
	DROGA DE INICIO	,2	,2	,6	,0	,1	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
TABACO	62,2	79,5	55,1	56,3	61,8	54,3	55,6	50,0	83,3	50,0	60,0	,0	
ALCOHOL	27,6	16,9	43,2	27,6	26,0	24,3	27,8	50,0	16,7	23,1	20,0	,0	
MARIGUANA	4,1	1,3	,7	12,3	5,1	2,3	8,3	,0	,0	7,7	20,0	,0	
COCAÍNA	1,3	,2	,0	,3	3,9	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
INHALABLES	4,5	2,2	,9	3,3	3,2	18,5	,0	,0	,0	7,7	,0	,0	
ESTIMULANTES	,1	,0	,0	,0	,0	,0	5,6	,0	,0	,0	,0	,0	
DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
DEPRESORES	,1	,0	,0	,3	,0	,0	,0	,0	,0	11,5	,0	,0	
OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



INFORME 2007

MICHOACAN



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
MICHOACAN

CARACTERISTICAS		GLOBAL n=3334	MARIJUANA n=176	ALCOHOL n=1463	INHALABLES n=60	TABACO n=13	TRANQUILIZANTES n=19	COCAINA* n=760	HEROINA n=276	CRISTAL n=333	ROHYPNOL n=4	D.MEDICAS ** n=15	D.ILEGALES *** n=215
SEXO	MASCULINO	93.1	93.2	93.0	95.0	76.9	84.2	95.7	93.1	92.8	75.0	86.7	87.4
	FEMENINO	6.9	6.8	7.0	5.0	23.1	15.8	4.3	6.9	7.2	25.0	13.3	12.6
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.8	2.8	.5	.0	.0	.0	1.1	.4	1.2	.0	.0	.5
	15-19 AÑOS	11.9	25.0	5.7	31.7	30.8	15.8	15.1	7.6	19.5	25.0	6.7	18.1
	20-24 AÑOS	93.1	93.2	93.0	95.0	76.9	84.2	95.7	93.1	92.8	75.0	86.7	87.4
	25-29 AÑOS	6.9	6.8	7.0	5.0	23.1	15.8	4.3	6.9	7.2	25.0	13.3	12.6
	30-34 AÑOS	.8	2.8	.5	.0	.0	.0	1.1	.4	1.2	.0	.0	.5
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	11.9	25.0	5.7	31.7	30.8	15.8	15.1	7.6	19.5	25.0	6.7	18.1
	NO FUE A LA ESCUELA	17.9	25.6	7.9	28.3	23.1	10.5	25.5	27.2	29.1	.0	13.3	20.9
	PRIMARIA	17.8	18.2	11.1	10.0	15.4	5.3	23.8	22.1	23.4	.0	33.3	30.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	14.6	10.2	13.6	8.3	.0	42.1	15.7	20.3	15.3	50.0	26.7	11.2
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	37.0	18.2	61.1	21.7	30.8	26.3	18.8	22.5	11.4	25.0	20.0	18.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	9.1	4.0	15.1	10.0	7.7	15.8	3.7	6.9	3.0	25.0	.0	3.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	41.9	38.1	45.2	43.3	69.2	42.1	34.6	41.7	38.1	50.0	33.3	53.5
	LICENCIATURA	1.0	2.8	.9	.0	.0	.0	1.1	.7	.3	.0	.0	1.4
ESTADO CIVIL	POSGRADO	29.8	36.9	22.8	45.0	15.4	21.1	36.7	32.6	36.3	.0	46.7	30.2
	CASADO	1.0	2.3	1.1	.0	.0	.0	.4	.4	.9	.0	.0	2.8
	SOLTERO	14.1	15.3	10.6	1.7	.0	15.8	20.3	15.9	20.1	25.0	13.3	7.0
	DIVORCIADO	2.8	.6	3.8	.0	7.7	5.3	3.2	1.8	1.2	.0	6.7	1.4
	SEPARADO	.3	.0	.5	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	VIUDO	36.8	20.5	47.7	11.7	23.1	31.6	32.5	25.7	24.6	75.0	20.0	32.1
	UNION LIBRE	43.4	63.6	32.9	76.7	53.8	63.2	47.1	45.7	56.5	25.0	40.0	50.7
	ESTUDIANTE	3.5	2.8	3.6	.0	.0	5.3	4.3	3.3	3.0	.0	13.3	2.3
	DESEMPLEADO	7.3	8.0	7.3	5.0	.0	.0	7.4	8.0	9.0	.0	13.3	5.1
	DESOCUPADO	1.8	.0	3.3	1.7	.0	.0	.4	.7	.9	.0	.0	1.4
	TRABAJO FIJO	7.2	5.1	5.3	5.0	23.1	.0	8.3	16.7	6.0	.0	13.3	8.4
	TRABAJO OCASIONAL	2.9	8.5	1.9	1.7	7.7	15.8	3.3	1.1	3.0	.0	.0	4.2
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	AMA DE CASA	28.1	25.6	22.3	41.7	23.1	31.6	28.0	33.7	48.3	.0	26.7	28.8
	JUBILADO	10.8	11.4	11.5	15.0	7.7	15.8	9.5	13.8	10.9	25.0	6.7	5.6
	VOLUNTARIO	29.2	18.8	32.4	23.3	15.4	21.1	31.6	18.8	19.3	50.0	26.7	38.6
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	26.7	35.2	28.8	16.7	46.2	15.8	26.6	32.2	16.6	.0	26.7	17.7
	POR INDICACION LEGAL	1.9	.6	2.4	1.7	.0	.0	.8	.4	1.5	25.0	13.3	5.1
POR INDICACION MEDICA	.4	.0	.6	.0	.0	.0	.3	.0	.3	.0	.0	.0	
OTROS	22.1	20.5	14.1	21.7	15.4	26.3	32.6	35.1	20.4	25.0	20.0	27.4	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
MICHOACAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=3334	n=176	n=1463	n=60	n=13	n=19	n=760	n=276	n=333	n=4	n=15	n=215
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	78.0	82.9	75.4	83.1	100.0	89.5	77.5	93.1	70.3	75.0	80.0	82.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	9.8	9.7	9.9	8.5	.0	10.5	9.9	4.0	16.8	.0	6.7	7.0
	1 VEZ POR SEMANA	9.1	2.9	11.0	6.8	.0	.0	9.9	1.8	9.6	25.0	6.7	8.8
	1 A 3 VECES POR MES	2.5	2.9	2.9	.0	.0	.0	2.4	.7	3.0	.0	.0	1.9
	1 A 11 VECES AL AÑO	.6	1.7	.8	1.7	.0	.0	.4	.4	.3	.0	6.7	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	3.9	2.8	1.8	6.7	15.4	.0	5.0	8.0	6.6	.0	.0	5.1
	10-14 AÑOS	35.1	49.4	24.9	70.0	23.1	31.6	39.1	48.6	41.1	50.0	46.7	41.4
	15-19 AÑOS	44.2	39.8	50.0	18.3	53.8	52.6	43.3	34.8	39.3	25.0	40.0	38.6
	20-24 AÑOS	10.6	6.8	15.4	5.0	.0	.0	7.4	5.1	6.3	.0	6.7	9.3
	25-29 AÑOS	3.2	1.1	4.2	.0	7.7	.0	2.6	1.4	4.2	25.0	.0	2.3
	30-34 AÑOS	1.6	.0	1.7	.0	.0	15.8	1.3	1.4	1.5	.0	.0	2.3
	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	1.9	.0	.0	.0	1.3	.7	.9	.0	6.7	.9
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	49.7	29.0	70.1	16.7	23.1	21.1	41.6	18.5	40.5	50.0	33.3
	MARIGUANA	16.9	52.3	2.7	41.7	.0	21.1	24.6	33.7	18.9	.0	6.7	27.0
	INHALABLES	2.5	3.4	.6	23.3	.0	.0	3.0	4.3	3.0	.0	13.3	3.3
	ALUCINOGENOS	1.6	.0	.3	.0	.0	.0	1.2	1.8	.0	.0	.0	16.7
	HEROINA	2.2	.6	.0	.0	.0	.0	.5	25.4	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.7	.0	.0	13.3	.0
	COCAINA	4.2	.6	.5	1.7	.0	.0	9.9	3.6	8.7	.0	.0	7.4
	TRANQUILIZANTES	.5	.6	.1	.0	.0	42.1	.1	1.1	.3	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.5	.6	.1	3.3	.0	.0	.0	1.4	.9	.0	33.3	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	17.2	13.1	25.1	11.7	76.9	15.8	10.1	8.0	6.9	25.0	.0	18.6
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.4	.0	.0	.0	.9
	BASUCO	.4	.0	.0	.0	.0	.0	1.4	.7	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	2.2	.0	.1	1.7	.0	.0	.4	.0	20.4	.0	.0	.5
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0
	CRACK	1.7	.0	.3	.0	.0	.0	6.8	.4	.3	.0	.0	.0
	REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
MICHOACAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=3162	n=563	n=83	n=1658	n=210	n=75	n=573
SEXO	MASCULINO	93.3	95.7	95.2	93.2	91.9	88.0	92.0
	FEMENINO	6.7	4.3	4.8	6.8	8.1	12.0	8.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.8	1.6	2.4	.5	.5	1.3	.7
	15-19 AÑOS	11.5	21.5	13.3	7.8	13.8	9.3	11.3
	20-24 AÑOS	17.5	25.9	27.7	12.9	29.0	24.0	16.1
	25-29 AÑOS	17.6	20.8	20.5	15.7	26.7	20.0	15.9
	30-34 AÑOS	14.6	12.1	16.9	15.5	13.8	22.7	13.4
	35 AÑOS O MAS	38.0	18.1	19.3	47.6	16.2	22.7	42.6
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.4	4.3	6.0	10.9	4.3	10.7	12.2
	PRIMARIA	41.9	39.6	45.8	41.0	31.0	57.3	48.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.0	.9	.0	1.2	1.0	.0	.7
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	29.5	38.2	32.5	27.0	40.5	24.0	24.4
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.0	.5	2.4	1.3	.5	.0	.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.0	15.3	12.0	14.4	20.5	6.7	10.6
	LICENCIATURA	2.9	1.2	1.2	3.7	2.4	1.3	2.8
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.3	.0	.0	.5	.0	.0	.2
	SOLTERO	42.8	56.0	44.6	38.0	45.7	60.0	40.1
	CASADO	37.2	26.1	21.7	42.4	30.0	22.7	39.8
	DIVORCIADO	3.5	2.1	2.4	4.0	5.7	2.7	2.8
	SEPARADO	7.5	6.0	7.2	8.3	6.7	4.0	7.3
	VIUDO	1.8	.0	.0	2.3	1.0	.0	3.0
	UNION LIBRE	7.3	9.8	24.1	5.1	11.0	10.7	7.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.1	5.2	19.3	3.4	1.4	1.3	4.5
	10-14 AÑOS	35.7	53.8	63.9	32.8	16.2	14.7	32.5
	15-19 AÑOS	44.2	35.3	15.7	44.3	48.1	58.7	53.4
	20-24 AÑOS	10.4	4.6	1.2	12.1	19.0	13.3	9.1
	25-29 AÑOS	3.0	.7	.0	4.1	7.6	4.0	.5
	30-34 AÑOS	1.3	.2	.0	1.6	3.8	5.3	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.3	.2	.0	1.7	3.8	2.7	.0
	DIARIO	64.7	80.1	62.7	46.8	68.1	96.0	96.2
	2 - 3 VECES POR SEMANA	13.4	7.7	12.0	20.1	15.2	1.3	.7
	1 VEZ POR SEMANA	15.5	6.9	14.5	23.9	12.4	1.3	2.8
	1 A 3 VECES POR MES	4.8	3.4	4.8	7.3	2.9	1.3	.2
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.7	2.0	6.0	2.0	1.4	.0	.2

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
MICHOACAN



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
MICHOACAN

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL
		n=210	n=45	n=3	n=20	n=24	n=8	n=5	n=12
SEXO	MASCULINO	87.6	95.6	100.0	85.0	83.3	100.0	80.0	83.3
	FEMENINO	12.4	4.4	.0	15.0	16.7	.0	20.0	16.7
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	24.0	13.3	33.3	.0	16.7	.0	.0	.0
	15 - 18 AÑOS	76.0	86.7	66.7	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	47.1	53.3	100.0	40.0	58.3	62.5	40.0	16.7
	SECUNDARIA	41.9	37.8	.0	45.0	29.2	12.5	60.0	75.0
	PREPA	4.8	2.2	.0	.0	4.2	.0	.0	.0
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	6.2	6.7	.0	15.0	8.3	25.0	.0	8.3
	ESTUDIANTE	24.9	11.1	.0	10.0	4.2	.0	.0	.0
	EMPLEADO	38.3	55.6	.0	45.0	54.2	62.5	40.0	58.3
	SUBEMPLEADO	23.9	20.0	33.3	35.0	20.8	25.0	40.0	25.0
USA TATUAJES	HOGAR	4.3	.0	.0	5.0	4.2	.0	.0	8.3
	NINGUNA	8.6	13.3	66.7	5.0	16.7	12.5	20.0	8.3
	SI	21.4	44.4	33.3	50.0	37.5	100.0	40.0	41.7
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	78.6	55.6	66.7	50.0	62.5	.0	60.0	58.3
	SI	8.1	20.0	66.7	30.0	25.0	50.0	20.0	41.7
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	91.9	80.0	33.3	70.0	75.0	50.0	80.0	58.3
	SI	15.0	31.1	100.0	89.5	45.8	42.9	40.0	16.7
TIPO DE INFRACCION	NO	85.0	68.9	.0	10.5	54.2	57.1	60.0	83.3
	ROBO	63.3	75.6	100.0	55.0	66.7	87.5	.0	50.0
	VIOLACION	10.5	4.4	.0	10.0	8.3	.0	20.0	8.3
	HOMICIDIO	10.0	8.9	.0	35.0	4.2	12.5	20.0	8.3
	LESIONES A TERCEROS	2.4	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	20.0	.0
	SECUESTRO	2.4	2.2	.0	10.0	.0	.0	40.0	8.3
	DELITOS CONTRA LA SALUD	6.7	6.7	.0	.0	12.5	.0	.0	16.7
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	PORTACION DE ARMA	4.3	4.4	.0	.0	12.5	.0	.0	16.7
	OTROS	4.8	4.4	.0	.0	8.3	12.5	.0	.0
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	68.1	69.8	66.7	77.8	70.8	62.5	60.0
HOGAR		20.1	16.3	33.3	16.7	20.8	25.0	20.0	16.7
TRABAJO		3.9	4.7	.0	.0	4.2	12.5	.0	8.3
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
LUGAR DE RECREO		.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRO	7.4	9.3	.0	5.6	4.2	.0	20.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
MICHOACAN

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=212	n=95	n=86	n=19	n=1	n=2	n=2	n=0	n=0	n=6	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	76,9	81,1	73,3	94,7	100,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	23,1	18,9	26,7	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	3,3	4,2	2,3	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	17,5	17,9	16,3	26,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	17,5	17,9	17,4	15,8	100,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	10,4	7,4	12,8	10,5	,0	50,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	30-34	16,0	14,7	16,3	21,1	,0	50,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	35,4	37,9	34,9	21,1	,0	,0	,0	,0	,0	66,7	,0	100,0
	SOLTERO	34,9	33,7	33,7	47,4	100,0	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	44,8	49,5	43,0	36,8	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	U. LIBRE	2,8	4,2	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,5	6,3	8,1	10,5	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	4,7	3,2	8,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	4,2	2,1	4,7	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	2,8	3,2	1,2	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,9	1,1	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	32,1	35,8	26,7	36,8	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	SECUNDARIA	36,8	35,8	40,7	42,1	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,8	1,1	4,7	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	BACHILLERATO	17,5	14,7	18,6	15,8	100,0	50,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	7,1	8,4	7,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	8,2	6,4	9,8	15,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	1,0	,0	1,2	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	46,4	48,9	52,4	26,3	,0	50,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	13,5	14,9	9,8	26,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
SOCIOECONOMICO	DESEMPLEADO	6,8	6,4	4,9	10,5	100,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	DESOCUPADO	11,1	9,6	12,2	15,8	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	12,6	12,8	9,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	83,3	,0	100,0
	PENSIONADO	,5	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NIVEL ALTO	1,0	1,1	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	16,2	16,1	14,5	31,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
SOCIOECONOMICO	MEDIO BAJO	56,4	55,9	59,0	31,3	100,0	50,0	50,0	,0	,0	83,3	,0	100,0
	BAJO	26,5	26,9	25,3	37,5	,0	50,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
MICHOACAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=212	n=36	n=72	n=13	n=45	n=5	n=18	n=0	n=1	n=17	n=2	n=1
SEXO	MASCULINO	77,6	63,9	79,2	92,3	88,9	100,0	83,3	,0	100,0	47,1	100,0	,0
	FEMENINO	22,4	36,1	20,8	7,7	11,1	,0	16,7	,0	,0	52,9	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	3,3	2,8	4,2	,0	2,2	20,0	,0	,0	,0	5,9	,0	,0
	15-19	17,6	19,4	11,1	46,2	15,6	40,0	27,8	,0	100,0	5,9	,0	,0
	20-24	17,6	11,1	12,5	38,5	26,7	40,0	16,7	,0	,0	5,9	50,0	,0
	25-29	10,5	2,8	4,2	15,4	24,4	,0	22,2	,0	,0	5,9	,0	,0
	30-34	16,2	11,1	23,6	,0	13,3	,0	16,7	,0	,0	23,5	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	34,8	52,8	44,4	,0	17,8	,0	16,7	,0	,0	52,9	50,0	100,0
	SOLTERO	35,2	27,8	29,2	76,9	35,6	80,0	44,4	,0	100,0	17,6	50,0	,0
	CASADO	44,8	52,8	48,6	15,4	48,9	,0	38,9	,0	,0	47,1	,0	100,0
	U. LIBRE	2,9	,0	2,8	,0	6,7	,0	5,6	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,6	11,1	6,9	7,7	6,7	,0	5,6	,0	,0	5,9	50,0	,0
	DIVORCIADO	4,3	2,8	8,3	,0	,0	,0	5,6	,0	,0	5,9	,0	,0
	VIUDO	1,0	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	5,9	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4,3	2,8	4,2	,0	2,2	20,0	,0	,0	,0	17,6	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	2,9	2,8	,0	,0	6,7	,0	5,6	,0	,0	5,9	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,0	2,8	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	32,4	36,1	31,9	38,5	28,9	,0	33,3	,0	,0	35,3	50,0	100,0
	SECUNDARIA	36,7	33,3	38,9	23,1	44,4	40,0	38,9	,0	,0	29,4	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,4	2,8	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	11,8	,0	,0
	BACHILLERATO	17,6	13,9	16,7	30,8	15,6	40,0	22,2	,0	100,0	5,9	50,0	,0
	LICENCIATURA	7,1	8,3	8,3	7,7	4,4	20,0	,0	,0	,0	11,8	,0	,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	8,3	2,8	8,7	30,8	4,4	20,0	12,5	,0	,0	5,9	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	1,0	,0	1,4	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	46,3	41,7	56,5	61,5	40,0	20,0	43,8	,0	,0	41,2	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	13,7	16,7	10,1	7,7	20,0	20,0	18,8	,0	,0	5,9	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,8	5,6	5,8	,0	11,1	20,0	,0	,0	,0	5,9	50,0	,0
	DESOCUPADO	11,2	5,6	10,1	,0	20,0	20,0	12,5	,0	100,0	,0	50,0	,0
	HOGAR	12,2	25,0	7,2	,0	2,2	,0	12,5	,0	,0	41,2	,0	100,0
	PENSIONADO	,5	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,0	,0	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	16,3	14,3	15,5	23,1	11,9	20,0	23,5	,0	,0	26,7	,0	,0
	MEDIO BAJO	56,4	68,6	56,3	53,8	50,0	40,0	52,9	,0	100,0	53,3	50,0	100,0
	BAJO	26,2	17,1	25,4	23,1	38,1	40,0	23,5	,0	,0	20,0	50,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	45,2	66,7	34,7	61,5	60,0	40,0	33,3	,0	,0	17,6	,0	,0
	ALCOHOL	40,0	27,8	58,3	7,7	22,2	60,0	61,1	,0	100,0	35,3	,0	,0
	MARIGUANA	9,0	5,6	4,2	30,8	13,3	,0	5,6	,0	,0	11,8	50,0	,0
	COCAÍNA	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	INHALABLES	1,0	,0	1,4	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	1,0	,0	1,4	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	35,3	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



MORELOS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***	
		n=490	n=45	n=179	n=19	n=2	n=207	n=5	n=23	n=1	n=4	n=5	
SEXO	MASCULINO	83.5	86.7	85.5	73.7	.0	82.1	100.0	95.7	.0	75.0	60.0	
	FEMENINO	16.5	13.3	14.5	26.3	100.0	17.9	.0	4.3	100.0	25.0	40.0	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.6	2.2	.0	26.3	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	15-19 AÑOS	16.3	48.9	8.9	31.6	.0	15.5	.0	8.7	100.0	.0	20.0	
	20-24 AÑOS	16.9	17.8	8.9	10.5	.0	22.2	20.0	26.1	.0	.0	80.0	
	25-29 AÑOS	18.2	11.1	15.1	15.8	.0	22.2	.0	30.4	.0	25.0	.0	
	30-34 AÑOS	12.0	11.1	10.1	.0	50.0	13.5	40.0	21.7	.0	.0	.0	
	35 AÑOS O MAS	34.9	8.9	57.0	15.8	50.0	25.6	40.0	13.0	.0	75.0	.0	
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	1.8	2.2	2.8	5.3	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PRIMARIA	10.6	15.6	14.5	21.1	.0	7.2	.0	.0	.0	.0	.0	
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	2.2	.6	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	31.0	51.1	20.1	57.9	.0	34.3	.0	34.8	100.0	25.0	20.0	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.4	2.2	2.2	.0	.0	.5	.0	4.3	.0	.0	.0	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	32.4	20.0	30.7	15.8	.0	36.7	40.0	43.5	.0	.0	80.0	
	LICENCIATURA	20.4	6.7	26.8	.0	100.0	17.9	60.0	17.4	.0	75.0	.0	
	POSGRADO	1.4	.0	2.2	.0	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTADO CIVIL	CASADO	24.6	6.7	39.1	10.5	50.0	18.4	.0	18.2	.0	50.0	.0
		SOLTERO	52.4	88.9	35.2	84.2	50.0	55.8	75.0	45.5	100.0	25.0	100.0
DIVORCIADO		5.3	.0	5.0	5.3	.0	6.3	25.0	4.5	.0	25.0	.0	
SEPARADO		7.0	.0	8.9	.0	.0	7.8	.0	9.1	.0	.0	.0	
VIUDO		.6	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	10.1	4.4	10.1	.0	.0	11.7	.0	22.7	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	12.7	15.6	12.9	5.3	.0	12.5	40.0	.0	.0	.0	60.0	
	DESEMPLEADO	16.4	28.9	12.9	5.3	50.0	17.5	.0	21.7	.0	.0	20.0	
	DESOCUPADO	14.7	24.4	6.2	57.9	.0	15.5	.0	26.1	100.0	.0	.0	
	TRABAJO FIJO	34.6	22.2	42.1	10.5	50.0	34.5	40.0	17.4	.0	75.0	20.0	
	TRABAJO OCASIONAL	17.2	8.9	17.4	21.1	.0	17.0	20.0	34.8	.0	25.0	.0	
	AMA DE CASA	3.1	.0	5.1	.0	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	JUBILADO	1.2	.0	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	50.1	31.1	52.3	15.8	100.0	57.3	25.0	30.4	.0	50.0	80.0	
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	49.7	68.9	47.7	84.2	.0	42.2	75.0	69.6	100.0	50.0	20.0	
	POR INDICACION LEGAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	POR INDICACION MEDICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	.2	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=490	n=45	n=179	n=19	n=2	n=207	n=5	n=23	n=1	n=4	n=5
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	76.9	84.4	67.0	89.5	100.0	80.7	100.0	91.3	.0	100.0	60.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	14.7	8.9	21.8	.0	.0	13.5	.0	.0	100.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	4.9	.0	8.4	5.3	.0	2.9	.0	4.3	.0	.0	20.0
	1 A 3 VECES POR MES	3.1	6.7	1.7	5.3	.0	2.9	.0	4.3	.0	.0	20.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.4	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	1.6	6.7	.6	.0	.0	1.4	.0	4.3	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	32.0	42.2	24.6	52.6	50.0	35.3	40.0	26.1	100.0	25.0	.0
	15-19 AÑOS	51.2	48.9	49.7	47.4	.0	52.7	60.0	56.5	.0	25.0	100.0
	20-24 AÑOS	9.2	2.2	12.3	.0	.0	9.2	.0	8.7	.0	25.0	.0
	25-29 AÑOS	2.7	.0	5.6	.0	.0	1.0	.0	.0	.0	25.0	.0
	30-34 AÑOS	2.0	.0	4.5	.0	50.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.2	.0	2.8	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	74.9	53.3	90.5	57.9	.0	68.1	80.0	82.6	.0	50.0	80.0
	MARIGUANA	9.6	28.9	2.8	5.3	.0	12.1	20.0	4.3	.0	.0	20.0
	INHALABLES	3.5	11.1	.0	36.8	.0	1.9	.0	.0	100.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.6	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0
	COCAINA	3.1	2.2	.0	.0	.0	5.8	.0	8.7	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.4	.0	.0	.0	50.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.4	.0	.6	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	5.1	4.4	5.0	.0	50.0	5.8	.0	4.3	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRACK	2.2	.0	.6	.0	.0	4.8	.0	.0	.0	.0	.0
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio,
2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=482	n=47	n=17	n=367	n=26	n=25
SEXO	MASCULINO	83.8	83.0	47.1	87.5	76.9	64.0
	FEMENINO	16.2	17.0	52.9	12.5	23.1	36.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.7	2.1	11.8	1.1	.0	4.0
	15-19 AÑOS	16.4	29.8	47.1	13.9	15.4	8.0
	20-24 AÑOS	17.2	6.4	5.9	18.8	34.6	4.0
	25-29 AÑOS	17.8	21.3	17.6	16.6	34.6	12.0
	30-34 AÑOS	11.8	12.8	11.8	11.2	7.7	24.0
	35 AÑOS O MAS	35.1	27.7	5.9	38.4	7.7	48.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	1.9	6.4	5.9	1.4	.0	.0
	PRIMARIA	10.8	8.5	17.6	12.0	3.8	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	.0	.0	1.1	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	31.1	46.8	64.7	29.2	34.6	4.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.5	4.3	.0	1.4	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	32.8	25.5	11.8	32.2	57.7	44.0
	LICENCIATURA	19.7	8.5	.0	21.5	3.8	44.0
	POSGRADO	1.5	.0	.0	1.4	.0	8.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	52.0	67.4	82.4	47.9	73.1	40.0
	CASADO	24.8	15.2	5.9	28.2	15.4	16.0
	DIVORCIADO	5.2	6.5	5.9	4.1	3.8	20.0
	SEPARADO	7.1	4.3	5.9	7.9	.0	8.0
	VIUDO	.6	2.2	.0	.3	.0	4.0
	UNION LIBRE	10.2	4.3	.0	11.5	7.7	12.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	1.7	.0	.0	1.9	.0	4.0
	10-14 AÑOS	32.4	38.3	76.5	28.9	23.1	52.0
	15-19 AÑOS	51.7	57.4	23.5	53.1	46.2	44.0
	20-24 AÑOS	8.9	4.3	.0	9.5	23.1	.0
	25-29 AÑOS	2.5	.0	.0	3.0	3.8	.0
	30-34 AÑOS	1.7	.0	.0	2.2	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.2	.0	.0	1.4	3.8	.0
FRECUENCIA DE INICIO	DIARIO	29.7	57.4	76.5	20.2	23.1	92.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	18.7	19.1	5.9	21.0	11.5	.0
	1 VEZ POR SEMANA	33.4	12.8	5.9	40.3	19.2	4.0
	1 A 3 VECES POR MES	15.6	10.6	11.8	15.0	46.2	4.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	2.7	.0	.0	3.5	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
MORELOS



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=406	n=73	n=32	n=260	n=39	n=264	
SEXO	MASCULINO	92.1	94.5	96.9	95.0	89.7	94.7	
	FEMENINO	7.9	5.5	3.1	5.0	10.3	5.3	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	22.9	13.7	15.6	15.1	10.3	16.1	
	15 - 18 AÑOS	77.1	86.3	84.4	84.9	89.7	83.9	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	34.9	46.6	61.3	35.7	43.6	35.8	
	SECUNDARIA	53.1	43.8	38.7	52.5	51.3	53.1	
	PREPA	9.0	8.2	.0	8.6	5.1	8.8	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.2	.0	.0	.4	.0	.4	
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.7	1.4	.0	2.7	.0	1.9	
	ESTUDIANTE	27.2	17.1	10.0	17.8	10.3	20.1	
	EMPLEADO	18.7	18.6	23.3	21.1	23.1	19.3	
	SUBEMPLEADO	46.4	55.7	60.0	52.2	59.0	52.4	
HOGAR	HOGAR	2.6	1.4	.0	1.6	.0	1.2	
	NINGUNA	5.1	7.1	6.7	7.3	7.7	7.1	
	USA TATUAJES	16.8	33.3	46.9	21.6	38.5	20.5	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	6.2	11.0	16.1	8.1	18.4	7.2	
	NO	93.8	89.0	83.9	91.9	81.6	92.8	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	7.4	12.3	12.5	10.8	10.3	8.0	
	NO	92.6	87.7	87.5	89.2	89.7	92.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	49.3	45.2	50.0	51.5	51.3	51.1	
	VIOLACION	6.4	1.4	.0	4.2	2.6	4.5	
	HOMICIDIO	3.9	6.8	3.1	5.0	7.7	4.5	
	LESIONES A TERCEROS	15.0	12.3	9.4	16.5	20.5	15.9	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	7.9	5.5	15.6	7.7	7.7	5.3	
	SECUESTRO	1.7	1.4	.0	2.3	.0	2.7	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	3.7	17.8	.0	3.8	7.7	4.9	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	5.9	5.5	18.8	5.8	.0	7.2	
	OTROS	12.3	12.3	9.4	11.2	7.7	12.1	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	87.8	86.3	93.8	88.8	84.6	88.9
		HOGAR	9.2	8.2	3.1	8.5	10.3	7.7
		TRABAJO	1.5	.0	.0	1.2	.0	1.5
ESCUELA		.2	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.2	1.4	.0	.4	.0	.4	
OTRO	1.0	4.1	3.1	1.2	5.1	1.5		



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
MORELOS**

		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES
		n=8	n=7	n=1
SEXO	MASCULINO	87.5	85.7	100.0
	FEMENINO	12.5	14.3	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	12.5	.0	100.0
	20 - 24 AÑOS	12.5	14.3	.0
	25 - 29 AÑOS	25.0	28.6	.0
	30 - 34 AÑOS	12.5	14.3	.0
	35 - 39 AÑOS	.0	.0	.0
	40 AÑOS O MÁS	37.5	42.9	.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	.0	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	87.5	85.7	100.0
	CAIDA	.0	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0	.0
	GOLPES	.0	.0	.0
	ASFIXIA	12.5	14.3	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0
	INTOXICADO	.0	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0
	OTRAS	.0	.0	.0
LUGAR DONDE OCURRIÓ LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	62.5	57.1	100.0
	CASA	.0	.0	.0
	CALLE	25.0	28.6	.0
	BAÑOS PUBLICOS	.0	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	12.5	14.3	.0
	TRABAJO	.0	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0

N= 51 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=201	n=129	n=60	n=7	n=4	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	76,5	75,2	78,3	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	23,5	24,8	21,7	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,0	3,9	6,7	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	32,0	31,8	35,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	16,5	17,8	11,7	28,6	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	16,0	16,3	16,7	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	8,0	7,0	11,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	22,5	23,3	18,3	42,9	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	51,0	49,6	53,3	28,6	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	19,5	20,2	16,7	42,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	10,0	10,9	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,5	11,6	10,0	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,5	2,3	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4,5	5,4	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	7,1	5,6	8,3	14,3	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	40,3	44,8	30,0	57,1	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,1	4,8	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	33,7	30,4	41,7	28,6	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	12,2	13,6	10,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,0	,0	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	20,5	16,4	31,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIA Y TRABAJA	5,1	4,7	5,2	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,2	27,3	32,8	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	16,4	17,2	12,1	42,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,2	8,6	5,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,4	18,0	12,1	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	5,6	7,0	1,7	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,0	,0	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	14,9	13,8	18,3	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	68,0	69,9	65,0	57,1	75,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	14,9	14,6	13,3	28,6	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,0	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
MORELOS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=201	n=27	n=55	n=32	n=55	n=14	n=2	n=2	n=1	n=8	n=3	n=0
SEXO	MASCULINO	76,9	66,7	76,4	75,0	89,1	71,4	100,0	,0	100,0	50,0	100,0	,0
	FEMENINO	23,1	33,3	23,6	25,0	10,9	28,6	,0	100,0	,0	50,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,0	7,4	7,3	6,3	1,8	7,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	32,2	3,7	36,4	59,4	21,8	42,9	50,0	50,0	100,0	12,5	66,7	,0
	20-24	16,6	7,4	12,7	18,8	27,3	21,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	16,1	14,8	20,0	3,1	21,8	7,1	50,0	50,0	,0	12,5	,0	,0
	30-34	7,5	7,4	5,5	,0	16,4	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	22,6	59,3	18,2	12,5	10,9	21,4	,0	,0	,0	75,0	,0	,0
	SOLTERO	51,3	25,9	60,0	75,0	43,6	64,3	50,0	50,0	100,0	,0	66,7	,0
	CASADO	19,1	25,9	16,4	12,5	23,6	7,1	,0	,0	,0	37,5	33,3	,0
	U. LIBRE	10,1	11,1	10,9	9,4	10,9	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,6	25,9	7,3	,0	14,5	7,1	50,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,5	3,7	,0	,0	5,5	,0	,0	50,0	,0	25,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4,5	7,4	5,5	3,1	1,8	7,1	,0	,0	,0	12,5	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	7,2	8,0	3,7	6,3	5,5	15,4	,0	,0	,0	37,5	,0	,0
	SECUNDARIA	41,0	28,0	31,5	46,9	47,3	69,2	100,0	,0	100,0	25,0	33,3	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,1	4,0	7,4	,0	5,5	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	BACHILLERATO	33,8	20,0	44,4	43,8	29,1	15,4	,0	100,0	,0	12,5	66,7	,0
OCUPACION	LICENCIATURA	11,8	36,0	11,1	3,1	12,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,0	4,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	20,6	3,7	33,3	34,4	13,0	14,3	,0	50,0	,0	,0	33,3	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	5,2	3,7	11,8	3,1	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0
	LABORAL ESTABLE	28,9	48,1	29,4	15,6	29,6	14,3	,0	50,0	,0	50,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	16,0	22,2	9,8	12,5	24,1	21,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,2	3,7	7,8	3,1	11,1	,0	50,0	,0	,0	12,5	,0	,0
	DESOCUPADO	16,5	3,7	7,8	25,0	16,7	42,9	50,0	,0	100,0	12,5	33,3	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,2	11,1	,0	6,3	3,7	7,1	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	PENSIONADO	,5	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,0	,0	1,9	3,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	15,0	8,0	13,5	29,0	12,7	7,1	,0	,0	100,0	25,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	MEDIO BAJO	67,4	68,0	71,2	51,6	72,7	71,4	100,0	50,0	,0	50,0	100,0	,0
	BAJO	15,5	24,0	13,5	12,9	14,5	21,4	,0	50,0	,0	12,5	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,0	,0	,0	3,2	,0	,0	,0	,0	,0	12,5	,0	,0
	TABACO	64,6	74,1	63,6	59,4	56,4	84,6	100,0	,0	100,0	87,5	66,7	,0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	29,8	22,2	30,9	37,5	34,5	15,4	,0	50,0	,0	12,5	33,3	,0
	MARIGUANA	3,5	3,7	3,6	3,1	5,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	2,0	,0	1,8	,0	3,6	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



NAYARIT



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
NAYARIT

CARACTERISTICAS		GLOBAL n=1494	MARIGUANA n=210	ALCOHOL n=597	INHALABLES n=38	TABACO n=119	TRANQUILIZANTES n=10	COCAINA* n=263	HEROINA n=31	CRISTAL n=208	ROHYPNOL n=1	D.MEDICAS ** n=11	D.ILEGALES *** n=6
SEXO	MASCULINO	78.9	92.9	73.5	65.8	37.0	80.0	92.8	90.3	86.5	100.0	81.8	100.0
	FEMENINO	21.1	7.1	26.5	34.2	63.0	20.0	7.2	9.7	13.5	.0	18.2	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.2	8.6	1.7	26.3	2.5	.0	1.9	.0	1.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	17.4	28.1	14.6	39.5	16.8	.0	12.9	9.7	17.8	.0	27.3	33.3
	20-24 AÑOS	19.5	24.8	14.2	13.2	13.4	.0	21.7	38.7	28.8	100.0	18.2	16.7
	25-29 AÑOS	15.5	10.0	14.4	7.9	16.0	20.0	21.3	3.2	19.7	.0	18.2	16.7
	30-34 AÑOS	14.9	10.0	15.7	7.9	9.2	20.0	21.3	6.5	15.4	.0	9.1	.0
	35 AÑOS O MAS	29.5	18.6	39.4	5.3	42.0	60.0	20.9	41.9	17.3	.0	27.3	33.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.0	2.9	3.4	2.6	4.2	.0	2.7	.0	2.4	.0	9.1	.0
	PRIMARIA	23.5	25.7	21.3	39.5	22.7	30.0	23.6	25.8	24.0	.0	9.1	66.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	.2	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.8	44.3	32.0	52.6	21.8	40.0	45.2	38.7	44.7	100.0	45.5	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.3	.5	2.8	.0	6.7	.0	1.9	.0	1.0	.0	9.1	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	20.4	20.5	20.8	5.3	20.2	20.0	20.2	22.6	22.6	.0	9.1	33.3
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	12.7	6.2	19.3	.0	23.5	10.0	6.5	12.9	4.8	.0	18.2	.0
	POSGRADO	.1	.0	.2	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CASADO	28.4	11.4	38.0	10.5	35.3	40.0	29.3	6.5	20.2	.0	18.2	.0
	SOLTERO	45.0	61.0	38.2	76.3	35.3	10.0	43.3	45.2	51.0	100.0	54.5	50.0
	DIVORCIADO	2.9	2.9	3.2	2.6	3.4	10.0	3.0	.0	.5	.0	9.1	33.3
	SEPARADO	9.4	8.1	8.5	5.3	7.6	30.0	9.1	32.3	11.1	.0	9.1	16.7
SITUACION LABORAL	VIUDO	1.0	.5	.5	.0	5.0	.0	1.1	.0	1.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	13.3	16.2	11.6	5.3	13.4	10.0	14.1	16.1	16.3	.0	9.1	.0
	ESTUDIANTE	8.3	9.5	11.6	26.3	10.9	.0	2.7	9.7	.5	.0	9.1	.0
	DESEMPLEADO	16.9	21.9	12.4	31.6	6.7	40.0	16.0	35.5	25.5	.0	18.2	.0
	DESCUPADO	6.6	8.6	3.7	15.8	5.9	10.0	7.6	16.1	8.7	.0	18.2	.0
	TRABAJO FIJO	27.4	12.9	34.8	15.8	33.6	10.0	31.2	6.5	18.8	100.0	27.3	16.7
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	33.5	46.2	27.5	10.5	16.0	30.0	39.5	32.3	43.8	.0	27.3	83.3
	AMA DE CASA	6.5	.5	9.4	.0	22.7	10.0	2.3	.0	2.9	.0	.0	.0
	JUBILADO	.8	.5	.7	.0	4.2	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	45.6	24.3	55.6	26.3	73.1	40.0	39.5	51.6	34.1	.0	36.4	33.3
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	36.3	38.1	33.0	52.6	20.2	50.0	39.2	41.9	43.8	100.0	54.5	50.0
	POR INDICACION LEGAL	15.1	31.9	10.2	10.5	.8	10.0	19.4	3.2	17.8	.0	9.1	16.7
POR INDICACION MEDICA	.9	1.4	.3	.0	4.2	.0	.8	3.2	.5	.0	.0	.0	
OTROS	2.1	4.3	.8	10.5	1.7	.0	.0	1.1	.0	3.8	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 NAYARIT**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.LEGALES ***
		n=1494	n=210	n=597	n=38	n=119	n=10	n=263	n=31	n=208	n=1	n=11	n=6
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	48.9	77.6	26.4	43.2	69.8	80.0	54.0	77.4	61.8	.0	54.5	33.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	16.4	10.0	17.1	13.5	10.3	.0	15.7	19.4	26.6	100.0	9.1	.0
	1 VEZ POR SEMANA	18.1	6.7	27.7	18.9	7.8	20.0	18.8	3.2	7.7	.0	18.2	66.7
	1 A 3 VECES POR MES	10.6	3.3	18.6	10.8	6.0	.0	9.2	.0	2.4	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	6.0	2.4	10.3	13.5	6.0	.0	2.3	.0	1.4	.0	18.2	.0
	9 AÑOS O MENOS	3.5	4.8	1.7	5.3	.8	10.0	3.8	6.5	7.2	.0	9.1	.0
	10-14 AÑOS	35.2	51.4	24.0	84.2	30.3	40.0	36.5	51.6	38.9	100.0	45.5	66.7
	15-19 AÑOS	48.7	37.6	57.6	10.5	47.1	20.0	49.4	38.7	45.2	.0	36.4	33.3
	20-24 AÑOS	8.0	5.2	11.1	.0	10.9	10.0	6.1	3.2	5.8	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	2.3	.0	2.5	.0	5.9	10.0	3.0	.0	1.9	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.2	.5	1.7	.0	1.7	10.0	1.1	.0	.0	.0	9.1	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.1	.5	1.5	.0	3.4	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	48.0	21.9	77.4	26.3	27.7	20.0	35.0	25.8	25.5	.0	90.9	16.7
	MARIGUANA	13.7	40.5	2.8	5.3	5.0	30.0	18.3	22.6	16.8	100.0	.0	.0
	INHALABLES	1.5	.5	.3	34.2	.0	10.0	.8	3.2	1.0	.0	.0	16.7
	ALUCINOGENOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	16.7
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.2	.5	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	3.3	.0	.5	7.9	.0	.0	11.8	3.2	5.3	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.5	.0	.2	.0	.0	20.0	.0	.0	1.4	.0	.0	33.3
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	9.1	.0
	ANTICOLINERGICOS	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	30.7	36.7	18.6	26.3	66.4	20.0	30.4	41.9	41.3	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	16.7
	BASUCO	.3	.5	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	1.2	.0	.0	.0	.8	.0	.8	.0	7.2	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.3	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.5	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
NAYARIT

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1463	n=204	n=23	n=717	n=59	n=2	n=458
SEXO	MASCULINO	78.7	96.1	78.3	74.5	83.1	100.0	77.1
	FEMENINO	21.3	3.9	21.7	25.5	16.9	.0	22.9
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.2	3.9	13.0	1.5	1.7	.0	5.2
	15-19 AÑOS	17.2	18.6	43.5	14.6	16.9	.0	19.4
	20-24 AÑOS	19.5	26.5	21.7	16.0	18.6	50.0	21.6
	25-29 AÑOS	15.7	13.7	4.3	16.2	27.1	.0	15.1
	30-34 AÑOS	14.8	18.1	8.7	15.6	16.9	.0	12.2
	35 AÑOS O MAS	29.5	19.1	8.7	36.0	18.6	50.0	26.4
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.1	1.5	4.3	3.5	5.1	.0	2.8
	PRIMARIA	23.4	25.5	43.5	22.6	27.1	.0	22.5
	TECNICO POST-PRIMARIA	.2	.0	.0	.3	.0	.0	.2
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.6	47.1	39.1	34.3	33.9	100.0	38.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.3	.5	.0	3.1	3.4	.0	2.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	20.3	21.1	13.0	19.1	23.7	.0	21.8
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	12.9	4.4	.0	17.2	6.8	.0	11.6
	POSGRADO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4
	SOLTERO	44.8	52.0	73.9	40.2	47.5	.0	47.4
	CASADO	28.6	24.0	17.4	33.6	23.7	50.0	24.0
	DIVORCIADO	2.8	2.5	.0	3.9	3.4	.0	1.3
	SEPARADO	9.3	6.9	4.3	8.5	11.9	50.0	11.4
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.0	.5	.0	.8	3.4	.0	1.1
	UNION LIBRE	13.5	14.2	4.3	13.0	10.2	.0	14.8
	9 AÑOS O MENOS	3.6	3.9	13.0	2.9	1.7	.0	4.1
	10-14 AÑOS	35.2	48.5	73.9	24.0	25.4	50.0	46.1
	15-19 AÑOS	48.7	41.2	13.0	57.6	33.9	50.0	41.7
	20-24 AÑOS	8.1	4.9	.0	10.2	22.0	.0	5.0
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.3	.5	.0	2.5	11.9	.0	1.7
	30-34 AÑOS	1.2	.5	.0	1.3	5.1	.0	.9
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.5	.0	1.5	.0	.0	.4
	DIARIO	49.4	71.1	60.9	24.3	40.7	50.0	79.5
	2 - 3 VECES POR SEMANA	11.4	6.9	8.7	16.5	10.2	50.0	5.7
	1 VEZ POR SEMANA	19.9	9.8	13.0	30.8	33.9	.0	5.9
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	11.8	5.9	8.7	19.1	11.9	.0	3.1
	1 A 11 VECES AL AÑO	7.6	6.4	8.7	9.3	3.4	.0	5.9

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
NAYARIT



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
NAYARIT

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL	
		n=57	n=34	n=3	n=10	n=24	n=1	n=36	n=3	
SEXO	MASCULINO	98.2	97.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	1.8	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	17.9	15.2	33.3	10.0	13.0	.0	20.0	.0	
	15 - 18 AÑOS	82.1	84.8	66.7	90.0	87.0	100.0	80.0	100.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	49.1	58.8	66.7	10.0	45.8	100.0	47.2	100.0	
	SECUNDARIA	38.6	35.3	33.3	60.0	37.5	.0	38.9	.0	
	PREPA	1.8	.0	.0	10.0	.0	.0	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	10.5	5.9	.0	20.0	16.7	.0	13.9	.0	
	ESTUDIANTE	17.9	14.7	.0	11.1	20.8	.0	14.3	66.7	
	EMPLEADO	1.8	2.9	.0	.0	4.2	.0	2.9	.0	
	SUBEMPLEADO	60.7	61.8	.0	66.7	58.3	100.0	60.0	33.3	
USA TATUAJES	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	19.6	20.6	100.0	22.2	16.7	.0	22.9	.0	
	SI	28.1	41.2	.0	30.0	29.2	100.0	30.6	.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	71.9	58.8	100.0	70.0	70.8	.0	69.4	100.0	
	SI	7.0	5.9	33.3	.0	12.5	100.0	2.8	.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	93.0	94.1	66.7	100.0	87.5	.0	97.2	100.0	
	SI	36.8	50.0	66.7	50.0	41.7	.0	33.3	66.7	
TIPO DE INFRACCION	NO	63.2	50.0	33.3	50.0	58.3	100.0	66.7	33.3	
	ROBO	71.9	67.6	100.0	90.0	66.7	.0	69.4	33.3	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	HOMICIDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	5.3	8.8	.0	.0	8.3	.0	5.6	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	7.0	5.9	.0	10.0	4.2	.0	11.1	.0	
	SECUESTRO	1.8	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	10.5	8.8	.0	.0	16.7	100.0	13.9	33.3	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	3.5	5.9	.0	.0	4.2	.0	.0	33.3	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	59.6	55.9	66.7	70.0	50.0	100.0	66.7	100.0
		HOGAR	31.6	35.3	.0	30.0	37.5	.0	27.8	.0
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTRO	8.8	8.8	33.3	.0	12.5	.0	5.6	.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
NAYARIT**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=9	n=5	n=3	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	88,9	100,0	66,7	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	11,1	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	44,4	40,0	33,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	22,2	,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	77,8	60,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,2	20,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	55,6	80,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	22,2	,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,1	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	22,2	20,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	33,3	20,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	22,2	40,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	11,1	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	25,0	20,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	62,5	60,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	12,5	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
NAYARIT**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=9	n=1	n=2	n=2	n=3	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	88,9	,0	100,0	100,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	11,1	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	44,4	,0	50,0	100,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	22,2	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTADO CIVIL	SOLTERO	77,8	100,0	100,0	100,0	33,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,2	,0	50,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	55,6	,0	50,0	50,0	66,7	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	22,2	100,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,1	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	22,2	,0	,0	50,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	33,3	100,0	50,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	22,2	,0	50,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	11,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONÓMICO	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	25,0	,0	,0	100,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	62,5	100,0	100,0	,0	33,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	BAJO	12,5	,0	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TABACO	55,6	,0	50,0	,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALCOHOL	33,3	100,0	50,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MARIGUANA	11,1	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



NUEVO LEON



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
NUEVO LEON**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1315	n=134	n=181	n=49	n=6	n=7	n=880	n=9	n=23	n=2	n=2	n=22
SEXO	MASCULINO	94.4	91.8	91.2	100.0	100.0	14.3	96.0	100.0	91.3	100.0	50.0	86.4
	FEMENINO	5.6	8.2	8.8	.0	.0	85.7	4.0	.0	8.7	.0	50.0	13.6
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.8	2.2	.6	8.2	16.7	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	22.3	36.6	11.0	59.2	33.3	.0	20.3	.0	26.1	.0	50.0	31.8
	20-24 AÑOS	25.6	27.6	12.7	14.3	.0	57.1	28.3	11.1	30.4	.0	.0	40.9
	25-29 AÑOS	18.8	13.4	17.1	10.2	16.7	.0	20.7	22.2	13.0	.0	50.0	18.2
	30-34 AÑOS	14.8	13.4	17.1	4.1	16.7	14.3	15.3	11.1	13.0	50.0	.0	4.5
	35 AÑOS O MAS	16.7	6.7	41.4	4.1	16.7	28.6	13.6	55.6	17.4	50.0	.0	4.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.0	3.0	2.8	14.3	.0	.0	3.9	11.1	8.7	.0	.0	.0
	PRIMARIA	12.5	11.2	9.9	24.5	33.3	.0	13.1	.0	4.3	50.0	.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.7	1.1	.0	.0	.0	.3	.0	4.3	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.7	36.6	26.5	51.0	16.7	.0	40.4	22.2	34.8	50.0	50.0	27.3
	TECNICO POST-SECUNDARIA	4.5	3.0	5.5	.0	.0	.0	5.1	.0	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	25.2	31.3	24.9	8.2	33.3	71.4	24.0	44.4	30.4	.0	50.0	45.5
	LICENCIATURA	14.8	14.2	27.1	2.0	16.7	14.3	12.7	22.2	17.4	.0	.0	27.3
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.7	.0	2.2	.0	.0	14.3	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	CASADO	24.1	13.4	33.1	6.1	16.7	28.6	25.8	33.3	13.0	.0	.0	.0
	SOLTERO	55.2	76.1	45.9	89.8	83.3	14.3	51.1	44.4	60.9	50.0	100.0	90.9
	DIVORCIADO	4.6	4.5	7.2	.0	.0	28.6	4.0	11.1	4.3	.0	.0	9.1
	SEPARADO	6.8	2.2	7.2	2.0	.0	.0	7.7	11.1	13.0	50.0	.0	.0
	VIUDO	.5	.7	1.1	.0	.0	14.3	.3	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	8.7	3.0	5.5	2.0	.0	14.3	11.0	.0	8.7	.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	13.7	32.8	14.4	14.3	33.3	14.3	9.1	.0	39.1	.0	50.0	45.5
	DESEMPLEADO	21.7	17.2	14.9	34.7	16.7	.0	23.5	22.2	21.7	50.0	.0	13.6
	DESOCUPADO	16.0	11.2	9.4	28.6	16.7	.0	17.3	.0	21.7	50.0	50.0	22.7
	TRABAJO FIJO	32.9	22.4	42.5	12.2	33.3	71.4	34.2	66.7	17.4	.0	.0	9.1
	TRABAJO OCASIONAL	13.8	15.7	13.8	10.2	.0	.0	14.7	.0	.0	.0	.0	9.1
	AMA DE CASA	1.4	.7	2.8	.0	.0	14.3	1.1	11.1	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.4	.0	2.2	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	61.8	50.0	60.2	46.9	33.3	71.4	64.5	66.7	73.9	50.0	.0	68.2
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	32.7	42.5	35.4	42.9	66.7	28.6	30.3	22.2	17.4	50.0	100.0	27.3
	POR INDICACION LEGAL	3.3	4.5	3.3	4.1	.0	.0	3.2	11.1	.0	.0	.0	4.5
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	2.0	3.0	1.1	6.1	.0	.0	1.7	.0	8.7	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
NUEVO LEON**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1315	n=134	n=181	n=49	n=6	n=7	n=9	n=23	n=2	n=2	n=22
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	54.3	61.9	45.9	53.1	83.3	85.7	88.9	43.5	50.0	50.0	27.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	17.1	11.9	24.9	14.3	.0	14.3	.0	13.0	.0	.0	27.3
	1 VEZ POR SEMANA	13.9	10.4	17.1	8.2	.0	.0	.0	8.7	.0	.0	22.7
	1 A 3 VECES POR MES	13.8	14.2	11.6	24.5	16.7	.0	11.1	26.1	50.0	50.0	18.2
	1 A 11 VECES AL AÑO	.8	1.5	.6	.0	.0	.0	.0	8.7	.0	.0	4.5
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	3.0	3.0	2.2	10.2	.0	.0	22.2	8.7	50.0	.0	4.5
	10-14 AÑOS	47.3	50.7	33.7	57.1	50.0	28.6	44.4	52.2	.0	100.0	63.6
	15-19 AÑOS	40.8	44.0	50.3	30.6	50.0	28.6	22.2	34.8	.0	.0	22.7
	20-24 AÑOS	5.6	2.2	9.4	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	9.1
	25-29 AÑOS	1.9	.0	1.1	2.0	.0	14.3	11.1	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.8	.0	1.7	.0	.0	14.3	.0	.0	50.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.5	.0	1.7	.0	.0	14.3	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	36.8	37.3	67.4	10.2	.0	42.9	22.2	21.7	.0	50.0	54.5
	MARIGUANA	22.7	32.1	5.5	10.2	.0	14.3	33.3	17.4	.0	.0	36.4
	INHALABLES	10.3	6.7	3.3	57.1	.0	.0	.0	8.7	.0	50.0	4.5
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.5
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	4.3	.7	2.2	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.4	.7	.0	.0	.0	28.6	.0	.0	50.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	21.6	19.4	21.5	20.4	100.0	14.3	44.4	39.1	50.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.4	.7	.0	.0	.0	.0	.0	4.3	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	2.6	2.2	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio,
2007
NUEVO LEON

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=1294	n=299	n=136	n=484	n=91	n=284
SEXO	MASCULINO	94.6	99.0	99.3	91.3	94.5	93.3
	FEMENINO	5.4	1.0	.7	8.7	5.5	6.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.9	1.3	7.4	.6	2.2	1.8
	15-19 AÑOS	22.2	20.7	33.1	16.9	28.6	25.4
	20-24 AÑOS	25.9	30.1	32.4	23.1	28.6	22.2
	25-29 AÑOS	18.9	25.4	13.2	16.7	16.5	19.4
	30-34 AÑOS	14.7	13.4	11.8	17.6	13.2	13.0
	35 AÑOS O MAS	16.5	9.0	2.2	25.0	11.0	18.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.9	6.4	9.6	2.7	4.4	.7
	PRIMARIA	12.3	17.1	27.9	7.2	12.1	8.5
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.7	.7	.4	.0	.7
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.8	45.5	45.6	29.2	41.8	39.4
	TECNICO POST-SECUNDARIA	4.5	3.3	4.4	5.4	7.7	3.2
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	25.4	20.7	9.6	31.7	25.3	27.5
	LICENCIATURA	14.8	6.0	2.2	22.2	8.8	19.4
	POSGRADO	.7	.3	.0	1.2	.0	.7
ESTADO CIVIL	SOLTERO	55.4	56.5	69.9	51.0	60.4	53.2
	CASADO	23.8	20.1	14.7	28.7	23.1	23.9
	DIVORCIADO	4.6	4.7	.7	5.4	3.3	5.3
	SEPARADO	6.9	7.0	7.4	5.2	4.4	10.2
	VIUDO	.5	.0	.0	.6	.0	1.4
	UNION LIBRE	8.8	11.7	7.4	9.1	8.8	6.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	3.0	1.0	8.8	2.3	1.1	4.2
	10-14 AÑOS	47.4	49.8	62.5	39.0	14.3	62.3
	15-19 AÑOS	41.0	40.1	27.2	50.0	48.4	30.6
	20-24 AÑOS	5.6	6.7	.7	5.6	19.8	2.1
	25-29 AÑOS	1.9	2.3	.7	1.0	11.0	.7
	30-34 AÑOS	.6	.0	.0	1.2	2.2	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.5	.0	.0	.8	3.3	.0
	DIARIO	44.6	50.5	33.1	24.2	30.8	83.1
	2 - 3 VECES POR SEMANA	16.1	10.7	14.7	26.4	16.5	4.6
	1 VEZ POR SEMANA	16.2	9.4	18.4	27.3	19.8	2.1
	1 A 3 VECES POR MES	21.6	27.4	33.1	20.5	30.8	9.2
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.5	2.0	.7	1.7	2.2	1.1

* Cocaína, Basuco y Crack.



Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
NUEVO LEON



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
NUEVO LEON**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=0	n=1	n=2	n=2	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=124 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
NUEVO LEON**

PATOLOGIAS (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=38	n=51	n=4	n=6	n=1	n=2	n=11	n=2	n=6	n=1	n=1
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.3	2.0	50.0	33.3	100.0	.0	9.1	50.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	2.6	.0	25.0	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	2.6	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	10.5	13.7	.0	33.3	.0	.0	18.2	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEOMUSCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	2.6	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	10.5	15.7	25.0	16.7	.0	.0	18.2	50.0	16.7	.0	.0
NINGUNA	50.0	47.1	25.0	16.7	.0	100.0	27.3	.0	50.0	100.0	100.0

N=124

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
NUEVO LEON

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1296	n=794	n=287	n=102	n=25	n=81	n=1	n=0	n=0	n=6	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	84,3	82,9	84,7	96,1	72,0	86,4	100,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	FEMENINO	15,7	17,1	15,3	3,9	28,0	13,6	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	8,1	7,2	5,3	8,9	8,3	24,7	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	15-19	28,4	29,9	22,8	34,7	41,7	22,2	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	20-24	19,9	18,6	20,4	25,7	29,2	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,9	16,2	16,8	11,9	8,3	14,8	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	30-34	12,1	12,2	15,1	6,9	,0	11,1	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	35 Y MAS	15,6	15,8	19,6	11,9	12,5	4,9	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	49,2	49,5	42,9	60,8	56,0	53,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	CASADO	23,6	23,4	25,8	18,6	8,0	29,6	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	U. LIBRE	10,9	9,8	12,9	13,7	12,0	9,9	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	SEPARADO	11,0	11,7	11,1	4,9	20,0	6,2	100,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	DIVORCIADO	1,7	1,9	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,3	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,4	3,1	4,9	2,0	4,0	1,2	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESC	,2	,1	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBI	,1	,0	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	15,1	14,6	11,4	12,7	16,0	35,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	50,4	50,1	47,0	62,7	44,0	51,9	100,0	,0	,0	40,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	7,1	7,6	6,4	6,9	4,0	4,9	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	BACHILLERATO	20,7	20,9	25,3	16,7	28,0	6,2	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	LICENCIATURA	6,4	6,6	8,9	1,0	8,0	1,2	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,1	,0	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,0	10,8	11,2	11,5	8,3	13,2	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,2	1,9	1,8	2,1	4,2	6,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	26,1	26,0	33,1	19,8	8,3	17,1	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	20,9	18,2	21,9	35,4	20,8	25,0	100,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	DESEMPLEADO	10,2	10,0	10,1	11,5	16,7	10,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	24,9	27,8	18,0	19,8	33,3	23,7	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,0	4,5	3,6	,0	8,3	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,6	,8	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,1	1,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	13,9	14,7	14,4	12,0	8,3	7,5	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	MEDIO BAJO	63,5	63,8	63,3	67,0	70,8	55,0	100,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	BAJO	20,3	20,1	18,7	20,0	20,8	28,8	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,2	,4	1,4	1,0	,0	8,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
NUEVO LEÓN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1296	n=58	n=197	n=128	n=729	n=143	n=10	n=2	n=4	n=10	n=6	n=1
SEXO	MASCULINO	84,2	65,5	86,8	85,9	87,7	71,3	80,0	100,0	100,0	80,0	33,3	100,0
	FEMENINO	15,8	34,5	13,2	14,1	12,3	28,7	20,0	,0	,0	20,0	66,7	,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	8,1	12,1	3,1	15,6	2,2	35,9	,0	,0	,0	30,0	,0	,0
	15-19	28,1	19,0	15,8	53,9	24,1	49,3	10,0	50,0	,0	30,0	,0	,0
	20-24	19,9	3,4	13,8	14,1	26,3	7,0	20,0	,0	100,0	10,0	16,7	,0
	25-29	15,9	5,2	13,8	7,0	20,9	3,5	20,0	50,0	,0	20,0	66,7	,0
	30-34	12,2	10,3	15,3	4,7	14,5	2,1	50,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	35 Y MAS	15,7	50,0	38,3	4,7	11,9	2,1	,0	,0	,0	10,0	16,7	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	48,8	39,7	34,5	74,2	42,4	83,9	20,0	50,0	75,0	70,0	16,7	,0
	CASADO	23,8	37,9	32,0	10,2	26,6	2,1	40,0	50,0	,0	20,0	66,7	,0
	U. LIBRE	10,9	5,2	11,7	7,0	13,2	6,3	,0	,0	25,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	11,0	10,3	14,7	4,7	12,9	3,5	10,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	DIVORCIADO	1,7	5,2	2,0	,8	1,5	,0	30,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,3	,0	1,0	,0	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,4	1,7	4,1	3,1	3,2	4,2	,0	,0	,0	10,0	16,7	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,2	,0	,5	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,1	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	15,2	19,0	18,8	11,7	13,1	25,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	50,4	36,2	42,9	46,1	51,9	63,1	50,0	50,0	,0	60,0	50,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	7,1	10,3	4,7	7,0	8,4	2,1	10,0	,0	,0	10,0	25,0	,0
	BACHILLERATO	20,6	20,7	23,0	29,7	20,6	8,5	30,0	,0	25,0	30,0	,0	,0
	LICENCIATURA	6,4	13,8	9,4	5,5	5,8	,7	10,0	50,0	75,0	,0	25,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	ESTUDIANTE	10,8	14,5	8,0	32,0	3,0	31,6	10,0	50,0	,0	50,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,3	3,6	2,1	7,2	1,3	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	26,3	34,5	41,5	12,0	27,8	8,1	10,0	50,0	,0	20,0	40,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	21,0	9,1	22,9	20,0	24,0	11,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	10,3	3,6	6,9	10,4	12,6	8,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	24,8	16,4	13,8	16,8	27,0	33,8	80,0	,0	50,0	30,0	60,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,0	10,9	3,7	1,6	4,2	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,6	7,3	1,1	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,1	1,9	3,1	,8	,7	,0	,0	,0	25,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	13,9	22,6	15,0	14,3	13,3	9,2	10,0	50,0	50,0	20,0	33,3	,0
	MEDIO BAJO	63,6	64,2	62,2	69,8	64,5	56,7	50,0	,0	25,0	80,0	66,7	100,0
	BAJO	20,2	11,3	18,7	13,5	21,2	27,7	40,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,2	,0	1,0	1,6	,3	6,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	61,1	87,9	52,8	57,0	63,8	53,1	60,0	50,0	75,0	50,0	50,0	,0
	ALCOHOL	22,2	10,3	42,6	18,0	19,2	17,5	30,0	50,0	,0	20,0	16,7	100,0
	MARIGUANA	7,9	1,7	4,1	19,5	8,2	4,9	,0	,0	,0	,0	16,7	,0
	COCAÍNA	1,9	,0	,0	1,6	3,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	6,3	,0	,5	3,9	5,1	24,5	10,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,1	,0	,0	,0	,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,5	,0	,0	,0	,5	,0	,0	,0	,0	10,0	16,7	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



OAXACA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
OAXACA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	REFRACTIL	D.MEDICAS **
		n=867	n=67	n=580	n=13	n=5	n=5	n=159	n=32	n=4	n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	90.3	95.5	92.2	84.6	60.0	20.0	84.9	93.8	100.0	.0	.0
	FEMENINO	9.7	4.5	7.8	15.4	40.0	80.0	15.1	6.3	.0	100.0	100.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	6.0	.7	7.7	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	10.1	22.4	5.2	38.5	20.0	.0	20.8	9.4	25.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	13.1	29.9	8.1	23.1	.0	20.0	20.1	31.3	25.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	14.2	11.9	10.7	.0	20.0	.0	24.5	34.4	25.0	100.0	.0
	30-34 AÑOS	13.1	13.4	12.4	.0	20.0	20.0	17.0	12.5	.0	.0	.0
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	48.1	16.4	62.9	30.8	40.0	60.0	16.4	12.5	25.0	.0	100.0
	NO FUE A LA ESCUELA	5.8	.0	8.3	.0	20.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	38.9	31.3	44.8	23.1	20.0	40.0	21.4	37.5	75.0	.0	100.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.7	3.0	.5	.0	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAIONAL	29.5	41.8	25.5	61.5	20.0	40.0	36.5	31.3	.0	100.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.6	.0	.5	.0	20.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.6	16.4	11.2	15.4	.0	20.0	29.6	25.0	25.0	.0	.0
	LICENCIATURA	8.3	6.0	8.3	.0	.0	.0	11.3	6.3	.0	.0	.0
	POSGRADO	.7	1.5	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ESTADO CIVIL	CASADO	34.3	11.9	42.9	7.7	.0	40.0	20.8	6.3	.0	100.0
SOLTERO		43.9	68.7	34.8	76.9	100.0	40.0	59.7	59.4	50.0	.0	.0
DIVORCIADO		3.1	.0	2.9	.0	.0	.0	5.0	3.1	25.0	.0	.0
SEPARADO		6.9	7.5	6.6	7.7	.0	20.0	5.7	18.8	.0	.0	.0
VIUDO		.8	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	11.0	11.9	11.6	7.7	.0	.0	8.8	12.5	25.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	5.8	16.4	2.6	38.5	.0	.0	10.1	9.4	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	16.3	22.4	12.1	7.7	.0	20.0	25.8	37.5	25.0	.0	.0
	DESOcupADO	11.8	17.9	10.7	.0	80.0	40.0	10.7	15.6	.0	.0	.0
	TRABAJO FIJO	22.8	20.9	22.8	15.4	.0	.0	28.3	9.4	25.0	100.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	39.8	22.4	47.9	38.5	20.0	.0	23.3	21.9	50.0	.0	.0
	AMA DE CASA	3.2	.0	3.4	.0	.0	40.0	1.9	6.3	.0	.0	100.0
	JUBILADO	.3	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	22.0	31.3	13.8	30.8	.0	.0	43.4	50.0	25.0	.0	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	75.9	67.2	84.7	69.2	80.0	40.0	56.6	40.6	75.0	100.0	.0
OTROS	POR INDICACION LEGAL	.6	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	1.0	.0	.2	.0	20.0	60.0	.0	9.4	.0	.0	100.0
	OTROS	.5	1.5	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
OAXACA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	REFRACTIL	D.MEDICAS **
		n=867	n=67	n=580	n=13	n=5	n=5	n=159	n=32	n=4	n=1	n=
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	94.2	89.6	94.1	100.0	100.0	100.0	95.0	96.9	100.0	100.0	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	1.6	6.0	1.0	.0	.0	.0	1.9	3.1	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	2.7	1.5	3.1	.0	.0	.0	2.5	.0	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	1.4	1.5	1.7	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	2.2	7.5	2.1	7.7	.0	.0	.0	3.1	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	31.1	32.8	26.7	46.2	.0	.0	40.3	62.5	50.0	100.0	.0
	15-19 AÑOS	46.0	56.7	47.4	38.5	60.0	20.0	40.9	31.3	50.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	13.1	3.0	15.2	7.7	40.0	20.0	12.6	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	5.1	.0	6.0	.0	.0	40.0	3.8	3.1	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.0	.0	1.0	.0	.0	.0	1.9	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	1.6	.0	.0	20.0	.6	.0	.0	.0	100.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	78.7	43.3	97.8	23.1	.0	.0	45.3	25.0	50.0	100.0	.0
	MARIGUANA	9.9	53.7	1.0	15.4	.0	.0	17.0	40.6	50.0	.0	.0
	INHALABLES	2.0	3.0	.3	61.5	.0	.0	.6	12.5	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	12.5	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.1	.0	.3	.0	.0	.0	25.8	3.1	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.6	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	2.1	.0	.5	.0	100.0	.0	5.0	6.3	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.9	.0	.0	.0	.0	.0	5.0	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTEN	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
OAXACA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=860	n=86	n=17	n=682	n=53	n=4	n=
SEXO	MASCULINO	90.8	90.7	82.4	91.6	90.6	100.0	66.7
	FEMENINO	9.2	9.3	17.6	8.4	9.4	.0	33.3
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	4.7	5.9	.7	1.9	.0	.0
	15-19 AÑOS	10.2	31.4	23.5	6.5	20.8	.0	11.1
	20-24 AÑOS	13.1	22.1	29.4	10.1	26.4	50.0	22.2
	25-29 AÑOS	14.2	15.1	11.8	13.6	20.8	25.0	11.1
	30-34 AÑOS	13.1	11.6	5.9	12.6	18.9	25.0	27.8
	35 AÑOS O MAS	48.0	15.1	23.5	56.5	11.3	.0	27.8
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	5.8	.0	.0	7.2	.0	.0	5.6
	PRIMARIA	38.8	25.6	35.3	42.5	24.5	25.0	11.1
	TECNICO POST-PRIMARIA	.7	1.2	.0	.6	.0	.0	5.6
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	29.4	41.9	41.2	27.0	30.2	25.0	50.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.6	.0	.0	.4	1.9	.0	5.6
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.6	25.6	23.5	12.5	34.0	50.0	16.7
	LICENCIATURA	8.4	4.7	.0	9.1	9.4	.0	5.6
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.7	1.2	.0	.7	.0	.0	.0
	SOLTERO	44.0	67.4	64.7	39.6	47.2	50.0	66.7
	CASADO	34.2	11.6	11.8	38.4	30.2	25.0	16.7
	DIVORCIADO	3.1	2.3	5.9	3.2	3.8	.0	.0
	SEPARADO	6.9	4.7	5.9	6.7	11.3	25.0	5.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	.8	.0	.0	1.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	11.0	14.0	11.8	11.0	7.5	.0	11.1
	9 AÑOS O MENOS	2.2	3.5	.0	2.3	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	31.3	45.3	47.1	29.5	20.8	25.0	50.0
	15-19 AÑOS	46.3	46.5	47.1	47.4	37.7	50.0	27.8
	20-24 AÑOS	13.1	4.7	5.9	13.3	24.5	.0	22.2
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	4.9	.0	.0	5.3	9.4	25.0	.0
	30-34 AÑOS	1.0	.0	.0	.7	7.5	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.2	.0	.0	1.5	.0	.0	.0
	DIARIO	31.4	60.5	52.9	23.8	54.7	100.0	77.8
	2 - 3 VECES POR SEMANA	6.5	8.1	5.9	6.0	11.3	.0	5.6
	1 VEZ POR SEMANA	20.6	16.3	29.4	21.8	17.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	40.7	12.8	11.8	47.8	17.0	.0	11.1
1 A 11 VECES AL AÑO	.8	2.3	.0	.6	.0	.0	5.6	

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007 OAXACA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
OAXACA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO TOT	
		n=71	n=36	n=6	n=16	n=15	n=5	n=25	
SEXO	MASCULINO	97.2	100.0	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	
	FEMENINO	2.8	.0	.0	.0	6.7	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	15 - 18 AÑOS	97.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	46.5	44.4	66.7	50.0	33.3	60.0	48.0	
	SECUNDARIA	40.8	50.0	33.3	37.5	46.7	20.0	40.0	
	PREPA	5.6	5.6	.0	6.3	6.7	.0	8.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NO ESTUDIO	7.0	.0	.0	6.3	13.3	20.0	4.0	
OCUPACION	ESTUDIANTE	19.7	22.2	.0	18.8	6.7	.0	24.0	
	EMPLEADO	43.7	50.0	33.3	50.0	33.3	40.0	52.0	
	SUBEMPLEADO	32.4	25.0	50.0	31.3	53.3	60.0	24.0	
HOGAR	HOGAR	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	2.8	2.8	16.7	.0	6.7	.0	.0	
USA TATUAJES	SI	52.1	66.7	66.7	68.8	60.0	80.0	56.0	
	NO	47.9	33.3	33.3	31.3	40.0	20.0	44.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	15.5	19.4	50.0	18.8	20.0	40.0	16.0	
	NO	84.5	80.6	50.0	81.3	80.0	60.0	84.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	25.4	30.6	83.3	43.8	40.0	20.0	20.0	
	NO	74.6	69.4	16.7	56.3	60.0	80.0	80.0	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	38.0	38.9	33.3	37.5	46.7	80.0	28.0	
	VIOLACION	22.5	22.2	.0	25.0	20.0	.0	36.0	
	HOMICIDIO	31.0	30.6	33.3	31.3	26.7	.0	28.0	
	LESIONES A TERCEROS	8.5	5.6	16.7	.0	13.3	.0	8.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	4.2	2.8	.0	.0	6.7	.0	4.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	7.0	8.3	33.3	12.5	13.3	20.0	12.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	66.2	63.9	50.0	37.5	60.0	60.0	56.0
		HOGAR	25.4	25.0	33.3	43.8	33.3	40.0	32.0
		TRABAJO	4.2	2.8	.0	6.3	.0	.0	4.0
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO	2.8	5.6	16.7	6.3	.0	.0	4.0		
OTRO	1.4	2.8	.0	6.3	6.7	.0	4.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
OAXACA**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	DROGA									
	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=16	n=0	n=0	n=2	n=2	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	27.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	27.3	.0	.0	50.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=691 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 OAXACA**

PATOLOGIA (%)	TABACO n=133	ALCOHOL n=277	ANALGESICOS n=173	TRANQUILIZANTES n=27	ANTIDEPRESIVOS n=10	ANFETAMINAS n=5	MARIGUANA n=14	INHALABLES n=5	COCAINA n=11	HEROINA n=1	ALUCINOGENOS n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	3.8	3.6	6.9	.0	.0	.0	7.1	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	1.5	.7	.6	.0	.0	.0	7.1	.0	9.1	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.8	.7	1.2	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	3.0	5.1	10.4	14.8	.0	20.0	7.1	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.8	1.1	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION. NEUROLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	6.8	6.5	5.8	.0	.0	40.0	14.3	.0	18.2	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.8	.4	.6	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	1.5	4.0	4.6	.0	.0	.0	7.1	.0	9.1	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	2.3	1.8	.6	3.7	10.0	.0	14.3	40.0	18.2	100.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.7	2.9	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEIO-MUSCULAR	3.8	1.4	3.5	.0	.0	.0	14.3	20.0	18.2	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.8	1.8	.6	3.7	10.0	20.0	.0	.0	9.1	.0	.0
DIABETES MELLITUS	7.5	7.6	17.3	29.6	10.0	20.0	7.1	.0	9.1	.0	.0
SIDA	1.5	.7	.6	.0	.0	.0	.0	.0	9.1	.0	.0
OTRAS	24.1	18.8	32.4	29.6	20.0	.0	7.1	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	3.8	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=691

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
OAXACA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=160	n=75	n=75	n=3	n=2	n=4	n=0	n=0	n=1	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	81,9	84,0	78,7	100,0	50,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	18,1	16,0	21,3	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,5	5,5	6,9	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	37,4	38,4	37,5	33,3	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	21,3	27,4	15,3	,0	50,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	11,6	13,7	8,3	33,3	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	30-34	5,2	2,7	6,9	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	18,1	12,3	25,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	63,8	73,3	52,0	66,7	50,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	CASADO	15,0	12,0	18,7	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	12,5	10,7	14,7	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	6,3	4,0	9,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,9	,0	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,3	,0	1,3	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	18,1	18,7	18,7	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	37,5	33,3	38,7	100,0	,0	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	,6	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	30,0	36,0	26,7	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	12,5	10,7	14,7	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	25,0	23,3	29,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,3	5,5	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	27,0	20,5	31,9	33,3	50,0	25,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	19,7	28,8	13,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,6	6,8	10,1	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	14,5	13,7	11,6	33,3	50,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	2,0	1,4	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	12,3	15,3	11,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
MEDIO BAJO	59,4	58,3	63,0	66,7	50,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
BAJO	24,5	20,8	26,0	33,3	,0	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	3,9	5,6	,0	,0	50,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
OAXACA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=160	n=13	n=70	n=16	n=46	n=6	n=1	n=0	n=1	n=0	n=3	n=0
SEXO	MASCULINO	82,1	84,6	74,3	93,8	89,1	66,7	100,0	,0	100,0	,0	100,0	,0
	FEMENINO	17,9	15,4	25,7	6,3	10,9	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,6	7,7	7,2	,0	,0	66,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	37,1	46,2	33,3	73,3	32,6	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	21,2	7,7	13,0	20,0	37,2	,0	,0	,0	100,0	,0	66,7	,0
	25-29	11,9	15,4	11,6	6,7	14,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	5,3	,0	7,2	,0	7,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	17,9	23,1	27,5	,0	9,3	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	64,1	69,2	58,6	87,5	56,5	100,0	100,0	,0	,0	,0	100,0	,0
	CASADO	14,7	15,4	22,9	,0	10,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	12,2	7,7	4,3	6,3	28,3	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	6,4	,0	10,0	6,3	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,9	7,7	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,3	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	17,3	15,4	14,3	,0	23,9	33,3	,0	,0	,0	,0	66,7	,0
	SECUNDARIA	37,8	23,1	40,0	43,8	37,0	33,3	100,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	,6	,0	,0	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	30,8	61,5	25,7	56,3	21,7	33,3	,0	,0	,0	,0	33,3	,0
	LICENCIATURA	12,2	,0	17,1	,0	15,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	25,0	23,1	25,0	50,0	7,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,4	15,4	1,5	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	LABORAL ESTABLE	26,4	15,4	30,9	6,3	34,1	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	20,3	23,1	19,1	6,3	31,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,8	,0	10,3	6,3	9,8	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	14,2	15,4	11,8	25,0	14,6	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	2,0	7,7	1,5	,0	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	12,6	50,0	11,8	12,5	4,5	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	MEDIO BAJO	58,9	25,0	61,8	75,0	65,9	,0	100,0	,0	,0	,0	66,7	,0
	BAJO	25,2	25,0	25,0	6,3	29,5	33,3	,0	,0	100,0	,0	33,3	,0
	POBREZA EXTREMA	3,3	,0	1,5	6,3	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TABACO	46,8	69,2	37,1	62,5	47,8	66,7	,0	,0	,0	,0	66,7	,0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	47,4	30,8	57,1	31,3	43,5	33,3	100,0	,0	100,0	,0	33,3	,0
	MARIGUANA	1,9	,0	2,9	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	1,3	,0	1,4	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	1,9	,0	1,4	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,6	,0	,0	,0	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



PUEBLA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
PUEBLA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***	
		n=1586	n=109	n=980	n=159	n=90	n=6	n=199	n=27	n=6	n=1	n=2	n=7	
SEXO	MASCULINO	90.2	99.1	90.9	86.2	92.2	66.7	86.9	74.1	100.0	.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	9.8	.9	9.1	13.8	7.8	33.3	13.1	25.9	.0	100.0	.0	.0	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.8	4.6	1.2	12.6	2.2	.0	2.5	.0	.0	.0	.0	.0	
	15-19 AÑOS	11.7	17.4	5.3	44.7	8.9	.0	16.1	7.4	33.3	.0	.0	.0	
	20-24 AÑOS	13.4	22.9	6.9	18.9	31.1	33.3	22.6	55.6	.0	.0	.0	.0	
	25-29 AÑOS	13.3	24.8	9.2	9.4	20.0	.0	24.6	22.2	.0	.0	100.0	57.1	
	30-34 AÑOS	10.8	10.1	11.2	5.7	14.4	.0	11.6	7.4	16.7	.0	.0	42.9	
	35 AÑOS O MAS	47.9	20.2	66.1	8.8	23.3	66.7	22.6	7.4	50.0	100.0	.0	.0	
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	8.5	7.3	11.0	6.3	5.6	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PRIMARIA	36.5	38.5	39.8	37.7	31.1	83.3	20.4	22.2	83.3	.0	100.0	.0	
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.0	.0	1.0	.6	.0	.0	1.0	7.4	.0	.0	.0	14.3	
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	32.2	43.1	26.9	46.5	35.6	.0	41.8	40.7	.0	.0	.0	.0	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.0	.0	1.8	1.3	2.2	16.7	3.1	3.7	.0	100.0	.0	.0	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.1	11.0	12.5	7.5	17.8	.0	25.0	25.9	16.7	.0	.0	42.9	
	LICENCIATURA	5.5	.0	6.6	.0	7.8	.0	6.6	.0	.0	.0	.0	42.9	
	POSGRADO	.2	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTADO CIVIL	CASADO	26.5	16.5	33.4	5.0	12.5	50.0	20.9	22.2	16.7	100.0	.0	42.9
		SOLTERO	40.9	55.0	32.7	74.2	38.6	50.0	46.9	44.4	83.3	.0	.0	42.9
DIVORCIADO		3.2	3.7	3.8	.6	3.4	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	14.3	
SEPARADO		9.9	9.2	10.6	8.2	14.8	.0	7.7	7.4	.0	.0	.0	.0	
VIUDO		2.2	.0	2.8	.6	5.7	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	17.3	15.6	16.8	11.3	25.0	.0	21.9	25.9	.0	.0	100.0	.0	
	ESTUDIANTE	5.6	8.5	3.0	12.7	10.3	.0	9.6	7.4	.0	.0	.0	.0	
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	DESEMPLEADO	15.7	21.7	12.3	24.1	9.2	.0	23.7	29.6	50.0	.0	.0	.0	
	DESOCUPADO	8.1	2.8	6.6	12.7	14.9	.0	11.1	3.7	33.3	.0	100.0	.0	
	TRABAJO FIJO	29.9	30.2	34.2	19.0	8.0	16.7	26.8	29.6	16.7	.0	.0	85.7	
	TRABAJO OCASIONAL	36.8	36.8	38.7	30.4	55.2	66.7	27.3	25.9	.0	.0	.0	14.3	
	AMA DE CASA	2.5	.0	3.2	1.3	.0	16.7	1.5	3.7	.0	100.0	.0	.0	
	JUBILADO	1.3	.0	2.0	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	VOLUNTARIO	31.8	37.6	24.2	25.8	75.6	33.3	46.0	44.4	50.0	.0	100.0	100.0	
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	64.0	56.9	72.4	72.3	15.6	66.7	47.5	55.6	.0	100.0	.0	.0	
	POR INDICACION LEGAL	2.2	2.8	1.6	.0	.0	.0	6.6	.0	50.0	.0	.0	.0	
	POR INDICACION MEDICA	.9	2.8	1.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	1.0	.0	.7	.6	8.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
PUEBLA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1586	n=109	n=980	n=159	n=90	n=6	n=199	n=27	n=6	n=1	n=2	n=7
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	57.1	67.0	52.1	68.6	88.5	83.3	51.8	66.7	66.7	100.0	100.0	14.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	12.9	15.6	12.6	13.8	3.4	.0	17.1	.0	33.3	.0	.0	42.9
	1 VEZ POR SEMANA	17.0	5.5	19.8	12.6	3.4	16.7	20.2	7.4	.0	.0	.0	42.9
	1 A 3 VECES POR MES	9.6	5.5	11.4	4.4	4.6	.0	8.8	18.5	.0	.0	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	3.4	6.4	4.1	.6	.0	.0	2.1	7.4	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.9	6.4	3.5	8.2	4.4	.0	6.0	7.4	50.0	.0	100.0	.0
	10-14 AÑOS	35.9	46.8	29.9	55.3	43.3	66.7	40.2	44.4	33.3	.0	.0	14.3
	15-19 AÑOS	40.7	44.0	42.4	30.2	43.3	.0	40.2	29.6	16.7	.0	.0	85.7
	20-24 AÑOS	10.0	2.8	12.0	5.0	5.6	16.7	9.5	14.8	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	4.0	.0	5.6	1.3	3.3	.0	1.5	3.7	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.5	.0	2.2	.0	.0	.0	.5	.0	.0	100.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	3.0	.0	4.3	.0	.0	16.7	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	65.1	32.1	86.0	20.8	34.4	16.7	38.7	29.6	16.7	100.0	100.0
	MARIGUANA	7.6	33.9	2.0	9.4	2.2	.0	17.6	22.2	.0	.0	.0	85.7
	INHALABLES	8.1	10.1	.9	48.4	2.2	33.3	12.1	.0	50.0	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.1	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.8	.0	.0	.6	.0	.0	.5	40.7	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	2.5	2.8	.9	.6	.0	.0	13.6	.0	.0	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.4	.9	.1	.6	.0	50.0	.0	3.7	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	14.2	19.3	10.0	16.4	61.1	.0	12.6	3.7	.0	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	33.3	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRACK	.6	.9	.0	2.5	.0	.0	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
	REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
PUEBLA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1572	n=121	n=128	n=1033	n=51	n=13	n=226
SEXO	MASCULINO	90.3	89.3	81.3	91.5	80.4	84.6	92.9
	FEMENINO	9.7	10.7	18.8	8.5	19.6	15.4	7.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.8	4.1	12.5	1.2	2.0	.0	4.4
	15-19 AÑOS	11.6	20.7	32.8	7.4	23.5	7.7	11.5
	20-24 AÑOS	13.3	26.4	20.3	8.6	31.4	61.5	16.8
	25-29 AÑOS	13.4	21.5	16.4	10.9	13.7	15.4	18.6
	30-34 AÑOS	10.9	9.9	6.3	12.4	7.8	7.7	8.0
	35 AÑOS O MAS	48.0	17.4	11.7	59.5	21.6	7.7	40.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	8.5	2.5	9.4	9.9	3.9	7.7	6.2
	PRIMARIA	36.5	25.6	36.7	39.5	25.5	23.1	32.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.0	.8	.8	1.2	.0	15.4	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	32.1	42.1	46.9	27.1	43.1	7.7	39.4
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.9	3.3	.0	1.8	2.0	7.7	2.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.2	20.7	6.3	14.6	21.6	38.5	10.2
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	5.6	5.0	.0	5.8	3.9	.0	8.8
	POSGRADO	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.4
	SOLTERO	40.9	54.5	72.7	34.5	52.9	61.5	41.1
	CASADO	26.6	14.0	7.0	32.9	19.6	30.8	17.0
	DIVORCIADO	3.1	1.7	.8	3.3	5.9	.0	3.6
	SEPARADO	10.0	13.2	5.5	9.9	11.8	.0	11.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	2.2	.8	.0	2.5	.0	.0	3.1
	UNION LIBRE	17.2	15.7	14.1	16.9	9.8	7.7	23.7
	9 AÑOS O MENOS	4.9	5.0	14.1	3.5	2.0	.0	7.1
	10-14 AÑOS	35.8	43.8	51.6	29.9	29.4	.0	53.1
	15-19 AÑOS	40.8	47.1	30.5	43.5	41.2	53.8	30.5
	20-24 AÑOS	10.0	4.1	3.9	12.0	15.7	30.8	4.9
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	4.1	.0	.0	5.3	3.9	15.4	2.2
	30-34 AÑOS	1.5	.0	.0	2.0	.0	.0	.9
	35 AÑOS Y MAS	2.9	.0	.0	3.8	7.8	.0	1.3
	DIARIO	45.5	57.0	60.2	36.3	41.2	38.5	74.8
	2 - 3 VECES POR SEMANA	13.0	11.6	18.8	13.6	27.5	.0	5.3
	1 VEZ POR SEMANA	20.7	8.3	12.5	26.1	13.7	.0	9.7
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	16.0	19.8	8.6	17.9	11.8	46.2	8.8
	1 A 11 VECES AL AÑO	4.8	3.3	.0	6.1	5.9	15.4	1.3

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
PUEBLA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
 PUEBLA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	
		n=85	n=32	n=25	n=69	n=7	n=1	n=64	
SEXO	MASCULINO	92.9	96.9	100.0	91.3	71.4	100.0	92.2	
	FEMENINO	7.1	3.1	.0	8.7	28.6	.0	7.8	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	5.0	3.3	4.0	6.3	.0	.0	6.8	
	15 - 18 AÑOS	95.0	96.7	96.0	93.8	100.0	100.0	93.2	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	54.1	59.4	44.0	58.0	28.6	100.0	56.3	
	SECUNDARIA	36.5	31.3	48.0	30.4	71.4	.0	34.4	
	PREPA	2.4	3.1	.0	2.9	.0	.0	3.1	
	LICENCIATURA O POSGRADO	1.2	.0	.0	1.4	.0	.0	1.6	
OCUPACION	NO ESTUDIO	5.9	6.3	8.0	7.2	.0	.0	4.7	
	ESTUDIANTE	10.6	9.4	8.0	13.0	14.3	.0	12.5	
	EMPLEADO	14.1	9.4	12.0	15.9	14.3	.0	17.2	
	SUBEMPLEADO	63.5	65.6	64.0	59.4	28.6	100.0	60.9	
HOGAR	HOGAR	1.2	.0	.0	1.4	.0	.0	1.6	
	NINGUNA	10.6	15.6	16.0	10.1	42.9	.0	7.8	
USA TATUAJES	SI	35.3	53.1	48.0	33.3	42.9	100.0	34.4	
	NO	64.7	46.9	52.0	66.7	57.1	.0	65.6	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	8.2	12.5	12.0	7.2	28.6	100.0	7.8	
	NO	91.8	87.5	88.0	92.8	71.4	.0	92.2	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	32.9	31.3	48.0	33.3	71.4	.0	28.1	
	NO	67.1	68.8	52.0	66.7	28.6	100.0	71.9	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	67.1	65.6	52.0	62.3	71.4	100.0	68.8	
	VIOLACION	14.1	15.6	12.0	15.9	.0	.0	15.6	
	HOMICIDIO	9.4	3.1	20.0	11.6	.0	.0	9.4	
	LESIONES A TERCEROS	2.4	.0	.0	2.9	.0	.0	1.6	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	2.4	6.3	8.0	2.9	14.3	.0	.0	
	SECUESTRO	1.2	.0	.0	1.4	.0	.0	1.6	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	1.2	3.1	4.0	.0	14.3	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	1.2	3.1	.0	1.4	.0	.0	1.6	
	OTROS	1.2	3.1	4.0	1.4	.0	.0	1.6	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	70.6	68.8	80.0	71.0	85.7	100.0	70.3
		HOGAR	10.6	6.3	12.0	11.6	.0	.0	12.5
		TRABAJO	2.4	3.1	.0	2.9	.0	.0	1.6
		ESCUELA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		2.4	3.1	.0	1.4	.0	.0	1.6	
OTRO	14.1	18.8	8.0	13.0	14.3	.0	14.1		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
PUEBLA

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES
		n=108	n=104	n=1
SEXO	MASCULINO	95.4	96.2	.0
	FEMENINO	4.6	3.8	100.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	6.5	5.8	.0
	20 - 24 AÑOS	19.4	18.3	.0
	25 - 29 AÑOS	12.0	12.5	.0
	30 - 34 AÑOS	7.4	7.7	.0
	35 - 39 AÑOS	10.2	10.6	.0
	40 AÑOS O MÁS	44.4	45.2	100.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	22.4	23.3	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	22.4	23.3	.0
	CAIDA	6.5	5.8	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0
	QUEMADO	.9	1.0	.0
	GOLPES	.0	.0	.0
	ASFIXIA	16.8	17.5	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.9	1.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	1.9	1.9	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0
	INTOXICADO	9.3	8.7	100.0
	ENVENENADO	.9	1.0	.0
	OTRAS	17.8	16.5	.0
	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	5.6	5.8	.0
	LUGAR DONDE OCURRIÓ LA CAUSA DE MUERTE	CASA	20.4	19.2
CALLE		60.2	62.5	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0
AREAS RECREATIVAS		1.9	1.9	.0
TRABAJO		2.8	2.9	.0
AREAS DE SERVICIO		.9	1.0	.0
OTROS		8.3	6.7	.0

N= 181 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
PUEBLA**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=22	MARIJUANA n=5	INHALABLES n=2	COCAINA * n=0	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=3	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=1	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=1
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	30.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	30.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=1582 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 PUEBLA**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=331	n=352	n=147	n=53	n=28	n=17	n=19	n=6	n=8	n=1	n=4
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	6.3	4.5	10.9	20.8	21.4	5.9	10.5	.0	.0	.0	25.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.3	.6	2.0	3.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	1.2	.9	3.4	3.8	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	8.8	9.1	19.0	24.5	25.0	11.8	5.3	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	2.1	2.6	1.4	3.8	3.6	.0	5.3	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION . NEUROLOGICA	3.6	2.8	.7	5.7	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	10.3	12.2	6.1	9.4	14.3	23.5	15.8	16.7	12.5	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	2.4	2.3	5.4	5.7	7.1	.0	5.3	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	4.8	6.5	6.8	5.7	3.6	.0	.0	.0	12.5	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	3.0	3.1	.7	.0	.0	5.9	31.6	33.3	37.5	100.0	50.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	3.9	4.3	4.8	5.7	7.1	17.6	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	12.4	10.8	5.4	9.4	.0	5.9	5.3	16.7	12.5	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	3.0	3.4	1.4	.0	.0	5.9	5.3	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	6.9	8.2	15.6	13.2	21.4	11.8	5.3	16.7	.0	.0	.0
SIDA	1.5	.6	1.4	5.7	3.6	.0	5.3	16.7	12.5	.0	.0
OTRAS	25.7	25.3	42.9	22.6	14.3	5.9	26.3	16.7	25.0	.0	25.0
NINGUNA	7.3	5.1	.7	1.9	.0	23.5	.0	.0	.0	.0	.0

N=1582

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
PUEBLA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=500	n=242	n=177	n=29	n=4	n=39	n=0	n=0	n=2	n=3	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	77,7	79,3	71,2	96,6	50,0	84,6	,0	,0	100,0	66,7	,0	100,0
	FEMENINO	22,3	20,7	28,8	3,4	50,0	15,4	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,2	,0	,0	3,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	12,4	8,8	10,8	10,3	,0	46,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	27,6	23,0	27,8	55,2	25,0	33,3	,0	,0	50,0	33,3	,0	,0
	20-24	17,6	18,0	19,3	13,8	50,0	7,7	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	25-29	14,8	17,6	14,8	6,9	,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	30-34	7,7	8,8	7,4	3,4	,0	7,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	19,7	23,8	19,9	6,9	25,0	,0	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	47,1	48,3	40,1	65,5	50,0	59,0	,0	,0	50,0	33,3	,0	,0
	CASADO	13,1	14,9	13,0	10,3	25,0	2,6	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	U. LIBRE	12,5	13,6	14,1	3,4	25,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	6,2	8,3	5,1	,0	,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,4	1,7	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	VIUDO	1,4	1,7	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	18,3	11,6	24,9	20,7	,0	28,2	,0	,0	50,0	,0	,0	100,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESC	,4	,4	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBI	1,0	1,2	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,5	10,8	14,7	17,2	33,3	10,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,3	36,9	37,1	55,2	33,3	81,6	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,7	6,2	6,5	,0	,0	2,6	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	22,0	22,8	25,3	10,3	,0	5,3	,0	,0	50,0	66,7	,0	100,0
	LICENCIATURA	16,4	21,2	13,5	17,2	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,6	,4	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	26,4	20,9	26,5	33,3	,0	59,5	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,3	6,1	2,4	4,2	,0	2,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,5	32,6	28,2	20,8	33,3	8,1	,0	,0	,0	33,3	,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	19,8	17,0	22,9	16,7	33,3	18,9	,0	,0	100,0	33,3	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,2	10,0	4,7	4,2	,0	5,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	7,4	6,5	7,6	16,7	33,3	5,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,5	5,7	7,1	4,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,9	1,3	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,0	1,7	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	8,4	10,8	5,2	14,3	25,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	MEDIO BAJO	30,1	32,0	30,1	25,0	,0	22,2	,0	,0	100,0	,0	,0	100,0
BAJO	60,3	55,4	63,6	60,7	75,0	77,8	,0	,0	,0	66,7	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	,2	,0	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
PUEBLA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=500	n=83	n=169	n=70	n=58	n=91	n=1	n=0	n=2	n=1	n=2	n=2
SEXO	MASCULINO	79,1	67,5	76,9	90,0	82,8	81,3	100,0	,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	FEMENINO	20,9	32,5	23,1	10,0	17,2	18,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,2	,0	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	12,0	4,9	9,5	5,8	,0	36,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	27,4	7,3	22,0	42,0	24,6	45,1	100,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	20-24	18,3	17,1	19,6	23,2	24,6	9,9	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	25-29	14,9	14,6	17,9	13,0	22,8	5,5	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	30-34	8,0	8,5	9,5	11,6	10,5	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	19,2	47,6	21,4	2,9	17,5	2,2	,0	,0	,0	100,0	50,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	47,2	31,3	43,8	55,7	43,1	63,7	100,0	,0	100,0	,0	,0	50,0
	CASADO	13,2	22,9	15,4	4,3	22,4	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	12,7	16,9	11,8	14,3	12,1	9,9	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	SEPARADO	5,8	4,8	5,9	5,7	8,6	4,4	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	DIVORCIADO	1,5	3,6	1,8	,0	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,5	4,8	1,2	,0	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	18,2	15,7	20,1	20,0	12,1	18,7	,0	,0	,0	,0	50,0	50,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,4	1,2	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,9	2,4	,6	,0	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,8	19,5	10,8	15,7	7,4	11,4	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	40,2	31,7	31,9	37,1	35,2	70,5	,0	,0	50,0	,0	50,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	6,0	9,8	7,2	2,9	5,6	3,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	22,0	14,6	25,3	22,9	31,5	12,5	,0	,0	50,0	100,0	50,0	100,0
	LICENCIATURA	17,1	20,7	21,7	21,4	20,4	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,6	,0	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	25,8	12,7	22,4	31,3	11,5	50,6	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,2	1,3	4,8	4,7	3,8	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,7	41,8	29,7	20,3	46,2	10,6	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	20,3	19,0	21,2	15,6	19,2	21,2	,0	,0	50,0	100,0	100,0	,0
	DESEMPLEADO	7,5	3,8	6,7	17,2	9,6	4,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	7,3	5,1	9,1	7,8	5,8	5,9	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	5,5	13,9	5,5	3,1	3,8	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,7	2,5	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,1	5,1	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	8,5	16,5	7,8	10,8	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	30,7	27,8	30,5	33,8	53,7	14,9	,0	,0	100,0	,0	,0	100,0
	BAJO	59,6	49,4	61,7	53,8	35,2	85,1	100,0	,0	,0	100,0	100,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,2	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	49,2	76,8	43,5	50,0	52,6	33,0	,0	,0	50,0	100,0	,0	50,0
	ALCOHOL	35,3	19,5	52,4	24,3	38,6	26,4	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	MARIGUANA	5,9	3,7	1,8	18,6	5,3	6,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	,8	,0	,0	,0	3,5	1,1	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	8,0	,0	1,8	5,7	,0	33,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,4	,0	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,2	,0	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



QUERETARO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
QUERETARO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1603	n=78	n=943	n=209	n=44	n=2	n=263	n=3	n=27	n=1	n=10	n=23
SEXO	MASCULINO	88.8	91.0	92.0	80.9	52.3	100.0	90.1	100.0	85.2	100.0	70.0	87.0
	FEMENINO	11.2	9.0	8.0	19.1	47.7	.0	9.9	.0	14.8	.0	30.0	13.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.3	2.6	1.0	10.5	2.3	.0	.4	.0	.0	.0	10.0	4.3
	15-19 AÑOS	16.0	33.3	8.5	43.1	11.4	50.0	17.1	.0	18.5	100.0	10.0	13.0
	20-24 AÑOS	14.0	19.2	7.7	22.5	4.5	50.0	25.1	.0	37.0	.0	40.0	26.1
	25-29 AÑOS	13.7	16.7	11.6	15.3	2.3	.0	19.8	33.3	18.5	.0	.0	26.1
	30-34 AÑOS	12.5	5.1	13.5	5.3	6.8	.0	18.3	33.3	11.1	.0	10.0	8.7
	35 AÑOS O MAS	41.5	23.1	57.8	3.3	72.7	.0	19.4	33.3	14.8	.0	30.0	21.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.9	2.6	15.8	3.3	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	38.5	32.1	44.9	43.1	18.2	.0	24.0	.0	7.4	.0	30.0	13.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.3	1.3	.1	.5	.0	.0	.4	.0	3.7	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	31.4	38.5	25.7	42.6	22.7	.0	39.9	33.3	44.4	100.0	20.0	43.5
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	1.3	1.1	.0	6.8	.0	.8	.0	7.4	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.1	21.8	8.6	9.6	27.3	100.0	27.0	.0	29.6	.0	50.0	39.1
	LICENCIATURA	4.3	2.6	3.5	1.0	22.7	.0	6.5	66.7	7.4	.0	.0	4.3
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.4	.0	.2	.0	2.3	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	CASADO	31.9	12.8	43.4	4.3	40.9	.0	20.6	33.3	22.2	.0	20.0	8.7
	SOLTERO	45.5	56.4	33.6	82.3	27.3	100.0	53.8	.0	59.3	100.0	60.0	78.3
	DIVORCIADO	3.7	9.0	2.9	1.0	13.6	.0	5.0	.0	7.4	.0	10.0	4.3
	SEPARADO	6.5	10.3	7.2	5.7	6.8	.0	3.8	33.3	3.7	.0	.0	4.3
	VIUDO	2.1	1.3	2.9	1.0	6.8	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	10.3	10.3	10.0	5.7	4.5	.0	16.4	33.3	7.4	.0	10.0	4.3
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	5.4	10.8	2.1	13.9	14.0	50.0	5.8	.0	15.4	.0	10.0	9.1
	DESEMPLEADO	19.7	23.0	17.4	22.6	7.0	50.0	25.9	.0	30.8	100.0	10.0	18.2
	DESOCUPADO	11.4	8.1	11.6	15.4	2.3	.0	9.3	.0	7.7	.0	10.0	31.8
	TRABAJO FIJO	36.3	40.5	35.4	28.8	51.2	.0	43.2	66.7	34.6	.0	30.0	27.3
	TRABAJO OCASIONAL	23.1	14.9	29.2	16.8	7.0	.0	14.3	33.3	11.5	.0	20.0	9.1
	AMA DE CASA	2.8	.0	3.0	2.4	9.3	.0	1.5	.0	.0	.0	20.0	4.5
	JUBILADO	1.2	2.7	1.4	.0	9.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	28.9	29.5	21.8	29.2	79.5	50.0	41.8	66.7	59.3	.0	10.0	39.1
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	67.2	67.9	74.2	67.0	11.4	50.0	55.9	33.3	40.7	100.0	80.0	47.8
	POR INDICACION LEGAL	2.1	2.6	2.0	2.9	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	10.0	8.7
	POR INDICACION MEDICA	1.1	.0	1.2	.0	9.1	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.6	.0	.7	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.3

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
QUERETARO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1603	n=78	n=943	n=209	n=44	n=2	n=263	n=3	n=27	n=1	n=10	n=23
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	48.7	58.4	46.1	49.0	83.7	50.0	46.9	66.7	59.3	.0	50.0	56.5
	2 - 3 VECES POR SEMANA	29.1	26.0	29.8	33.7	4.7	.0	30.4	.0	18.5	.0	20.0	26.1
	1 VEZ POR SEMANA	15.0	7.8	17.5	11.5	7.0	.0	14.2	33.3	7.4	.0	10.0	4.3
	1 A 3 VECES POR MES	6.6	6.5	6.5	4.8	4.7	50.0	7.3	.0	11.1	100.0	10.0	13.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.6	1.3	.1	1.0	.0	.0	1.2	.0	3.7	.0	10.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	6.5	5.1	7.1	7.2	4.5	.0	4.6	.0	3.7	.0	10.0	8.7
	10-14 AÑOS	44.3	52.6	37.0	65.1	29.5	100.0	52.1	33.3	59.3	.0	30.0	52.2
	15-19 AÑOS	36.6	33.3	39.2	25.4	50.0	.0	35.4	66.7	29.6	100.0	40.0	30.4
	20-24 AÑOS	6.9	3.8	8.4	2.4	13.6	.0	5.3	.0	3.7	.0	10.0	8.7
	25-29 AÑOS	2.3	1.3	3.4	.0	2.3	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.6	1.3	2.2	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.9	2.6	2.7	.0	.0	.0	.4	.0	3.7	.0	10.0	.0
	ALCOHOL	70.9	38.5	89.1	42.1	25.0	.0	52.9	33.3	48.1	.0	50.0	43.5
	MARIGUANA	9.8	44.9	3.2	14.8	2.3	50.0	17.9	33.3	7.4	.0	30.0	26.1
	INHALABLES	6.9	9.0	1.7	31.1	.0	.0	6.8	.0	3.7	100.0	.0	8.7
	ALUCINOGENOS	.1	1.3	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	.0
	COCAINA	1.2	1.3	.1	.0	.0	.0	5.7	.0	11.1	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	10.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	9.4	5.1	5.7	9.1	72.7	50.0	12.2	.0	22.2	.0	.0	13.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.5	.0	.1	1.0	.0	.0	.8	33.3	.0	.0	.0	8.7
	BASUCO	.6	.0	.1	1.4	.0	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0	7.4	.0	.0	.0
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	.1	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
QUERETARO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1587	n=157	n=110	n=1137	n=31	n=1	n=151
SEXO	MASCULINO	88.9	91.7	83.6	90.6	90.3	100.0	76.8
	FEMENINO	11.1	8.3	16.4	9.4	9.7	.0	23.2
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.3	3.2	10.9	1.1	3.2	.0	4.0
	15-19 AÑOS	15.9	26.8	30.9	12.4	29.0	.0	17.2
	20-24 AÑOS	14.0	26.8	21.8	10.4	29.0	.0	19.2
	25-29 AÑOS	13.7	15.9	17.3	13.3	16.1	.0	11.9
	30-34 AÑOS	12.6	8.3	10.0	13.9	3.2	100.0	10.6
	35 AÑOS O MAS	41.5	19.1	9.1	48.9	19.4	.0	37.1
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	10.0	1.3	1.8	13.4	.0	.0	2.0
	PRIMARIA	38.8	28.0	42.7	42.4	19.4	.0	23.8
	TECNICO POST-PRIMARIA	.3	1.3	.0	.3	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	31.2	38.9	42.7	28.6	35.5	.0	34.4
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	.6	.0	1.0	.0	.0	4.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	14.0	24.8	12.7	10.5	41.9	100.0	23.2
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	4.2	5.1	.0	3.5	3.2	.0	11.3
	POSGRADO	.4	.0	.0	.4	.0	.0	1.3
	SOLTERO	45.3	65.4	74.5	39.2	48.4	.0	49.0
	CASADO	32.0	13.5	7.3	37.9	16.1	.0	28.5
	DIVORCIADO	3.6	5.1	.9	3.2	3.2	100.0	6.6
	SEPARADO	6.6	6.4	8.2	7.1	.0	.0	2.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	2.1	.0	.9	2.6	.0	.0	2.6
	UNION LIBRE	10.4	9.6	8.2	10.1	32.3	.0	10.6
	9 AÑOS O MENOS	6.5	3.2	1.8	7.4	6.5	.0	6.6
	10-14 AÑOS	44.4	55.4	70.0	39.3	35.5	.0	55.0
	15-19 AÑOS	36.7	36.9	26.4	39.0	25.8	.0	29.8
	20-24 AÑOS	6.8	3.2	1.8	7.4	19.4	.0	7.3
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.3	.6	.0	2.8	3.2	100.0	.7
	30-34 AÑOS	1.6	.0	.0	1.8	9.7	.0	.7
	35 AÑOS Y MAS	1.7	.6	.0	2.3	.0	.0	.0
	DIARIO	41.9	50.6	43.0	36.2	25.8	.0	78.1
	2 - 3 VECES POR SEMANA	24.4	21.2	34.6	26.0	29.0	.0	7.9
	1 VEZ POR SEMANA	23.2	14.7	15.9	27.0	22.6	.0	8.6
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	8.7	9.6	5.6	9.2	19.4	100.0	3.3
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.8	3.8	.9	1.5	3.2	.0	2.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
QUERETARO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
QUERETARO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=729	n=58	n=67	n=135	n=24	n=66	
SEXO	MASCULINO	87.5	96.6	95.5	93.3	95.8	93.9	
	FEMENINO	12.5	3.4	4.5	6.7	4.2	6.1	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	17.0	5.4	9.1	6.0	.0	6.2	
	15 - 18 AÑOS	83.0	94.6	90.9	94.0	100.0	93.8	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	33.5	50.0	64.2	34.8	58.3	37.9	
	SECUNDARIA	46.5	37.9	31.3	48.9	33.3	47.0	
	PREPA	16.3	8.6	.0	14.8	4.2	10.6	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.8	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.9	3.4	4.5	1.5	4.2	4.5	
	ESTUDIANTE	37.8	25.9	16.4	23.7	8.3	22.7	
	EMPLEADO	8.3	5.2	4.5	4.4	16.7	9.1	
	SUBEMPLEADO	36.9	50.0	53.7	52.6	33.3	50.0	
HOGAR	HOGAR	5.4	3.4	4.5	5.9	4.2	7.6	
	NINGUNA	11.7	15.5	20.9	13.3	37.5	10.6	
	SI	12.2	34.5	31.3	18.5	37.5	22.7	
USA TATUAJES	NO	87.8	65.5	68.7	81.5	62.5	77.3	
	SI	7.0	20.7	22.4	5.9	25.0	6.1	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	93.0	79.3	77.6	94.1	75.0	93.9	
	SI	11.7	31.0	34.3	26.7	58.3	12.1	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	88.3	69.0	65.7	73.3	41.7	87.9	
	SI	11.7	31.0	34.3	26.7	58.3	12.1	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	52.4	65.5	77.6	57.8	75.0	59.1	
	VIOLACION	3.3	5.2	3.0	3.0	.0	3.0	
	HOMICIDIO	1.6	3.4	4.5	2.2	12.5	1.5	
	LESIONES A TERCEROS	27.6	17.2	11.9	27.4	8.3	27.3	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	6.7	6.9	6.0	3.7	4.2	6.1	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.7	1.7	1.5	.7	4.2	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	1.1	1.7	.0	.0	4.2	1.5	
	OTROS	9.1	5.2	6.0	6.7	4.2	1.5	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	62.3	67.2	70.1	78.5	70.8	78.8
		HOGAR	20.2	19.0	16.4	10.4	12.5	10.6
		TRABAJO	.8	.0	.0	.0	.0	.0
		ESCUELA	2.3	.0	1.5	2.2	4.2	1.5
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		2.3	1.7	3.0	3.0	.0	3.0	
OTRO	12.1	12.1	9.0	5.9	12.5	6.1		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
QUERETARO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES
		n=129	n=127	n=1
SEXO	MASCULINO	91.5	91.3	100.0
	FEMENINO	8.5	8.7	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	9.3	9.4	.0
	20 - 24 AÑOS	15.5	15.7	.0
	25 - 29 AÑOS	9.3	8.7	.0
	30 - 34 AÑOS	15.5	15.7	.0
	35 - 39 AÑOS	8.5	8.7	.0
	40 AÑOS O MÁS	41.9	41.7	100.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	14.0	14.2	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	16.3	16.5	.0
	CAIDA	7.0	7.1	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0
	QUEMADO	1.6	1.6	.0
	GOLPES	2.3	2.4	.0
	ASFIXIA	13.2	13.4	.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	4.7	4.7	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	4.7	4.7	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0
	INTOXICADO	3.9	2.4	100.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0
	OTRAS	32.6	33.1	.0
	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	2.3	2.4	.0
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	CASA	28.7	28.3
CALLE		60.5	60.6	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0
AREAS RECREATIVAS		3.1	3.1	.0
TRABAJO		.0	.0	.0
ARES DE SERVICIO		4.7	4.7	.0
OTROS	.8	.8	.0	

N= 394 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 QUERETARO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=9	MARIGUANA n=1	INHALABLES n=3	COCAINA * n=7	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=0	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=1	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=1
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	50.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	25.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=327 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 QUERETARO**

PATOLOGIA (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=100	n=109	n=29	n=25	n=9	n=4	n=3	n=5	n=1	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	1.0	1.8	3.4	8.0	11.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	1.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	1.0	.9	3.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	6.0	5.5	3.4	20.0	22.2	25.0	33.3	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	1.0	.9	3.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.9	6.9	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	4.0	6.4	.0	4.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	2.0	1.8	3.4	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	5.0	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	5.0	5.5	3.4	4.0	11.1	.0	.0	40.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	1.0	2.8	3.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	2.0	1.8	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	2.0	.9	3.4	8.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	1.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	48.0	43.1	34.5	28.0	44.4	25.0	.0	40.0	100.0	.0	.0
NINGUNA	4.0	1.8	3.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=327

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
QUERETARO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=303	n=203	n=81	n=9	n=0	n=8	n=0	n=0	n=0	n=2	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	75,6	72,9	80,2	100,0	,0	75,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	FEMENINO	24,4	27,1	19,8	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	9,3	8,5	9,9	,0	,0	37,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	29,9	27,4	39,5	11,1	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	15,6	17,4	14,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	11,3	10,4	9,9	44,4	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	12,3	13,4	8,6	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	21,6	22,9	17,3	22,2	,0	25,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SOLTERO	55,4	53,7	61,7	33,3	,0	75,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	23,8	27,1	14,8	33,3	,0	12,5	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	U. LIBRE	8,3	7,9	8,6	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,6	3,9	4,9	11,1	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	4,6	4,9	4,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	VIUDO	,3	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,0	2,0	4,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESC	,3	,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBI	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,6	12,6	13,0	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SECUNDARIA	45,2	43,9	45,5	66,7	,0	62,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	TECNICO O COMERCIAL	2,7	3,5	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	29,9	30,3	31,2	22,2	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	7,8	8,1	7,8	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	19,5	17,6	23,6	,0	,0	57,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	6,9	7,0	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	LABORAL ESTABLE	36,1	38,0	27,8	77,8	,0	14,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	18,1	17,1	23,6	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,1	6,4	5,6	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	7,6	6,4	9,7	11,1	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR PENSIONADO	5,8	7,5	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	MEDIO ALTO	1,7	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	51,9	54,6	49,3	50,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	38,7	34,5	44,0	37,5	,0	75,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	7,3	7,7	6,7	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
		,3	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
QUERETARO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=303	n=42	n=79	n=24	n=59	n=60	n=3	n=0	n=1	n=7	n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	77,3	52,4	79,7	83,3	91,5	73,3	66,7	,0	100,0	85,7	100,0	100,0
	FEMENINO	22,7	47,6	20,3	16,7	8,5	26,7	33,3	,0	,0	14,3	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	9,8	4,8	3,9	12,5	1,7	30,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	29,8	21,4	23,4	66,7	10,2	55,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	14,5	11,9	14,3	8,3	25,4	8,3	,0	,0	,0	14,3	,0	100,0
	25-29	12,0	11,9	13,0	4,2	18,6	3,3	66,7	,0	100,0	14,3	,0	,0
	30-34	11,6	4,8	14,3	8,3	25,4	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	22,2	45,2	31,2	,0	18,6	,0	33,3	,0	,0	71,4	100,0	,0
	SOLTERO	55,2	40,5	45,6	83,3	40,7	85,0	33,3	,0	100,0	14,3	100,0	100,0
	CASADO	23,5	31,0	27,8	8,3	37,3	3,3	33,3	,0	,0	42,9	,0	,0
	U. LIBRE	8,7	4,8	12,7	4,2	13,6	3,3	33,3	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,7	7,1	6,3	,0	6,8	,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	DIVORCIADO	4,3	14,3	5,1	,0	1,7	,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	VIUDO	,4	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	3,2	,0	2,5	4,2	,0	8,3	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,4	,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	PRIMARIA	13,4	5,0	13,3	13,6	11,9	16,9	33,3	,0	,0	42,9	,0	,0
	SECUNDARIA	44,8	32,5	34,7	50,0	50,8	57,6	66,7	,0	100,0	42,9	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,2	7,5	,0	,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	30,6	35,0	36,0	36,4	27,1	25,4	,0	,0	,0	,0	100,0	100,0
OCUPACION	LICENCIATURA	7,1	15,0	13,3	,0	5,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,1	5,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	19,5	16,2	16,9	45,5	,0	38,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	7,6	16,2	7,0	9,1	,0	9,3	,0	,0	,0	,0	100,0	,0
	LABORAL ESTABLE	36,3	35,1	45,1	9,1	58,2	13,0	66,7	,0	,0	50,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	17,1	10,8	21,1	13,6	14,5	18,5	,0	,0	,0	33,3	,0	100,0
	DESEMPLEADO	6,8	8,1	5,6	4,5	14,5	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	8,0	,0	4,2	13,6	10,9	11,1	33,3	,0	100,0	,0	,0	,0
	HOGAR	4,8	13,5	,0	4,5	1,8	7,4	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,1	,0	1,4	4,3	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	53,3	57,9	54,1	65,2	54,5	44,1	50,0	,0	100,0	28,6	100,0	100,0
	MEDIO BAJO	38,3	36,8	36,5	26,1	34,5	47,5	50,0	,0	,0	71,4	,0	,0
	BAJO	6,9	5,3	8,1	,0	9,1	8,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	POBREZA EXTREMA	,4	,0	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TABACO	66,8	78,6	63,3	66,7	67,8	65,0	66,7	,0	,0	42,9	100,0	100,0
	ALCOHOL	26,7	19,0	32,9	33,3	25,4	25,0	33,3	,0	,0	14,3	,0	,0
	MARIGUANA	3,2	,0	3,8	,0	5,1	1,7	,0	,0	100,0	14,3	,0	,0
	COCAÍNA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	2,5	2,4	,0	,0	1,7	6,7	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,7	,0	,0	,0	,0	1,7	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



QUINTANA ROO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
QUINTANA ROO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **
		n=584	n=52	n=121	n=10	n=8	n=3	n=381	n=2	n=4	n=3
SEXO	MASCULINO	94.2	88.5	95.9	100.0	87.5	100.0	94.8	100.0	100.0	33.3
	FEMENINO	5.8	11.5	4.1	.0	12.5	.0	5.2	.0	.0	66.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.3	5.8	.8	10.0	.0	.0	3.7	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	19.0	21.2	4.1	10.0	37.5	.0	23.9	.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	22.4	32.7	2.5	40.0	37.5	33.3	26.5	.0	25.0	33.3
	25-29 AÑOS	17.3	11.5	12.4	10.0	.0	.0	20.5	.0	.0	33.3
	30-34 AÑOS	12.0	5.8	14.9	10.0	.0	.0	11.8	.0	75.0	.0
	35 AÑOS O MAS	26.0	23.1	65.3	20.0	25.0	66.7	13.6	100.0	.0	33.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.6	5.8	27.3	30.0	.0	33.3	4.2	.0	.0	.0
	PRIMARIA	30.3	38.5	33.9	20.0	50.0	.0	28.6	.0	.0	33.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.4	.0	2.5	.0	.0	.0	1.0	.0	25.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	34.4	26.9	15.7	40.0	50.0	.0	41.7	50.0	.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.4	.0	3.3	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	19.0	26.9	12.4	10.0	.0	33.3	19.9	50.0	25.0	66.7
	LICENCIATURA	3.6	1.9	4.1	.0	.0	33.3	3.1	.0	50.0	.0
	POSGRADO	.3	.0	.8	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	18.3	7.7	20.7	10.0	12.5	66.7	19.4	.0	.0	.0
	SOLTERO	57.7	57.7	48.8	80.0	75.0	33.3	60.1	.0	75.0	33.3
	DIVORCIADO	2.6	.0	5.0	.0	12.5	.0	1.8	.0	.0	33.3
	SEPARADO	9.2	13.5	13.2	.0	.0	.0	7.6	50.0	25.0	.0
	VIUDO	1.2	5.8	2.5	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	11.0	15.4	9.9	10.0	.0	.0	10.8	50.0	.0	33.3
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	3.9	9.6	.8	10.0	.0	.0	3.9	.0	25.0	.0
	DESEMPLEADO	37.5	38.5	26.4	40.0	.0	.0	41.2	50.0	75.0	66.7
	DESOCUPADO	10.8	9.6	7.4	20.0	.0	33.3	11.8	50.0	.0	.0
	TRABAJO FIJO	21.9	23.1	24.8	.0	12.5	33.3	21.8	.0	.0	33.3
	TRABAJO OCASIONAL	24.3	19.2	35.5	30.0	75.0	33.3	20.7	.0	.0	.0
	AMA DE CASA	.7	.0	1.7	.0	12.5	.0	.3	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.9	.0	3.3	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	51.0	51.9	44.6	60.0	62.5	66.7	52.0	100.0	75.0	33.3
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	36.3	34.6	32.2	30.0	25.0	.0	38.8	.0	25.0	33.3
	POR INDICACION LEGAL	4.8	.0	9.1	10.0	12.5	33.3	3.7	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	33.3
OTROS	7.4	13.5	14.0	.0	.0	.0	5.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
QUINTANO ROO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **
		n=584	n=52	n=121	n=10	n=8	n=3	n=381	n=2	n=4	n=3
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	82.2	88.5	79.3	80.0	75.0	100.0	82.2	100.0	66.7	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	7.9	.0	8.3	.0	25.0	.0	8.9	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	5.3	9.6	6.6	20.0	.0	.0	4.2	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	4.6	1.9	5.8	.0	.0	.0	4.7	.0	33.3	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	3.6	1.9	1.7	20.0	.0	.0	4.2	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	45.5	51.9	36.4	30.0	62.5	.0	47.8	100.0	25.0	66.7
	15-19 AÑOS	39.7	40.4	43.8	30.0	25.0	100.0	38.8	.0	50.0	.0
DROGA DE INICIO	20-24 AÑOS	6.5	5.8	8.3	10.0	12.5	.0	5.5	.0	25.0	33.3
	25-29 AÑOS	1.9	.0	.8	10.0	.0	.0	2.4	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	2.4	.0	9.1	.0	.0	.0	.8	.0	.0	.0
	ALCOHOL	38.4	30.8	81.0	20.0	12.5	33.3	27.3	.0	50.0	.0
	MARIGUANA	28.6	46.2	6.6	20.0	.0	33.3	34.1	50.0	25.0	.0
	INHALABLES	5.8	1.9	1.7	50.0	.0	.0	6.6	50.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.2	.0	.0	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
COCAINA	7.2	3.8	.8	.0	.0	.0	9.7	.0	.0	66.7	
TRANQUILIZANTES	.3	.0	.0	.0	.0	33.3	.3	.0	.0	.0	
BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANFETAMINAS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
TABACO	9.9	11.5	8.3	.0	87.5	.0	8.9	.0	.0	33.3	
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	
ROHYPNOL	.2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	8.9	3.8	1.7	.0	.0	.0	12.6	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
QUINTANA ROO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=577	n=167	n=34	n=224	n=94	n=58
SEXO	MASCULINO	94.1%	97.0%	100.0%	94.2%	87.2%	93.1%
	FEMENINO	5.9%	3.0%	.0%	5.8%	12.8%	6.9%
EDAD	14 AÑOS O MENOS	3.3%	3.6%	8.8%	.9%	2.1%	10.3%
	15-19 AÑOS	18.9%	26.3%	26.5%	10.3%	29.8%	8.6%
	20-24 AÑOS	22.2%	24.6%	26.5%	15.6%	33.0%	20.7%
	25-29 AÑOS	17.3%	17.4%	20.6%	15.6%	20.2%	17.2%
	30-34 AÑOS	12.0%	11.4%	8.8%	13.4%	6.4%	19.0%
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	26.3%	16.8%	8.8%	44.2%	8.5%	24.1%
	NO FUE A LA ESCUELA	9.5%	3.0%	11.8%	13.8%	5.3%	17.2%
	PRIMARIA	30.7%	32.9%	50.0%	26.8%	26.6%	34.5%
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.4%	.0%	.0%	1.8%	3.2%	1.7%
	SECUNDARIA O PREVOCAIONAL	34.3%	40.7%	35.3%	29.0%	41.5%	24.1%
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.4%	1.2%	.0%	2.2%	.0%	1.7%
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	18.7%	18.0%	.0%	21.4%	20.2%	19.0%
	LICENCIATURA	3.6%	3.6%	2.9%	4.5%	3.2%	1.7%
	POSGRADO	.3%	.6%	.0%	.4%	.0%	.0%
	ESTADO CIVIL	SOLTERO	57.5%	62.3%	67.6%	50.0%	61.7%
CASADO		18.5%	15.6%	8.8%	22.3%	14.9%	24.1%
DIVORCIADO		2.6%	.0%	.0%	5.4%	1.1%	3.4%
SEPARADO		9.2%	9.0%	8.8%	11.2%	7.4%	5.2%
VIUDO		1.2%	1.8%	.0%	1.8%	.0%	.0%
EDAD DE INICIO	UNION LIBRE	10.9%	11.4%	14.7%	9.4%	14.9%	6.9%
	9 AÑOS O MENOS	3.6%	3.6%	20.6%	2.2%	1.1%	3.4%
	10-14 AÑOS	45.4%	56.3%	55.9%	35.7%	26.6%	75.9%
	15-19 AÑOS	39.9%	35.9%	17.6%	49.6%	45.7%	17.2%
	20-24 AÑOS	6.4%	2.4%	2.9%	6.7%	16.0%	3.4%
	25-29 AÑOS	1.9%	1.2%	2.9%	.9%	6.4%	.0%
FRECUENCIA DE INICIO	30-34 AÑOS	.3%	.0%	.0%	.0%	2.1%	.0%
	35 AÑOS Y MAS	2.4%	.6%	.0%	4.9%	2.1%	.0%
	DIARIO	58.1%	60.5%	73.5%	47.8%	66.0%	69.0%
	2 - 3 VECES POR SEMANA	11.4%	12.6%	2.9%	13.4%	7.4%	12.1%
	1 VEZ POR SEMANA	17.3%	15.6%	14.7%	21.9%	14.9%	10.3%
1 A 3 VECES POR MES		13.0%	11.4%	8.8%	17.0%	10.6%	8.6%
	1 A 11 VECES AL AÑO	.2%	.0%	.0%	.0%	1.1%	.0%

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
QUINTANA ROO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
QUINTANA ROO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=75	n=22	n=2	n=5	n=14	n=1	
SEXO	MASCULINO	84.0	95.5	100.0	80.0	78.6	100.0	
	FEMENINO	16.0	4.5	.0	20.0	21.4	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	16.4	9.1	50.0	25.0	15.4	.0	
	15 - 18 AÑOS	83.6	90.9	50.0	75.0	84.6	100.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	50.7	68.2	50.0	60.0	57.1	.0	
	SECUNDARIA	46.7	31.8	50.0	40.0	42.9	100.0	
	PREPA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	30.7	31.8	50.0	40.0	21.4	.0	
	EMPLEADO	32.0	50.0	.0	.0	21.4	.0	
	SUBEMPLEADO	13.3	4.5	50.0	20.0	21.4	.0	
USA TATUAJES	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	24.0	13.6	.0	40.0	35.7	100.0	
	SI	18.7	9.1	100.0	40.0	42.9	.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	81.3	90.9	.0	60.0	57.1	100.0	
	SI	22.7	18.2	.0	40.0	57.1	.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	77.3	81.8	100.0	60.0	42.9	100.0	
	SI	2.7	4.5	.0	.0	7.1	.0	
TIPO DE INFRACCION	NO	97.3	95.5	100.0	100.0	92.9	100.0	
	ROBO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	VIOLACION	13.3	4.5	.0	40.0	21.4	100.0	
	HOMICIDIO	2.7	4.5	.0	.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	8.0	9.1	.0	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	4.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	14.7	18.2	.0	.0	21.4	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	14.7	36.4	.0	.0	14.3	.0	
	OTROS	1.3	4.5	.0	.0	7.1	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	77.3	72.7	50.0	20.0	78.6	.0
		HOGAR	10.7	4.5	50.0	60.0	21.4	.0
TRABAJO		1.3	.0	.0	20.0	.0	100.0	
ESCUELA		1.3	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		1.3	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTRO		8.0	22.7	.0	.0	.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
QUINTANA ROO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	ALCOHOL	COCAINA	MARIGUANA
		(BAJO EFECTO)			
		n=52	n=49	n=2	n=4
SEXO	MASCULINO	92.3	91.8	100.0	100.0
	FEMENINO	7.7	8.2	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	1.9	2.0	.0	25.0
	15 - 19 AÑOS	9.6	6.1	50.0	25.0
	20 - 24 AÑOS	11.5	12.2	50.0	.0
	25 - 29 AÑOS	17.3	18.4	.0	.0
	30 - 34 AÑOS	21.2	22.4	.0	25.0
	35 - 39 AÑOS	13.5	14.3	.0	.0
	40 AÑOS O MÁS	25.0	24.5	.0	25.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	3.8	4.1	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	9.6	10.2	.0	.0
	CAIDA	1.9	2.0	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0	.0	.0
	GOLPES	9.6	8.2	.0	50.0
	ASFIXIA	53.8	57.1	.0	25.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	5.8	6.1	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0
	INTOXICADO	3.8	4.1	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0
	OTRAS	11.5	8.2	100.0	25.0
LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	7.7	8.2	.0	.0
	CASA	46.2	46.9	50.0	25.0
	CALLE	26.9	28.6	.0	25.0
	BAÑOS PUBLICOS	1.9	2.0	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	3.8	4.1	.0	.0
	TRABAJO	.0	.0	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	13.5	10.2	50.0	50.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0

N= 588 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa, en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 QUINTANA ROO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=41	n=5	n=2	n=3	n=0	n=1	n=0	n=0	n=3	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	13.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	3.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	16.7	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	10.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	20.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	16.7	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=1986 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 QUINTANA ROO**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIJUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=317	n=530	n=79	n=36	n=27	n=28	n=23	n=11	n=14	n=1	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	1.9	2.5	10.1	5.6	3.7	3.6	13.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	4.1	4.0	2.5	16.7	22.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.6	.4	2.5	16.7	25.9	3.6	4.3	9.1	7.1	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	2.8	1.9	2.5	2.8	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.6	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	1.6	1.3	1.3	.0	.0	.0	4.3	.0	14.3	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	3.5	2.6	1.3	5.6	3.7	3.6	8.7	72.7	7.1	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	1.1	1.3	5.6	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	5.0	4.5	5.1	11.1	14.8	3.6	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	3.2	1.9	7.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	3.2	3.0	10.1	11.1	18.5	46.4	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	39.7	37.2	34.2	25.0	25.9	10.7	8.7	9.1	35.7	100.0	.0
NINGUNA	14.5	16.6	21.5	5.6	.0	7.1	8.7	.0	.0	.0	.0

N=1986

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
QUINTANA ROO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=451	n=223	n=187	n=20	n=4	n=16	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	82,0	84,3	77,0	95,0	100,0	87,5	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	18,0	15,7	23,0	5,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,4	7,2	1,6	20,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	23,7	23,4	20,7	35,0	100,0	25,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	18,3	16,2	21,2	15,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,4	15,3	16,8	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	12,5	11,3	15,8	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	24,6	26,6	23,9	30,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	52,3	56,5	44,4	65,0	75,0	62,5	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	21,7	22,4	23,5	15,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	14,4	8,5	20,3	15,0	25,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,2	8,1	9,6	,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,3	1,8	,5	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,1	1,3	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	,9	1,3	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,2	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	15,3	15,3	15,5	5,0	50,0	18,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,1	40,1	41,2	55,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,3	4,1	2,7	,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	32,0	32,4	31,6	35,0	50,0	18,8	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	7,3	6,3	9,1	5,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,4	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	12,2	14,2	7,5	35,0	33,3	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,3	1,8	2,2	,0	33,3	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	31,8	32,9	34,9	10,0	,0	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	18,0	16,4	19,9	20,0	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,6	9,6	5,9	15,0	33,3	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	21,6	21,9	21,0	20,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,6	3,2	8,6	,0	,0	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,7	,9	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	9,8	10,6	11,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
MEDIO BAJO	65,8	64,5	65,7	70,0	75,0	75,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
BAJO	23,5	23,5	22,7	30,0	25,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	,2	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
QUINTANA ROO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENAS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=38	n=120	n=56	n=201	n=15	n=4	n=3	n=3	n=5	n=5	n=3	n=1
SEXO	MASCULINO	82,2	47,4	75,0	91,1	91,5	80,0	100,0	66,7	100,0	60,0	66,7	,0
	FEMENINO	17,8	52,6	25,0	8,9	8,5	20,0	,0	33,3	,0	40,0	33,3	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,4	7,9	2,5	21,8	1,5	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	23,4	15,8	18,5	41,8	21,1	33,3	25,0	33,3	66,7	40,0	,0	,0
	20-24	18,4	2,6	9,2	12,7	29,1	20,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	15,5	2,6	21,0	7,3	17,1	13,3	25,0	33,3	,0	,0	33,3	,0
	30-34	12,6	10,5	16,0	7,3	11,1	6,7	,0	33,3	,0	40,0	66,7	100,0
	35 Y MAS	24,7	60,5	32,8	9,1	20,1	6,7	,0	,0	33,3	20,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	52,1	36,8	42,5	73,2	54,2	73,3	50,0	66,7	66,7	20,0	,0	100,0
	CASADO	21,8	42,1	31,7	12,5	15,4	13,3	25,0	,0	,0	40,0	33,3	,0
	U. LIBRE	14,5	5,3	12,5	8,9	19,4	6,7	25,0	,0	,0	,0	66,7	,0
	SEPARADO	8,2	10,5	11,7	1,8	8,0	,0	,0	33,3	33,3	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	1,3	,0	,0	1,8	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,1	5,3	1,7	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	,9	,0	,0	,0	,5	6,7	,0	,0	,0	40,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,2	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,2	,0	,0	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	15,4	13,2	20,0	10,7	15,4	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,1	21,1	42,5	46,4	41,8	66,7	50,0	,0	33,3	,0	66,7	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,3	13,2	1,7	,0	3,5	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	BACHILLERATO	31,9	47,4	23,3	35,7	32,3	13,3	25,0	100,0	66,7	50,0	33,3	100,0
	LICENCIATURA	7,4	5,3	10,8	5,4	6,5	,0	25,0	,0	,0	25,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,4	,0	,8	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,8	13,2	7,6	41,1	5,6	6,7	,0	50,0	33,3	20,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,3	2,6	2,5	3,6	1,5	,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	31,9	44,7	44,9	14,3	26,4	20,0	25,0	50,0	33,3	20,0	100,0	100,0
	LABORAL INESTABLE	18,1	13,2	17,8	17,9	20,3	13,3	25,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	8,6	,0	6,8	8,9	12,2	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	21,7	7,9	9,3	14,3	32,5	46,7	50,0	,0	33,3	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,7	18,4	11,0	,0	1,5	6,7	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,7	2,6	,0	1,9	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	9,9	21,1	5,1	11,5	9,7	6,7	,0	50,0	66,7	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	65,6	65,8	64,4	65,4	66,7	53,3	100,0	50,0	33,3	80,0	66,7	100,0
	BAJO	23,6	10,5	30,5	21,2	22,6	40,0	,0	,0	,0	20,0	33,3	,0
	POBREZA EXTREMA	,2	,0	,0	,0	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	49,2	81,6	42,5	44,6	48,8	40,0	50,0	66,7	33,3	80,0	33,3	,0
	ALCOHOL	41,6	18,4	52,5	33,9	41,8	33,3	50,0	33,3	66,7	20,0	66,7	100,0
	MARIGUANA	4,5	,0	4,2	12,5	3,0	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	,9	,0	,0	1,8	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	3,6	,0	,8	5,4	5,0	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,2	,0	,0	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SAN LUIS POTOSI



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
SAN LUIS POTOSI**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1364	n=227	n=625	n=185	n=83	n=19	n=202	n=4	n=7	n=10	n=2
SEXO	MASCULINO	88.6	87.7	90.4	87.6	84.3	84.2	87.6	75.0	85.7	100.0	.0
	FEMENINO	11.4	12.3	9.6	12.4	15.7	15.8	12.4	25.0	14.3	.0	100.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	4.9	5.7	1.9	19.5	4.8	.0	1.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	23.2	37.9	10.2	47.6	21.7	10.5	26.7	.0	14.3	20.0	100.0
	20-24 AÑOS	15.5	22.5	12.0	14.1	13.3	10.5	19.8	50.0	28.6	30.0	.0
	25-29 AÑOS	9.8	10.1	7.2	6.5	15.7	15.8	18.3	.0	.0	10.0	.0
	30-34 AÑOS	10.9	9.7	11.8	4.3	14.5	21.1	13.4	.0	28.6	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	35.6	14.1	56.8	8.1	30.1	42.1	20.8	50.0	28.6	40.0	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.6	.9	4.8	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	22.8	20.7	23.8	33.0	10.8	21.1	19.8	.0	28.6	.0	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.3	1.3	1.1	.5	3.6	5.3	1.5	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	36.0	38.3	31.6	49.2	32.5	42.1	35.6	25.0	28.6	50.0	50.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	2.9	3.1	2.4	4.9	4.8	.0	2.5	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	21.7	26.4	21.2	8.6	27.7	21.1	27.7	25.0	28.6	10.0	50.0
	LICENCIATURA	11.3	8.8	13.5	1.6	20.5	10.5	11.9	50.0	14.3	10.0	.0
	POSGRADO	1.2	.4	1.6	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	30.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	29.0	13.7	40.8	5.9	34.9	42.1	28.2	25.0	14.3	30.0	.0
	SOLTERO	51.8	70.5	37.6	81.1	51.8	36.8	48.5	75.0	71.4	30.0	100.0
	DIVORCIADO	3.2	.9	4.7	.5	2.4	.0	4.0	.0	.0	10.0	.0
	SEPARADO	5.2	3.5	5.6	2.7	4.8	10.5	7.9	.0	14.3	.0	.0
	VIUDO	1.5	.4	2.9	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	9.4	11.0	8.5	9.7	6.0	10.5	10.9	.0	.0	30.0	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	10.3	18.5	6.7	17.5	12.0	.0	6.4	25.0	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	36.3	41.4	35.4	39.9	16.9	36.8	38.1	75.0	16.7	30.0	50.0
	DESOCUPADO	9.3	8.8	7.4	13.7	10.8	10.5	10.9	.0	33.3	10.0	.0
	TRABAJO FIJO	19.3	13.2	24.8	9.8	25.3	21.1	14.9	.0	16.7	30.0	.0
	TRABAJO OCASIONAL	20.6	15.9	19.8	19.1	26.5	15.8	27.2	.0	33.3	20.0	50.0
	AMA DE CASA	2.4	1.8	2.7	.0	6.0	15.8	2.0	.0	.0	.0	.0
	JUBILADO	1.8	.4	3.2	.0	2.4	.0	.5	.0	.0	10.0	.0
	OTROS	32.3	33.5	28.3	20.0	56.6	26.3	44.1	25.0	57.1	30.0	100.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	32.3	33.5	28.3	20.0	56.6	26.3	44.1	25.0	57.1	30.0	100.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	60.6	59.5	65.3	70.8	26.5	57.9	52.5	75.0	42.9	70.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	3.1	5.3	1.9	3.2	6.0	10.5	2.5	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.8	.0	1.1	1.6	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0
OTROS	3.2	1.8	3.4	4.3	10.8	5.3	.5	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
SAN LUIS POTOSI**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1364	n=227	n=625	n=185	n=83	n=19	n=202	n=4	n=7	n=10	n=2
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	67.3	79.7	62.2	70.8	84.3	78.9	58.4	75.0	71.4	50.0	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.5	5.7	7.7	11.9	4.8	5.3	11.9	25.0	.0	30.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	14.7	7.9	19.4	8.6	6.0	10.5	17.3	.0	14.3	20.0	50.0
	1 A 3 VECES POR MES	2.4	2.2	3.0	1.1	.0	.0	3.0	.0	14.3	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	7.0	4.4	7.7	7.6	4.8	5.3	9.4	.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	4.5	5.7	3.8	5.9	1.2	.0	5.4	.0	14.3	.0	.0
	10-14 AÑOS	40.4	52.0	31.0	63.2	43.4	36.8	34.2	25.0	71.4	30.0	50.0
	15-19 AÑOS	43.0	37.4	48.5	25.9	42.2	42.1	48.5	50.0	14.3	50.0	50.0
	20-24 AÑOS	7.2	4.0	9.3	4.3	10.8	5.3	5.9	.0	.0	10.0	.0
	25-29 AÑOS	2.3	.9	3.8	.0	1.2	5.3	1.5	.0	.0	10.0	.0
DROGA DE INICIO	30-34 AÑOS	1.1	.0	1.1	.5	1.2	.0	3.0	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.5	.0	2.4	.0	.0	10.5	1.5	25.0	.0	.0	.0
	ALCOHOL	59.8	29.5	91.5	18.4	47.0	36.8	44.6	25.0	42.9	20.0	.0
	MARIGUANA	15.3	55.9	1.9	13.0	1.2	21.1	18.3	25.0	28.6	10.0	.0
	INHALABLES	12.3	6.6	3.0	63.2	3.6	.0	5.9	.0	14.3	10.0	.0
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	1.1	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0	.0
	COCAINA	4.3	.9	.3	.5	1.2	.0	24.3	25.0	14.3	.0	50.0
	TRANQUILIZANTES	1.2	1.3	.8	.0	.0	42.1	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.5	.0	.2	.0	1.2	.0	1.0	.0	.0	30.0	.0
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
TABACO	6.2	5.7	2.2	3.2	45.8	.0	5.0	.0	.0	20.0	50.0	
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	.1	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
SAN LUIS POTOSI**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=1336	n=209	n=168	n=815	n=59	n=1	n=84
SEXO	MASCULINO	89.0	89.5	89.9	89.6	83.1	100.0	84.5
	FEMENINO	11.0	10.5	10.1	10.4	16.9	.0	15.5
EDAD	14 AÑOS O MENOS	4.9	6.2	14.3	2.8	.0	.0	6.0
	15-19 AÑOS	23.2	33.0	40.5	16.2	30.5	.0	27.4
	20-24 AÑOS	15.5	23.0	16.1	12.8	28.8	.0	13.1
	25-29 AÑOS	9.9	12.9	5.4	10.2	10.2	.0	8.3
	30-34 AÑOS	10.9	10.0	8.9	11.8	8.5	.0	9.5
	35 AÑOS O MAS	35.7	14.8	14.9	46.3	22.0	100.0	35.7
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.7	.5	1.8	3.9	.0	.0	.0
	PRIMARIA	23.0	24.4	38.1	20.7	15.3	.0	17.9
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.3	1.4	.6	1.4	1.7	.0	1.2
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	35.6	36.8	47.0	33.1	44.1	.0	28.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	3.0	1.9	1.2	3.4	3.4	.0	4.8
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	21.9	25.8	10.1	22.5	22.0	.0	29.8
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	11.4	8.1	1.2	13.7	13.6	100.0	15.5
	POSGRADO	1.1	1.0	.0	1.4	.0	.0	2.4
	SOLTERO	51.6	69.9	72.0	41.9	52.5	100.0	57.1
	CASADO	29.2	16.3	10.1	35.9	33.9	.0	31.0
	DIVORCIADO	3.2	1.0	1.2	4.4	1.7	.0	2.4
	SEPARADO	5.1	3.3	5.4	5.8	5.1	.0	2.4
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.5	.5	.0	2.3	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	9.4	9.1	11.3	9.6	6.8	.0	7.1
	9 AÑOS O MENOS	4.6	5.3	8.9	3.4	5.1	.0	4.8
	10-14 AÑOS	40.3	45.9	62.5	34.8	20.3	.0	50.0
	15-19 AÑOS	43.2	40.7	24.4	48.1	47.5	.0	36.9
	20-24 AÑOS	7.3	6.7	3.6	8.1	8.5	.0	7.1
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.2	1.0	.0	2.9	5.1	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.1	.5	.6	.9	8.5	.0	1.2
	35 AÑOS Y MAS	1.3	.0	.0	1.7	5.1	100.0	.0
	DIARIO	56.8	68.9	68.5	49.4	50.8	.0	79.8
	2 - 3 VECES POR SEMANA	7.3	5.3	10.1	7.4	10.2	100.0	3.6
	1 VEZ POR SEMANA	19.8	12.0	8.3	26.1	18.6	.0	2.4
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	3.6	3.8	2.4	3.8	5.1	.0	2.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	12.4	10.0	10.7	13.3	15.3	.0	11.9

* Cocaína, Basuco y Crack.



Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
SAN LUIS POTOSI



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
SAN LUIS POTOSI**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUAN	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	CRISTAL
		n=61	n=25	n=27	n=29	n=19	n=20	n=1
SEXO	MASCULINO	95.1	96.0	96.3	96.6	89.5	95.0	100.0
	FEMENINO	4.9	4.0	3.7	3.4	10.5	5.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	6.0	4.8	11.1	3.6	7.1	5.6	.0
	15 - 18 AÑOS	94.0	95.2	88.9	96.4	92.9	94.4	100.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	44.3	52.0	51.9	37.9	47.4	45.0	.0
	SECUNDARIA	44.3	36.0	40.7	51.7	47.4	50.0	.0
	PREPA	11.5	12.0	7.4	10.3	5.3	5.0	100.0
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	24.6	28.0	22.2	34.5	5.3	15.0	100.0
	EMPLEADO	44.3	40.0	33.3	48.3	52.6	45.0	.0
	SUBEMPLEADO	26.2	28.0	37.0	13.8	36.8	30.0	.0
USA TATUAJES	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	NINGUNA	4.9	4.0	7.4	3.4	5.3	10.0	.0
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	16.4	16.0	7.4	10.3	15.8	20.0	.0
	NO	83.6	84.0	92.6	89.7	84.2	80.0	100.0
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	57.4	76.0	74.1	51.7	57.9	55.0	100.0
	NO	42.6	24.0	25.9	48.3	42.1	45.0	.0
TIPO DE INFRACCION	SI	48.3	72.0	63.0	62.1	57.9	52.6	100.0
	NO	51.7	28.0	37.0	37.9	42.1	47.4	.0
	ROBO	32.8	36.0	48.1	34.5	36.8	35.0	.0
	VIOLACION	31.1	40.0	14.8	27.6	36.8	30.0	.0
	HOMICIDIO	34.4	32.0	33.3	34.5	26.3	30.0	100.0
	LESIONES A TERCEROS	3.3	4.0	3.7	3.4	5.3	.0	.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	1.6	.0	.0	3.4	.0	.0	.0
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CONSUMO DE DROGAS	1.6	4.0	.0	.0	5.3	.0	100.0
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
LUGAR DE LA INFRACCION	OTROS	4.9	4.0	3.7	6.9	.0	10.0	.0
	VIA PUBLICA	76.3	76.0	84.6	89.3	61.1	80.0	.0
	HOGAR	18.6	16.0	3.8	7.1	33.3	20.0	100.0
	TRABAJO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ESCUELA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	LUGAR DE RECREO	1.7	.0	3.8	.0	.0	.0	.0
OTRO	3.4	8.0	7.7	3.6	5.6	.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
SAN LUIS POTOSI**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIGUANA	
		n=208	n=180	n=5	n=26	n=16	
SEXO	MASCULINO	96.6	97.2	60.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	3.4	2.8	40.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.5	.6	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	8.7	7.8	.0	19.2	12.5	
	20 - 24 AÑOS	18.8	17.2	40.0	30.8	37.5	
	25 - 29 AÑOS	10.1	10.6	.0	11.5	12.5	
	30 - 34 AÑOS	8.7	8.3	.0	7.7	12.5	
	35 - 39 AÑOS	12.5	10.6	20.0	26.9	12.5	
	40 AÑOS O MÁS	40.9	45.0	40.0	3.8	12.5	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	12.0	12.8	.0	7.7	12.5	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	12.5	13.3	20.0	.0	18.8	
	CAIDA	3.4	3.3	20.0	.0	.0	
	ELECTROCUTADO	1.0	.6	.0	3.8	.0	
	QUEMADO	.5	.6	.0	.0	.0	
	GOLPES	1.9	1.7	.0	3.8	.0	
	ASFIXIA	13.0	11.1	.0	38.5	37.5	
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	7.7	7.2	20.0	19.2	12.5	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	6.7	7.2	.0	7.7	12.5	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	16.3	17.2	.0	3.8	6.3	
	ENVENENADO	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTRAS	25.0	25.0	40.0	15.4	.0	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	23.6	24.4	40.0	.0	25.0
		CASA	38.9	38.9	40.0	53.8	37.5
		CALLE	29.3	30.0	20.0	38.5	25.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		1.4	1.1	.0	.0	6.3	
TRABAJO		1.0	.0	.0	3.8	.0	
ARES DE SERVICIO		1.4	1.1	.0	3.8	.0	
OTROS		4.3	4.4	.0	.0	6.3	

N=828 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 SAN LUIS POTOSI**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=43	MARIGUANA n=2	INHALABLES n=6	COCAINA * n=10	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=1	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=1	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	11.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	17.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	32.4	.0	66.7	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	2.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	23.5	.0	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	2.9	.0	.0	16.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	2.9	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	100.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=1415 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 SAN LUIS POTOSI**

PATOLOGIA (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=339	n=418	n=270	n=91	n=27	n=25	n=23	n=13	n=20	n=4	n=4
BRONQUITIS/	2.7	1.4	4.4	6.6	11.1	4.0	.0	.0	.0	.0	25.0
CA DE	.3	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL	.6	.7	1.1	2.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	8.3	5.0	13.0	24.2	18.5	20.0	.0	.0	5.0	.0	.0
ENF.	.9	.7	1.9	1.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION	1.5	1.7	2.2	3.3	3.7	.0	8.7	7.7	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	5.3	3.8	4.8	8.8	7.4	12.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO	.9	.5	.7	1.1	.0	.0	4.3	7.7	.0	.0	.0
URGENCIAS	2.7	3.1	5.9	4.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	3.2	3.8	.7	2.2	3.7	8.0	13.0	23.1	30.0	.0	.0
AFECCION	1.8	1.7	9.3	5.5	14.8	12.0	8.7	.0	5.0	.0	.0
AFECCION	12.7	14.6	13.7	5.5	7.4	4.0	13.0	15.4	5.0	.0	.0
AFECCION	2.7	2.6	.4	3.3	7.4	8.0	4.3	.0	.0	.0	25.0
DIABETES MELLITUS	3.5	3.6	12.2	13.2	7.4	4.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.2	.0	1.1	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	21.8	21.1	33.0	23.1	11.1	16.0	4.3	.0	5.0	.0	.0
NINGUNA	7.7	10.3	4.1	2.2	3.7	12.0	4.3	.0	5.0	.0	.0

N=1415

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
SAN LUIS POTOSI

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=316	n=184	n=94	n=12	n=4	n=22	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	70,9	67,9	72,3	91,7	100,0	72,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	29,1	32,1	27,7	8,3	,0	27,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	26,9	25,0	27,7	8,3	25,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	28,5	26,1	28,7	41,7	75,0	31,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	12,7	13,0	16,0	,0	,0	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	6,3	4,9	9,6	8,3	,0	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	6,3	5,4	6,4	16,7	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	19,3	25,5	11,7	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTADO CIVIL	SOLTERO	67,4	62,5	72,3	58,3	100,0	86,4	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	17,4	19,0	16,0	33,3	,0	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	4,4	4,9	3,2	,0	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	3,2	3,8	2,1	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,8	4,3	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	2,5	3,3	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	2,2	2,2	3,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,3	,0	,0	,0	,0	4,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,9	9,4	8,5	25,0	25,0	23,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	55,8	56,9	54,3	41,7	50,0	61,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	1,3	1,1	1,1	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	15,1	13,8	20,2	,0	25,0	9,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	LICENCIATURA	15,4	18,2	14,9	8,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,3	,6	1,1	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	37,7	34,3	44,7	27,3	25,0	45,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,3	5,1	4,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	19,7	25,8	10,6	9,1	25,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	12,3	11,2	10,6	27,3	,0	22,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	9,7	7,9	14,1	9,1	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DESOCUPADO	9,0	6,7	10,6	18,2	50,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	5,7	6,7	4,7	,0	,0	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,7	2,2	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,7	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	7,0	6,4	8,0	9,1	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
MEDIO BAJO	84,9	86,1	84,1	72,7	100,0	81,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
BAJO	7,0	6,4	6,8	18,2	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	,3	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
SAN LUIS POTOSI

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=316	n=69	n=75	n=42	n=51	n=53	n=0	n=0	n=2	n=3	n=0	n=2
SEXO	MASCULINO	70,4	56,5	69,3	76,2	82,4	79,2	,0	,0	50,0	,0	,0	50,0
	FEMENINO	29,6	43,5	30,7	23,8	17,6	20,8	,0	,0	50,0	100,0	,0	50,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	24,9	17,4	30,7	19,0	3,9	49,1	,0	,0	,0	66,7	,0	50,0
	15-19	28,3	8,7	20,0	40,5	35,3	49,1	,0	,0	50,0	,0	,0	50,0
	20-24	13,5	10,1	17,3	26,2	15,7	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	25-29	6,7	5,8	10,7	4,8	11,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	6,1	7,2	2,7	4,8	15,7	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	20,5	50,7	18,7	4,8	17,6	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	SOLTERO	66,7	40,6	68,0	83,3	52,9	96,2	,0	,0	100,0	66,7	,0	100,0
ESTADO CIVIL	CASADO	18,2	33,3	20,0	4,8	23,5	1,9	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	U. LIBRE	4,7	1,4	2,7	9,5	11,8	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	3,0	5,8	2,7	,0	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,0	8,7	1,3	,0	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	2,7	10,1	,0	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	1,7	,0	5,3	2,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,3	,0	,0	,0	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	10,9	8,7	13,5	9,5	8,0	15,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	54,6	42,0	51,4	54,8	56,0	72,5	,0	,0	,0	100,0	,0	100,0
	TECNICO O COMERCIAL	1,4	1,4	1,4	2,4	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	15,0	8,7	17,6	19,0	24,0	7,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	16,4	33,3	16,2	14,3	12,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	1,4	5,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	35,9	27,0	40,8	40,0	8,2	58,8	,0	,0	50,0	66,7	,0	100,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,3	1,6	5,6	7,5	2,0	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	LABORAL ESTABLE	20,3	30,2	19,7	15,0	32,7	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	12,1	11,1	9,9	15,0	12,2	15,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	10,3	4,8	12,7	15,0	20,4	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,3	3,2	9,9	7,5	14,3	11,8	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	HOGAR	6,0	15,9	1,4	,0	8,2	2,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	PENSIONADO	1,8	6,3	,0	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	,7	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	7,5	19,7	2,9	5,0	,0	7,5	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
NIVEL SOCIOECONÓMICO	MEDIO BAJO	85,0	72,1	90,0	87,5	95,9	81,1	,0	,0	100,0	66,7	,0	100,0
	BAJO	6,4	4,9	5,7	7,5	4,1	11,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,4	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DROGA DE INICIO	58,6	81,2	44,0	54,8	60,8	54,7	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
TABACO	29,0	14,5	49,3	31,0	19,6	20,8	,0	,0	100,0	33,3	,0	100,0	
ALCOHOL	4,0	2,9	2,7	9,5	3,9	3,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
MARIGUANA	1,3	,0	1,3	,0	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
COCAÍNA	7,1	1,4	2,7	4,8	9,8	20,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
INHALABLES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SINALOA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 SINALOA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	REFRACTIL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=5189	n=389	n=897	n=54	n=193	n=103	n=835	n=317	n=2349	n=29	n=1	n=17	n=5
SEXO	MASCULINO	89.3	93.3	86.8	94.4	64.2	62.1	92.5	94.0	90.9	93.1	100.0	76.5	100.0
	FEMENINO	10.7	6.7	13.2	5.6	35.8	37.9	7.5	6.0	9.1	6.9	.0	23.5	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.7	1.8	.8	3.7	1.6	1.0	.5	.0	.6	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	13.1	22.9	7.0	29.6	4.1	16.5	9.9	4.4	16.1	17.2	.0	5.9	80.0
	20-24 AÑOS	18.5	23.9	10.1	20.4	6.2	14.6	17.0	13.6	23.4	10.3	.0	11.8	.0
	25-29 AÑOS	17.4	14.1	8.0	20.4	13.5	8.7	17.8	22.1	21.5	24.1	100.0	5.9	.0
	30-34 AÑOS	15.6	13.9	11.1	7.4	6.7	10.7	17.4	18.3	17.7	17.2	.0	5.9	.0
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	34.7	23.4	62.9	18.5	67.9	48.5	37.4	41.6	20.8	31.0	.0	70.6	20.0
	NO FUE A LA ESCUELA	3.1	3.6	5.5	1.9	6.7	.0	.8	3.5	2.6	6.9	.0	.0	.0
	PRIMARIA	28.2	29.9	28.3	46.3	26.4	21.4	20.6	30.9	30.4	27.6	.0	11.8	20.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.5	.8	.0	2.6	.0	.5	.6	.4	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	34.9	36.6	24.4	33.3	25.9	31.1	31.3	36.3	40.7	44.8	.0	17.6	20.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.8	.0	1.3	.0	2.6	2.9	1.2	.3	.5	.0	.0	5.9	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.7	23.2	21.1	14.8	21.8	21.4	33.4	25.6	23.5	17.2	100.0	35.3	60.0
	LICENCIATURA	6.9	5.4	16.0	3.7	13.0	19.4	10.8	2.8	1.7	3.4	.0	23.5	.0
	POSGRADO	.9	.8	2.6	.0	1.0	3.9	1.4	.0	.0	.0	.0	5.9	.0
	ESTADO CIVIL	CASADO	26.7	12.6	37.9	9.3	52.8	30.1	35.1	20.5	20.7	20.7	100.0	41.2
SOLTERO		51.9	69.4	39.5	83.3	22.8	48.5	42.4	57.1	58.2	51.7	.0	35.3	80.0
DIVORCIADO		3.7	2.6	4.6	1.9	2.6	6.8	5.6	3.5	2.8	10.3	.0	5.9	.0
SEPARADO		6.8	3.9	7.0	5.6	5.7	4.9	8.9	7.6	6.6	3.4	.0	11.8	20.0
SITUACION LABORAL	VIUDO	.9	.3	2.1	.0	4.1	3.9	.5	.3	.4	3.4	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	10.0	11.3	8.8	.0	11.9	5.8	7.5	11.0	11.3	10.3	.0	5.9	.0
	ESTUDIANTE	4.5	10.6	7.2	3.7	4.1	4.9	5.4	1.6	2.5	10.7	.0	5.9	40.0
	DESEMPLEADO	22.6	18.0	16.0	33.3	7.3	21.4	19.2	27.8	27.5	25.0	.0	11.8	20.0
	DESOCUPADO	13.0	17.8	10.5	22.2	1.6	6.8	10.1	16.7	14.7	7.1	.0	5.9	20.0
	TRABAJO FIJO	24.4	13.7	36.5	14.8	40.9	35.9	36.4	15.8	16.9	21.4	.0	41.2	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	32.0	38.9	24.5	25.9	25.4	19.4	26.5	36.9	36.2	35.7	100.0	17.6	20.0
	AMA DE CASA	2.8	.5	3.4	.0	16.1	10.7	1.9	1.3	2.1	.0	.0	5.9	.0
	JUBILADO	.7	.5	1.9	.0	4.7	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	11.8	.0
	VOLUNTARIO	69.0	56.8	67.6	68.5	82.4	77.7	72.2	75.7	67.9	72.4	100.0	70.6	80.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	24.0	28.5	25.6	31.5	7.3	13.6	19.5	21.5	26.2	20.7	.0	23.5	20.0
	POR INDICACION LEGAL	4.3	11.8	2.9	.0	6.2	1.9	5.9	1.3	3.4	3.4	.0	5.9	.0
	POR INDICACION MEDICA	.5	.3	.9	.0	4.1	5.8	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0
	OTROS	2.3	2.6	3.0	.0	.0	1.0	2.2	1.6	2.3	3.4	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
SINALOA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	REFRACTIL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=5189	n=389	n=897	n=54	n=193	n=103	n=835	n=317	n=2349	n=29	n=1	n=17	n=5
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	77.6	87.9	55.2	87.0	94.8	74.8	66.9	95.0	84.5	58.6	100.0	76.5	80.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.1	5.4	16.6	5.6	2.1	2.9	9.7	.6	6.3	13.8	.0	11.8	.0
	1 VEZ POR SEMANA	7.8	2.3	15.7	5.6	1.6	3.9	13.8	2.2	5.1	10.3	.0	5.9	20.0
	1 A 3 VECES POR MES	5.1	3.3	9.6	1.9	1.6	13.6	7.7	1.6	3.1	17.2	.0	5.9	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.4	1.0	2.9	.0	.0	4.9	1.9	.6	.9	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	4.0	4.4	3.3	13.0	2.6	2.9	3.6	7.3	3.9	3.4	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	40.0	49.1	29.8	51.9	25.4	41.7	32.6	57.1	43.3	51.7	100.0	23.5	80.0
	15-19 AÑOS	43.8	42.2	48.9	31.5	51.3	32.0	48.6	28.7	42.5	41.4	.0	58.8	20.0
	20-24 AÑOS	7.7	2.3	10.5	3.7	16.6	7.8	9.7	3.8	6.9	3.4	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	2.6	1.5	4.0	.0	1.6	3.9	3.7	1.3	2.3	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.9	.5	1.7	.0	.5	1.9	1.1	1.9	.5	.0	.0	5.9	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.0	.0	1.8	.0	2.1	9.7	.7	.0	.6	.0	.0	11.8	.0
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	33.2	23.7	77.3	14.8	11.4	35.9	43.6	11.4	19.6	13.8	.0	35.3
MARIGUANA	27.4	53.2	6.6	42.6	.5	20.4	17.0	45.7	34.0	55.2	100.0	23.5	60.0	
INHALABLES	1.9	.5	.4	24.1	.0	2.9	.8	2.8	2.4	3.4	.0	.0	.0	
ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
HEROINA	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.1	7.6	.1	.0	.0	.0	5.9	
OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	17.6	
COCAINA	8.8	2.8	1.6	3.7	.0	4.9	19.6	5.4	10.3	.0	.0	.0	.0	
TRANQUILIZANTES	1.1	.3	.4	1.9	.0	18.4	.6	1.3	.9	.0	.0	.0	.0	
BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANFETAMINAS	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	11.8	
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
TABACO	22.3	18.5	13.5	13.0	88.1	16.5	17.1	25.2	23.1	6.9	.0	.0	5.9	
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTROS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	
BASUCO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	4.2	.5	.0	.0	.0	1.0	.5	.3	8.9	3.4	.0	.0	.0	
ROHYPNOL	.3	.5	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.3	17.2	.0	.0	.0	
CRACK	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTEN	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
SINALOA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=4881	n=1420	n=96	n=1723	n=458	n=28	n=1156
SEXO	MASCULINO	89.9	96.2	94.8	87.8	92.1	96.4	83.9
	FEMENINO	10.1	3.8	5.2	12.2	7.9	3.6	16.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.7	1.1	3.1	.5	.4	.0	.7
	15-19 AÑOS	12.3	17.0	14.6	9.1	7.6	3.6	13.3
	20-24 AÑOS	18.2	22.2	18.8	13.6	25.5	14.3	17.2
	25-29 AÑOS	17.6	18.0	19.8	14.7	25.5	14.3	18.3
	30-34 AÑOS	15.6	14.9	13.5	15.3	19.9	28.6	15.1
	35 AÑOS O MAS	35.6	27.0	30.2	46.8	21.0	39.3	35.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	3.0	2.6	3.1	3.5	2.2	10.7	2.8
	PRIMARIA	28.2	31.2	53.1	23.6	22.9	14.3	31.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	.8	.0	.4	.2	3.6	.8
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	34.6	41.6	31.3	28.0	35.2	32.1	35.9
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.9	.2	.0	1.2	.4	.0	1.6
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	24.7	21.4	11.5	27.5	34.9	39.3	21.4
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	7.2	2.2	1.0	14.1	3.7	.0	5.0
	POSGRADO	.9	.1	.0	1.8	.4	.0	.9
	SOLTERO	51.3	63.3	68.8	43.2	47.0	42.9	49.0
	CASADO	27.2	18.0	8.3	34.0	31.3	17.9	28.3
	DIVORCIADO	3.7	2.7	5.2	4.9	4.4	10.7	2.5
	SEPARADO	7.0	5.8	8.3	7.8	5.5	25.0	7.2
EDAD DE INICIO	VIUDO	.9	.3	1.0	1.2	.7	.0	1.2
	UNION LIBRE	10.0	9.8	8.3	8.9	11.2	3.6	11.8
	9 AÑOS O MENOS	4.2	3.7	9.5	4.6	.9	.0	5.1
	10-14 AÑOS	40.9	49.2	70.5	32.0	28.8	10.7	47.1
	15-19 AÑOS	44.1	41.4	17.9	48.9	47.6	42.9	40.9
	20-24 AÑOS	7.1	4.2	2.1	9.3	12.7	21.4	5.0
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	2.2	1.1	.0	3.0	6.6	7.1	1.0
	30-34 AÑOS	.8	.4	.0	1.0	1.3	17.9	.3
	35 AÑOS Y MAS	.8	.1	.0	1.1	2.2	.0	.6
	DIARIO	66.6	81.9	77.1	39.8	57.4	92.9	90.1
	2 - 3 VECES POR SEMANA	9.1	5.0	6.3	17.8	7.6	3.6	1.9
	1 VEZ POR SEMANA	11.8	4.2	4.2	23.3	20.1	3.6	1.6
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	8.5	4.6	9.4	13.4	7.9	.0	6.1
	1 A 11 VECES AL AÑO	4.0	4.2	3.1	5.6	7.0	.0	.3

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
SINALOA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
SINALOA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL
		n=620	n=279	n=46	n=50	n=38	n=2	n=81	n=126
SEXO	MASCULINO	96.0	96.8	89.1	98.0	97.4	100.0	96.3	94.4
	FEMENINO	4.0	3.2	10.9	2.0	2.6	.0	3.7	5.6
EDAD	5 - 9 AÑOS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	16.0	10.4	30.4	10.0	2.6	.0	12.3	8.7
	15 - 18 AÑOS	83.9	89.6	69.6	90.0	97.4	100.0	87.7	91.3
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	43.5	50.2	78.3	52.0	50.0	.0	55.6	51.6
	SECUNDARIA	45.6	43.4	13.0	34.0	44.7	100.0	37.0	42.1
	PREPA	9.2	5.4	4.3	14.0	5.3	.0	3.7	4.8
	LICENCIATURA O POSGRADO	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	1.5	1.1	4.3	.0	.0	.0	3.7	1.6
	ESTUDIANTE	13.9	6.5	.0	10.0	7.9	.0	8.6	4.0
	EMPLEADO	19.8	26.9	23.9	20.0	13.2	.0	13.6	18.3
	SUBEMPLEADO	31.5	29.4	21.7	58.0	39.5	50.0	55.6	31.7
USA TATUAJES	HOGAR	.5	.7	.0	.0	2.6	.0	.0	1.6
	NINGUNA	34.4	36.6	54.3	12.0	36.8	50.0	22.2	44.4
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	12.7	22.2	13.0	20.0	28.9	50.0	24.7	23.8
	NO	87.3	77.8	87.0	80.0	71.1	50.0	75.3	76.2
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	7.9	11.1	17.4	4.0	10.5	50.0	6.2	19.0
	NO	92.1	88.9	82.6	96.0	89.5	50.0	93.8	81.0
TIPO DE INFRACCION	SI	5.2	9.7	6.7	8.0	13.2	.0	8.6	12.7
	NO	94.8	90.3	93.3	92.0	86.8	100.0	91.4	87.3
	ROBO	42.1	40.9	17.4	70.0	63.2	100.0	64.2	54.8
	VIOLACION	1.8	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.8
	HOMICIDIO	2.3	1.4	.0	6.0	.0	.0	7.4	.8
	LESIONES A TERCEROS	3.4	3.2	2.2	4.0	5.3	.0	1.2	3.2
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	1.5	.7	.0	.0	.0	.0	1.2	.0
	SECUESTRO	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	9.4	11.5	2.2	16.0	21.1	.0	18.5	4.0
	CONSUMO DE DROGAS	10.6	16.8	56.5	.0	5.3	.0	.0	10.3
	PORTACION DE ARMA	8.2	7.2	4.3	2.0	2.6	.0	4.9	10.3
LUGAR DE LA INFRACCION	OTROS	21.8	19.4	26.1	2.0	7.9	.0	2.5	18.3
	VIA PUBLICA	75.3	77.8	82.6	50.0	63.2	50.0	48.1	70.6
	HOGAR	14.0	12.9	10.9	30.0	28.9	50.0	33.3	21.4
	TRABAJO	1.3	.7	.0	6.0	.0	.0	3.7	.0
	ESCUELA	1.5	1.1	.0	2.0	.0	.0	6.2	.0
	AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	LUGAR DE RECREO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRO	7.9	7.5	6.5	12.0	7.9	.0	8.6	7.9	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
SINALOA**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL	MARIJUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL **	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=22	n=13	n=0	n=16	n=0	n=1	n=0	n=9	n=1	n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	41.2	.0	.0	36.4	.0	.0	.0	20.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	23.5	28.6	.0	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	23.5	14.3	.0	27.3	.0	.0	.0	40.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	14.3	.0	9.1	.0	.0	.0	20.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	5.9	14.3	.0	9.1	.0	.0	.0	20.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	5.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=385 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 SINALOA**

PATOLOGIA (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=115	n=140	n=64	n=44	n=27	n=26	n=42	n=9	n=46	n=7	n=
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	6.1	4.3	10.9	4.5	7.4	7.7	2.4	.0	2.2	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.9	.7	3.1	2.3	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.7	.0	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	5.2	5.7	6.3	6.8	14.8	.0	.0	.0	2.2	.0	25.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	1.6	2.3	3.7	.0	.0	.0	2.2	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	1.7	2.1	1.6	.0	.0	.0	.0	.0	2.2	14.3	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	4.3	5.7	7.8	6.8	7.4	.0	7.1	11.1	.0	14.3	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	1.4	3.1	2.3	3.7	.0	2.4	.0	.0	14.3	25.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	4.3	5.7	4.7	6.8	3.7	3.8	2.4	.0	4.3	14.3	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	7.0	5.7	3.1	13.6	11.1	.0	7.1	33.3	15.2	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	2.6	1.4	1.6	11.4	7.4	7.7	2.4	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEOMUSCULAR	1.7	3.6	3.1	2.3	3.7	7.7	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.9	2.1	4.7	2.3	3.7	7.7	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	4.3	2.9	9.4	9.1	7.4	3.8	.0	.0	2.2	28.6	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	20.0	22.1	20.3	11.4	11.1	11.5	28.6	.0	13.0	.0	.0
NINGUNA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=385

Nota: El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas múltiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
SINALOA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1110	n=616	n=357	n=77	n=26	n=8	n=14	n=0	n=1	n=8	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	84,1	82,8	85,4	93,5	84,6	87,5	78,6	,0	100,0	37,5	,0	,0
	FEMENINO	15,9	17,2	14,6	6,5	15,4	12,5	21,4	,0	,0	62,5	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,5	5,7	4,8	5,2	,0	12,5	14,3	,0	,0	12,5	,0	,0
	15-19	22,5	24,6	17,2	31,2	19,2	12,5	35,7	,0	,0	12,5	,0	,0
	20-24	18,2	17,6	16,3	20,8	50,0	37,5	14,3	,0	,0	12,5	,0	,0
	25-29	14,6	14,0	14,9	15,6	19,2	,0	21,4	,0	,0	25,0	,0	,0
	30-34	15,2	14,4	17,7	13,0	7,7	,0	7,1	,0	100,0	25,0	,0	,0
	35 Y MAS	24,0	23,6	29,0	14,3	3,8	37,5	7,1	,0	,0	12,5	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	43,8	45,6	38,7	48,1	50,0	25,0	78,6	,0	,0	37,5	,0	,0
	CASADO	25,5	24,4	30,3	19,5	7,7	12,5	14,3	,0	100,0	37,5	,0	,0
	U. LIBRE	13,0	11,9	14,0	15,6	19,2	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	9,0	8,9	9,8	9,1	3,8	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,3	2,3	2,8	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,2	,2	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,2	6,8	4,2	7,8	19,2	,0	7,1	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESC	,7	,7	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIB	,5	,8	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	18,1	20,1	13,9	22,4	11,5	25,0	28,6	,0	,0	12,5	,0	,0
	SECUNDARIA	36,0	36,0	32,1	47,4	42,3	75,0	35,7	,0	100,0	37,5	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,6	3,1	2,3	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	29,6	27,0	35,2	23,7	42,3	,0	28,6	,0	,0	37,5	,0	,0
	LICENCIATURA	12,1	12,2	14,8	3,9	3,8	,0	7,1	,0	,0	12,5	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,3	,2	,3	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	11,2	11,8	11,0	9,1	,0	12,5	15,4	,0	,0	40,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,3	2,6	5,5	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	35,3	34,0	40,8	30,3	17,4	50,0	15,4	,0	100,0	20,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	17,9	16,3	17,1	25,8	39,1	25,0	23,1	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	9,8	10,4	8,6	10,6	8,7	,0	15,4	,0	,0	20,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,6	19,6	9,9	19,7	30,4	12,5	15,4	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR PENSIONADO	5,2	5,1	5,5	3,0	4,3	,0	15,4	,0	,0	20,0	,0	,0
	ALTO	,7	,2	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	1,5	1,5	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	13,4	12,6	15,8	4,4	18,2	37,5	16,7	,0	,0	12,5	,0	,0
	BAJO	54,3	54,7	51,7	67,6	59,1	12,5	33,3	,0	100,0	75,0	,0	,0
	BAJO	28,1	27,5	28,8	26,5	22,7	50,0	50,0	,0	,0	12,5	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	2,6	3,7	1,5	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.

Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
SINALOA

CARACTERÍSTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=1110	n=109	n=271	n=147	n=194	n=12	n=313	n=4	n=4	n=21	n=13	n=3
SEXO	MASCULINO	84,2	62,4	83,0	93,2	91,8	66,7	85,9	75,0	75,0	61,9	100,0	66,7
	FEMENINO	15,8	37,6	17,0	6,8	8,2	33,3	14,1	25,0	25,0	38,1	,0	33,3
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,4	10,1	6,3	9,6	1,6	41,7	2,3	,0	,0	9,5	,0	,0
	15-19	22,5	18,3	17,7	47,3	10,6	33,3	23,5	25,0	100,0	19,0	,0	33,3
	20-24	18,2	11,9	12,9	19,2	20,1	16,7	22,5	50,0	,0	19,0	38,5	,0
	25-29	14,7	9,2	13,3	8,2	16,9	,0	19,0	25,0	,0	14,3	38,5	33,3
	30-34	15,2	4,6	20,7	6,8	19,0	,0	17,0	,0	,0	14,3	15,4	,0
	35 Y MAS	23,9	45,9	29,2	8,9	31,7	8,3	15,8	,0	,0	23,8	7,7	33,3
ESTADO CIVIL	SOLTERO	43,8	47,7	38,7	70,1	28,4	83,3	40,3	25,0	100,0	57,1	61,5	66,7
	CASADO	25,3	25,7	31,4	12,2	39,7	8,3	19,8	25,0	,0	19,0	,0	,0
	U. LIBRE	13,0	8,3	13,7	5,4	13,4	,0	17,6	,0	,0	14,3	30,8	,0
	SEPARADO	9,2	11,9	10,0	6,1	8,8	8,3	8,9	50,0	,0	9,5	,0	33,3
	DIVORCIADO	2,3	,9	1,1	,7	3,1	,0	4,5	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,2	1,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,2	3,7	5,2	5,4	6,7	,0	8,9	,0	,0	,0	7,7	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,7	,0	1,5	1,4	,0	,0	,6	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,6	,9	1,1	,0	,5	,0	,6	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	17,9	22,2	15,6	16,1	12,4	33,3	22,1	,0	,0	19,0	33,3	,0
	SECUNDARIA	35,7	36,1	31,2	36,4	30,1	66,7	41,2	50,0	25,0	47,6	16,7	66,7
	TECNICO O COMERCIAL	2,6	2,8	3,7	1,4	2,6	,0	2,3	25,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	30,0	19,4	28,3	35,7	42,0	,0	26,3	25,0	75,0	23,8	33,3	,0
	LICENCIATURA	12,1	18,5	18,2	9,1	12,4	,0	6,5	,0	,0	9,5	16,7	,0
	POSGRADO	,3	,0	,4	,0	,0	,0	,3	,0	,0	,0	,0	33,3
OCUPACION	ESTUDIANTE	11,3	13,7	11,5	27,7	5,5	45,5	5,4	,0	50,0	16,7	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,3	2,1	7,5	6,3	1,2	,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	35,4	29,5	45,8	22,3	47,2	9,1	30,4	,0	,0	16,7	11,1	66,7
	LABORAL INESTABLE	18,1	14,7	15,0	11,6	24,5	,0	20,8	,0	,0	16,7	55,6	33,3
	DESEMPLEADO	9,7	12,6	4,8	8,9	8,6	9,1	13,5	25,0	,0	22,2	,0	,0
	DESOCUPADO	16,5	14,7	8,8	22,3	10,4	36,4	23,1	50,0	50,0	16,7	33,3	,0
	HOGAR	5,0	12,6	4,8	,9	1,2	,0	6,2	25,0	,0	11,1	,0	,0
	PENSIONADO	,7	,0	1,8	,0	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,3	1,0	2,0	2,2	1,3	,0	,7	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	13,5	18,6	14,3	19,9	15,3	8,3	7,3	25,0	50,0	5,0	9,1	,0
	MEDIO BAJO	54,8	54,9	49,8	50,7	61,8	66,7	55,3	25,0	50,0	80,0	45,5	100,0
	BAJO	27,8	24,5	33,1	22,8	21,0	25,0	32,0	25,0	,0	10,0	36,4	,0
	POBREZA EXTREMA	2,6	1,0	,8	4,4	,6	,0	4,7	,0	,0	5,0	9,1	,0
DRUGA DE INICIO	TABACO	55,5	73,4	41,3	63,9	52,6	83,3	56,4	75,0	100,0	42,9	92,3	100,0
	ALCOHOL	32,3	22,9	52,8	23,1	34,5	8,3	24,7	25,0	,0	19,0	,0	,0
	MARIGUANA	7,1	,9	3,3	12,2	7,2	,0	10,3	,0	,0	14,3	,0	,0
	COCAÍNA	2,3	,0	1,5	,7	5,2	,0	2,9	,0	,0	,0	7,7	,0
	INHALABLES	,7	1,8	,4	,0	,0	,0	8,3	1,3	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	1,3	,0	,4	,0	,0	,0	4,2	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,1	,0	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,7	,9	,0	,0	,5	,0	,3	,0	,0	23,8	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SONORA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
SONORA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=2272	n=155	n=340	n=42	n=64	n=28	n=436	n=	n=798	n=1	n=8	n=58
SEXO	MASCULINO	88.8	92.9	92.9	78.6	96.9	92.9	92.7	92.4	82.0	100.0	37.5	100.0
	FEMENINO	11.2	7.1	7.1	21.4	3.1	7.1	7.3	7.6	18.0	.0	62.5	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.1	4.5	1.5	7.1	1.6	3.6	.5	.3	.3	.0	.0	3.4
	15-19 AÑOS	13.1	27.7	3.2	21.4	14.1	53.6	12.4	4.1	15.3	.0	.0	34.5
	20-24 AÑOS	16.9	16.8	7.1	33.3	10.9	21.4	17.7	12.9	22.3	.0	.0	15.5
	25-29 AÑOS	17.2	11.6	9.4	7.1	9.4	14.3	18.6	18.4	21.7	.0	12.5	15.5
	30-34 AÑOS	17.2	11.6	11.8	9.5	18.8	.0	22.2	20.8	17.3	.0	37.5	12.1
	35 AÑOS O MAS	34.6	27.7	67.1	21.4	45.3	7.1	28.7	43.6	23.2	100.0	50.0	19.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.3	.0	6.8	7.1	1.6	.0	1.4	2.6	1.3	.0	.0	.0
	PRIMARIA	25.8	32.3	35.3	33.3	35.9	14.3	24.1	24.0	22.1	100.0	37.5	13.8
	TECNICO POST-PRIMARIA	.7	.0	.9	2.4	.0	.0	.5	1.5	.5	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	44.5	38.1	34.4	47.6	45.3	50.0	35.6	51.5	50.0	.0	25.0	70.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.8	1.3	2.6	.0	3.1	.0	2.8	1.2	1.6	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	20.9	22.6	16.2	7.1	12.5	35.7	30.5	17.3	20.3	.0	12.5	13.8
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	3.7	5.8	3.8	2.4	1.6	.0	5.0	1.8	3.8	.0	25.0	1.7
	POSGRADO	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.3	.5	.0	.0	.0
	CASADO	18.0	10.3	25.0	2.4	12.5	3.6	25.0	13.2	17.0	.0	25.0	12.1
	SOLTERO	54.4	67.1	42.6	88.1	60.9	78.6	45.2	57.3	56.8	.0	37.5	69.0
	DIVORCIADO	5.3	3.2	10.3	2.4	6.3	.0	6.0	4.7	3.5	.0	12.5	8.6
	SEPARADO	7.5	6.5	9.4	.0	10.9	3.6	7.6	7.0	8.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	VIUDO	.8	.6	2.1	.0	.0	.0	.0	.9	.8	100.0	.0	.0
	UNION LIBRE	13.9	12.3	10.6	7.1	9.4	14.3	16.3	17.0	13.9	.0	25.0	10.3
	ESTUDIANTE	4.4	12.9	2.1	7.1	6.3	25.0	4.8	.6	3.8	.0	.0	10.3
	DESEMPLEADO	38.0	26.5	44.4	57.1	30.2	35.7	38.1	40.4	36.0	.0	12.5	44.8
	DESOCUPADO	13.5	12.9	5.6	14.3	14.3	17.9	8.9	14.9	19.0	.0	12.5	8.6
	TRABAJO FIJO	19.2	12.9	19.1	4.8	19.0	14.3	32.1	16.1	16.7	100.0	12.5	6.9
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	TRABAJO OCASIONAL	21.9	34.2	24.7	16.7	30.2	3.6	13.5	26.0	20.7	.0	37.5	29.3
	AMA DE CASA	2.5	.6	2.1	.0	.0	3.6	1.8	1.8	3.9	.0	25.0	.0
	JUBILADO	.5	.0	2.1	.0	.0	.0	.7	.3	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	48.9	31.0	44.1	33.3	31.3	42.9	51.4	68.4	48.6	100.0	50.0	29.3
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	41.4	50.3	45.3	57.1	64.1	53.6	39.2	29.5	39.7	.0	50.0	62.1
	POR INDICACION LEGAL	5.6	11.6	6.2	9.5	4.7	3.6	4.8	1.2	6.5	.0	.0	6.9
POR INDICACION MEDICA	2.2	3.9	2.4	.0	.0	.0	1.4	.6	3.3	.0	.0	1.7	
OTROS	1.8	3.2	2.1	.0	.0	.0	.0	3.2	.3	1.9	.0	.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 SONORA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.LEGALES ***
		n=2272	n=155	n=340	n=42	n=64	n=28	n=436	n=342	n=798	n=1	n=8	n=58
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	77.3	83.9	71.7	81.0	85.9	75.0	73.2	95.6	72.6	.0	87.5	69.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	10.8	7.7	12.1	4.8	4.7	25.0	12.8	1.5	14.0	100.0	12.5	10.3
	1 VEZ POR SEMANA	7.2	3.9	10.9	9.5	6.3	.0	8.9	1.5	7.6	.0	.0	12.1
	1 A 3 VECES POR MES	4.2	3.9	5.3	.0	3.1	.0	4.4	.6	5.4	.0	.0	8.6
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.5	.6	.0	4.8	.0	.0	.7	.9	.4	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	6.1	5.2	4.1	11.9	7.8	7.1	5.3	8.8	5.4	.0	.0	15.5
	10-14 AÑOS	48.1	54.8	36.2	57.1	51.6	75.0	45.6	58.5	47.1	100.0	37.5	48.3
	15-19 AÑOS	36.5	33.5	43.2	26.2	34.4	17.9	41.1	28.1	36.8	.0	25.0	36.2
	20-24 AÑOS	5.8	4.5	11.2	4.8	4.7	.0	4.6	2.6	6.5	.0	12.5	.0
	25-29 AÑOS	2.0	.0	2.4	.0	.0	.0	2.1	1.5	2.9	.0	12.5	.0
	30-34 AÑOS	.9	.0	1.8	.0	.0	.0	.7	.6	1.0	.0	12.5	.0
	35 AÑOS Y MAS	.6	1.9	1.2	.0	1.6	.0	.7	.0	.4	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	22.7	15.5	57.9	4.8	18.8	10.7	21.3	7.9	18.7	.0	12.5	12.1
	MARIGUANA	23.9	35.5	7.4	26.2	6.3	17.9	23.2	41.2	23.4	.0	12.5	20.7
	INHALABLES	3.2	1.3	.9	31.0	3.1	.0	.9	7.3	2.6	100.0	.0	3.4
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	5.2
	HEROINA	.9	.0	.0	.0	.0	3.6	.2	5.3	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0	12.5	.0
	COCAINA	5.1	3.2	2.6	.0	3.1	7.1	8.7	4.7	5.4	.0	.0	3.4
	TRANQUILIZANTES	.7	.6	.0	.0	.0	3.6	.0	1.2	.9	.0	.0	3.4
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	25.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	38.9	43.2	30.3	35.7	68.8	57.1	42.7	28.1	40.9	.0	37.5	48.3
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.3	.0	.9	.0	.0	.0	.2	.3	.3	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.3	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	2.8	.6	.0	2.4	.0	.0	.5	1.2	6.9	.0	.0	1.7
	ROHYPNOL	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.6	.8	.0	.0	.0
CRACK	.7	.0	.0	.0	.0	.0	2.1	1.2	.1	.0	.0	1.7	
REFRACTIL OFTENEO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
SONORA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=2167	n=542	n=73	n=515	n=133	n=20	n=884
SEXO	MASCULINO	89.7	91.1	89.0	89.1	85.7	75.0	90.0
	FEMENINO	10.3	8.9	11.0	10.9	14.3	25.0	10.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.1	.4	.0	.4	.8	.0	2.0
	15-19 AÑOS	12.9	14.0	15.1	5.4	6.0	.0	17.6
	20-24 AÑOS	17.1	19.0	21.9	12.2	20.3	5.0	18.1
	25-29 AÑOS	16.8	17.7	19.2	13.4	29.3	30.0	15.8
	30-34 AÑOS	16.9	16.8	16.4	15.7	24.1	30.0	16.4
	35 AÑOS O MAS	35.3	32.1	27.4	52.8	19.5	35.0	30.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.4	2.2	2.7	4.1	1.5	.0	1.7
	PRIMARIA	26.0	25.8	49.3	26.4	28.6	20.0	23.6
	TECNICO POST-PRIMARIA	.6	1.1	.0	.6	.8	.0	.3
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	44.6	48.2	38.4	35.0	44.4	70.0	48.1
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.8	1.5	1.4	2.5	.8	.0	1.8
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	20.6	18.8	6.8	25.6	19.5	10.0	20.4
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	3.7	2.2	1.4	5.4	3.0	.0	4.0
	POSGRADO	.3	.2	.0	.4	1.5	.0	.1
	SOLTERO	54.3	59.8	69.9	42.9	48.9	65.0	56.8
	CASADO	18.1	13.1	9.6	26.2	23.3	10.0	16.5
	DIVORCIADO	5.5	6.3	1.4	8.2	3.8	5.0	4.1
	SEPARADO	7.6	5.9	6.8	9.5	5.3	.0	8.0
EDAD DE INICIO	VIUDO	.6	.6	1.4	.4	.0	.0	.9
	UNION LIBRE	13.9	14.4	11.0	12.8	18.8	20.0	13.7
	9 AÑOS O MENOS	6.1	5.2	16.4	4.9	.8	.0	7.6
	10-14 AÑOS	49.2	52.6	65.8	32.5	24.8	40.0	59.3
	15-19 AÑOS	36.4	36.7	16.4	48.1	46.6	25.0	29.9
	20-24 AÑOS	5.4	3.9	1.4	9.1	15.8	10.0	2.7
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	1.7	1.3	.0	2.1	8.3	15.0	.5
	30-34 AÑOS	.6	.2	.0	1.8	.8	10.0	.1
	35 AÑOS Y MAS	.6	.2	.0	1.6	3.0	.0	.0
	DIARIO	74.8	85.1	82.2	47.6	62.4	95.0	85.2
	2 - 3 VECES POR SEMANA	9.8	7.2	8.2	17.1	9.8	.0	7.5
	1 VEZ POR SEMANA	9.1	3.3	6.8	21.9	15.0	5.0	4.5
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	4.9	2.8	2.7	11.5	7.5	.0	2.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.4	1.7	.0	1.9	5.3	.0	.5

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007 SONORA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
SONORA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO	CRISTAL	
		n=129	n=39	n=7	n=15	n=20	n=2	n=33	n=39	
SEXO	MASCULINO	81.4	92.3	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	71.8	
	FEMENINO	18.6	7.7	28.6	.0	.0	.0	.0	28.2	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	22.7	21.1	28.6	.0	5.0	.0	.0	17.9	
	15 - 18 AÑOS	77.3	78.9	71.4	100.0	95.0	100.0	100.0	82.1	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	46.5	46.2	71.4	33.3	40.0	50.0	42.4	53.8	
	SECUNDARIA	46.5	51.3	.0	66.7	60.0	50.0	57.6	41.0	
	PREPA	3.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	3.1	2.6	28.6	.0	.0	.0	.0	5.1	
	ESTUDIANTE	17.8	12.8	14.3	.0	.0	.0	.0	7.7	
	EMPLEADO	14.0	5.1	14.3	26.7	20.0	.0	18.2	17.9	
	SUBEMPLEADO	32.6	33.3	14.3	53.3	50.0	100.0	48.5	28.2	
HOGAR	HOGAR	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	32.6	48.7	57.1	20.0	30.0	.0	33.3	46.2	
USA TATUAJES	SI	19.4	28.2	.0	20.0	30.0	50.0	45.5	28.2	
	NO	80.6	71.8	100.0	80.0	70.0	50.0	54.5	71.8	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	14.7	23.1	42.9	13.3	10.0	.0	24.2	20.5	
	NO	85.3	76.9	57.1	86.7	90.0	100.0	75.8	79.5	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	14.7	17.9	42.9	33.3	25.0	50.0	27.3	30.8	
	NO	85.3	82.1	57.1	66.7	75.0	50.0	72.7	69.2	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	93.0	100.0	100.0	73.3	70.0	50.0	75.8	97.4	
	VIOLACION	3.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	HOMICIDIO	.8	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	1.6	2.6	.0	6.7	.0	.0	6.1	2.6	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.7	7.7	14.3	6.7	.0	.0	.0	7.7	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	10.9	12.8	28.6	.0	5.0	.0	9.1	12.8	
	OTROS	29.5	15.4	28.6	20.0	35.0	50.0	24.2	28.2	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	60.5	66.7	57.1	60.0	65.0	50.0	48.5	56.4
		HOGAR	21.7	12.8	42.9	.0	5.0	.0	6.1	20.5
		TRABAJO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTRO	17.1	20.5	.0	40.0	30.0	50.0	45.5	23.1		



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
SONORA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=385	n=253	n=98	n=13	n=9	n=6	n=4	n=0	n=0	n=1	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	75,3	77,1	72,4	84,6	77,8	33,3	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	FEMENINO	24,7	22,9	27,6	15,4	22,2	66,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	14,6	15,0	15,3	7,7	,0	16,7	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	35,7	36,4	33,7	53,8	22,2	16,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	19,0	19,4	19,4	7,7	22,2	16,7	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	11,2	11,1	12,2	,0	,0	33,3	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	30-34	9,4	8,7	9,2	23,1	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	10,2	9,5	10,2	7,7	33,3	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	67,7	68,8	70,4	69,2	44,4	16,7	75,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	11,2	10,3	13,3	7,7	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,5	10,3	9,2	23,1	11,1	66,7	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	SEPARADO	6,5	7,1	5,1	,0	11,1	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,5	,4	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,1	2,4	1,0	,0	,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,8	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,9	12,3	8,2	7,7	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	51,0	50,2	49,0	61,5	55,6	50,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,3	3,2	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	27,1	26,9	31,6	15,4	22,2	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	7,0	5,1	10,2	15,4	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,5	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	30,1	27,6	40,0	16,7	,0	33,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,7	2,5	2,1	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	21,1	20,6	23,2	16,7	25,0	16,7	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,4	16,0	10,5	16,7	50,0	16,7	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,6	8,2	5,3	16,7	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	19,0	21,0	15,8	16,7	,0	16,7	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	3,3	2,9	3,2	,0	12,5	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,8	1,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	2,1	1,2	4,2	7,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	17,5	16,4	22,9	7,7	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	53,2	51,2	55,2	61,5	66,7	20,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0
BAJO	26,2	29,6	17,7	23,1	11,1	80,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	1,1	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
SONORA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=385	n=38	n=50	n=70	n=46	n=29	n=105	n=7	n=2	n=23	n=4	n=2
SEXO	MASCULINO	75,3	47,4	74,0	92,9	84,8	86,2	68,6	71,4	100,0	69,6	50,0	100,0
	FEMENINO	24,7	52,6	26,0	7,1	15,2	13,8	31,4	28,6	,0	30,4	50,0	,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	14,6	18,4	8,0	28,6	2,2	51,7	4,8	,0	,0	4,3	25,0	50,0
	15-19	35,4	18,4	18,0	50,0	28,3	41,4	29,5	42,9	100,0	87,0	,0	50,0
	20-24	19,4	23,7	20,0	18,6	19,6	3,4	25,7	28,6	,0	4,3	25,0	,0
	25-29	11,4	7,9	6,0	2,9	15,2	3,4	23,8	,0	,0	4,3	25,0	,0
	30-34	9,3	7,9	24,0	,0	17,4	,0	9,5	28,6	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	9,8	23,7	24,0	,0	17,4	,0	6,7	,0	,0	,0	,0	25,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	67,8	52,6	44,0	88,6	54,3	93,1	61,9	71,4	100,0	100,0	50,0	100,0
	CASADO	11,2	18,4	22,0	2,9	28,3	,0	8,6	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	11,4	10,5	18,0	5,7	6,5	3,4	17,1	28,6	,0	,0	50,0	,0
	SEPARADO	6,4	10,5	12,0	1,4	4,3	3,4	9,5	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,5	,0	2,0	,0	,0	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,5	2,6	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	2,1	5,3	,0	1,4	6,5	,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,8	2,6	,0	,0	,0	,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,9	13,2	14,0	4,3	2,2	20,7	17,1	,0	,0	,0	25,0	,0
	SECUNDARIA	50,5	44,7	54,0	52,9	39,1	65,5	54,3	42,9	,0	39,1	50,0	50,0
	TECNICO O COMERCIAL	2,4	7,9	2,0	1,4	2,2	,0	1,9	14,3	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	27,4	18,4	18,0	38,6	43,5	13,8	21,0	14,3	50,0	47,8	25,0	,0
	LICENCIATURA	7,2	10,5	12,0	2,9	8,7	,0	3,8	28,6	50,0	13,0	,0	50,0
OCUPACION	POSGRADO	,5	,0	,0	,0	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	29,6	30,6	28,6	57,4	20,9	39,3	10,8	40,0	,0	36,4	,0	100,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,8	2,8	,0	4,4	2,3	3,6	2,0	,0	50,0	4,5	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	20,5	27,8	40,8	8,8	34,9	7,1	19,6	,0	,0	4,5	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,8	5,6	18,4	7,4	16,3	17,9	22,5	20,0	50,0	18,2	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,8	5,6	4,1	5,9	7,0	3,6	13,7	20,0	,0	4,5	,0	,0
	DESOCUPADO	19,4	16,7	2,0	16,2	14,0	28,6	27,5	20,0	,0	31,8	50,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	3,3	8,3	4,1	,0	2,3	,0	3,9	,0	,0	,0	50,0	,0
	PENSIONADO	,8	2,8	2,0	,0	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	2,2	,0	2,0	2,9	2,2	,0	2,0	14,3	,0	4,5	,0	,0
	MEDIO ALTO	17,6	13,2	16,3	25,7	28,3	3,6	9,8	42,9	50,0	27,3	,0	,0
	MEDIO BAJO	53,2	63,2	53,1	52,9	54,3	42,9	54,9	,0	50,0	54,5	50,0	100,0
	BAJO	25,9	21,1	28,6	18,6	13,0	53,6	31,4	42,9	,0	13,6	50,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,1	2,6	,0	,0	2,2	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	66,0	63,2	64,0	65,7	52,2	65,5	71,4	85,7	100,0	65,2	75,0	100,0
	ALCOHOL	25,5	31,6	32,0	30,0	34,8	24,1	16,2	14,3	,0	26,1	,0	,0
	MARIGUANA	3,5	2,6	2,0	2,9	2,2	6,9	3,8	,0	,0	8,7	,0	,0
	COCAÍNA	2,4	2,6	2,0	1,4	6,5	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	1,3	,0	,0	,0	2,2	3,4	1,9	,0	,0	,0	25,0	,0
	ESTIMULANTES	1,1	,0	,0	,0	2,2	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,3	,0	,0	,0	,0	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



TABASCO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
TABASCO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	REFRACTIL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=581	n=45	n=231	n=18	n=3	n=275	n=1	n=3	n=1	n=2	n=2
SEXO	MASCULINO	95.5	95.6	94.4	100.0	100.0	96.4	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	4.5	4.4	5.6	.0	.0	3.6	.0	33.3	.0	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.7	2.2	.0	16.7	.0	2.2	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	16.5	24.4	8.2	22.2	.0	21.5	.0	33.3	.0	100.0	.0
	20-24 AÑOS	20.1	20.0	11.3	11.1	66.7	27.3	100.0	33.3	100.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	16.9	20.0	10.8	5.6	33.3	21.8	.0	33.3	.0	.0	50.0
	30-34 AÑOS	14.6	13.3	18.6	11.1	.0	12.0	.0	.0	.0	.0	50.0
ESCOLARIDAD	35 AÑOS O MAS	30.1	20.0	51.1	33.3	.0	15.3	.0	.0	.0	.0	.0
	NO FUE A LA ESCUELA	6.2	2.2	11.7	16.7	.0	1.5	.0	.0	.0	50.0	.0
	PRIMARIA	30.5	17.8	39.8	33.3	33.3	24.4	.0	33.3	.0	.0	100.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	35.5	48.9	27.3	44.4	.0	40.0	100.0	33.3	.0	50.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.7	4.4	.4	.0	.0	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	21.3	22.2	15.2	5.6	33.3	27.3	.0	33.3	100.0	.0	.0
	LICENCIATURA	4.0	4.4	4.3	.0	33.3	3.6	.0	.0	.0	.0	.0
	POSGRADO	.3	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	22.4	13.3	30.7	.0	.0	19.3	.0	.0	.0	.0	.0
	SOLTERO	50.4	64.4	39.4	83.3	66.7	53.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	DIVORCIADO	1.5	.0	2.2	5.6	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	SEPARADO	5.3	2.2	7.4	.0	.0	4.7	.0	.0	.0	.0	.0
	VIUDO	1.2	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	19.1	20.0	17.3	11.1	33.3	21.5	.0	.0	.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	3.6	11.4	2.6	.0	.0	3.6	.0	.0	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	24.9	15.9	16.5	16.7	33.3	33.5	.0	66.7	.0	50.0	.0
	DESOCUPADO	12.4	15.9	10.0	22.2	.0	12.7	.0	.0	100.0	.0	100.0
	TRABAJO FIJO	23.7	18.2	30.4	22.2	66.7	18.9	100.0	.0	.0	.0	.0
	TRABAJO OCASIONAL	33.7	36.4	38.3	38.9	.0	29.8	.0	33.3	.0	50.0	.0
	AMA DE CASA	1.4	2.3	1.3	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.3	.0	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	29.0	15.6	17.8	16.7	66.7	40.7	.0	.0	.0	50.0	100.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	65.3	77.8	76.5	72.2	.0	54.5	.0	100.0	100.0	50.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	2.6	2.2	2.2	11.1	.0	2.2	100.0	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	1.7	4.4	1.3	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	1.4	.0	2.2	.0	33.3	.7	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
TABASCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	REFRACTIL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=581	n=45	n=231	n=18	n=3	n=275	n=1	n=3	n=1	n=2	n=2
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	56.1	64.4	46.3	72.2	66.7	62.2	.0	66.7	.0	50.0	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	14.3	22.2	13.9	5.6	33.3	13.5	.0	33.3	.0	50.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	15.1	8.9	21.2	16.7	.0	11.6	.0	.0	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	13.9	2.2	18.2	5.6	.0	12.4	100.0	.0	100.0	.0	50.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.5	2.2	.4	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	10.2	11.1	7.8	22.2	.0	10.9	100.0	.0	.0	.0	50.0
	10-14 AÑOS	44.8	48.9	35.9	50.0	33.3	51.3	.0	33.3	.0	100.0	50.0
	15-19 AÑOS	34.6	37.8	38.5	22.2	66.7	31.3	.0	66.7	100.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	5.3	2.2	9.5	.0	.0	2.9	.0	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	3.3	.0	3.9	5.6	.0	3.3	.0	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.2	.0	2.6	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	.7	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	51.6	42.2	79.2	38.9	33.3	32.0	.0	.0	100.0	50.0	.0
	MARIGUANA	19.3	26.7	5.6	16.7	33.3	29.1	100.0	66.7	.0	.0	.0
	INHALABLES	5.5	8.9	.9	33.3	.0	6.9	.0	.0	.0	.0	50.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.2	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	5.3	.0	1.3	.0	.0	10.2	.0	.0	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.3	.0	.4	.0	.0	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	14.1	22.2	12.1	11.1	33.3	14.5	.0	.0	.0	.0	50.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.3	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.3	.0	.0	.0	.0	.4	.0	33.3	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRACK	2.9	.0	.4	.0	.0	5.5	.0	.0	.0	50.0	.0
REFRACTIL OFTENEO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
TABASCO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=575	n=112	n=32	n=300	n=48	n=1	n=82
SEXO	MASCULINO	95.7	98.2	100.0	94.0	100.0	100.0	93.9
	FEMENINO	4.3	1.8	.0	6.0	.0	.0	6.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.7	1.8	12.5	.3	4.2	.0	1.2
	15-19 AÑOS	16.5	18.8	25.0	12.7	20.8	.0	22.0
	20-24 AÑOS	20.3	33.0	15.6	14.7	29.2	100.0	19.5
	25-29 AÑOS	16.5	19.6	21.9	14.0	29.2	.0	12.2
	30-34 AÑOS	14.4	11.6	12.5	16.3	8.3	.0	15.9
	35 AÑOS O MAS	30.4	15.2	12.5	42.0	8.3	.0	29.3
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	6.3	2.7	9.4	8.3	2.1	.0	4.9
	PRIMARIA	30.3	35.7	43.8	31.0	29.2	.0	15.9
	TECNICO POST-PRIMARIA	.5	.0	3.1	.7	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	35.7	41.1	37.5	31.7	37.5	100.0	40.2
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.7	2.7	.0	.7	4.2	.0	3.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	21.2	15.2	6.3	23.0	25.0	.0	26.8
	LIGENCIATURA	4.0	2.7	.0	4.0	2.1	.0	8.5
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.3	.0	.0	.7	.0	.0	.0
	SOLTERO	50.3	55.4	68.8	43.3	60.4	.0	56.1
	CASADO	22.4	13.4	15.6	27.3	20.8	.0	20.7
	DIVORCIADO	1.6	.9	3.1	2.0	2.1	.0	.0
	SEPARADO	5.4	5.4	6.3	6.3	4.2	.0	2.4
	VIUDO	1.2	.0	.0	2.0	.0	.0	1.2
	UNION LIBRE	19.1	25.0	6.3	19.0	12.5	100.0	19.5
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	10.3	7.1	28.1	11.3	4.2	.0	7.3
	10-14 AÑOS	45.0	58.9	56.3	39.7	39.6	.0	45.1
	15-19 AÑOS	34.3	30.4	12.5	36.3	29.2	100.0	42.7
	20-24 AÑOS	5.2	1.8	.0	6.7	10.4	.0	3.7
	25-29 AÑOS	3.3	1.8	3.1	2.7	14.6	.0	1.2
	30-34 AÑOS	1.2	.0	.0	2.0	2.1	.0	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	.7	.0	.0	1.3	.0	.0	.0
	DIARIO	46.9	67.9	71.9	31.8	45.8	.0	64.6
	2 - 3 VECES POR SEMANA	11.8	6.3	9.4	14.0	10.4	.0	13.4
	1 VEZ POR SEMANA	20.0	8.9	6.3	28.8	25.0	.0	6.1
	1 A 3 VECES POR MES	20.4	16.1	12.5	24.4	18.8	100.0	14.6
	1 A 11 VECES AL AÑO	.9	.9	.0	1.0	.0	.0	1.2

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
TABASCO



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
TABASCO**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=78	n=16	n=7	n=65	n=5	n=56	
SEXO	MASCULINO	92.3	100.0	85.7	96.9	100.0	96.4	
	FEMENINO	7.7	.0	14.3	3.1	.0	3.6	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	16.4	25.0	40.0	16.1	.0	19.6	
	15 - 18 AÑOS	83.6	75.0	60.0	83.9	100.0	80.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	37.2	50.0	57.1	36.9	40.0	41.1	
	SECUNDARIA	41.0	25.0	42.9	41.5	40.0	37.5	
	PREPA	9.0	.0	.0	7.7	.0	7.1	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	12.8	25.0	.0	13.8	20.0	14.3	
	ESTUDIANTE	16.7	6.3	.0	16.9	20.0	16.1	
	EMPLEADO	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	
	SUBEMPLEADO	62.8	81.3	100.0	66.2	60.0	66.1	
HOGAR	HOGAR	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	16.7	12.5	.0	16.9	20.0	17.9	
USA TATUAJES	SI	26.9	37.5	28.6	27.7	40.0	30.4	
	NO	73.1	62.5	71.4	72.3	60.0	69.6	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	25.6	31.3	28.6	26.2	20.0	30.4	
	NO	74.4	68.8	71.4	73.8	80.0	69.6	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	48.7	50.0	57.1	55.4	60.0	53.6	
	NO	51.3	50.0	42.9	44.6	40.0	46.4	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	51.3	50.0	28.6	53.8	60.0	48.2	
	VIOLACION	15.4	6.3	.0	15.4	.0	21.4	
	HOMICIDIO	5.1	6.3	14.3	6.2	.0	5.4	
	LESIONES A TERCEROS	11.5	6.3	.0	9.2	.0	8.9	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	9.0	12.5	28.6	7.7	20.0	10.7	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	1.3	6.3	14.3	.0	20.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	3.8	6.3	.0	4.6	.0	1.8	
	OTROS	2.6	6.3	14.3	3.1	.0	3.6	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	88.3	87.5	85.7	87.5	100.0	85.7
		HOGAR	3.9	.0	14.3	3.1	.0	5.4
		TRABAJO	2.6	12.5	.0	3.1	.0	3.6
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		3.9	.0	.0	4.7	.0	3.6	
OTRO	1.3	.0	.0	1.6	.0	1.8		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
 2007
 TABASCO**

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=23	MARIGUANA n=0	INHALABLES n=0	COCAINA * n=0	TABACO n=4	TRANQUILIZANTES n=0	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=0	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	31.3	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	12.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	18.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	12.5	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	18.8	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	6.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=264 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 TABASCO**

PATOLOGIA (%)	DROGA										
	TABACO n=41	ALCOHOL n=74	ANALGESICOS n=55	TRANQUILIZANTES n=13	ANTIDEPRESIVOS n=7	ANFETAMINAS n=3	MARIGUANA n=1	INHALABLES n=0	COCAINA n=0	HEROINA n=0	ALUCINOGENOS n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	4.9	2.7	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	4.9	1.4	3.6	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	9.8	9.5	34.5	38.5	42.9	33.3	100.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	1.4	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	7.3	8.1	12.7	15.4	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	.0	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	4.9	5.4	7.3	.0	14.3	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	2.4	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	2.4	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEOMUSCULAR	9.8	12.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	2.4	4.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	12.2	8.1	36.4	30.8	42.9	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	17.1	20.3	41.8	38.5	42.9	.0	.0	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	.0	2.7	1.8	7.7	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=264

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
TABASCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=98	n=62	n=30	n=2	n=2	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	74,2	75,8	70,0	50,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	25,8	24,2	30,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	10,3	11,3	6,7	,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	37,1	43,5	30,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	21,6	17,7	26,7	50,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	16,5	17,7	10,0	50,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	3,1	3,2	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	11,3	6,5	23,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	58,8	56,5	60,0	50,0	100,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	CASADO	13,4	11,3	16,7	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	13,4	12,9	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,2	12,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,2	6,5	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,0	,0	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,0	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	9,4	13,1	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	38,5	41,0	33,3	,0	50,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,2	6,6	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	27,1	23,0	30,0	100,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	17,7	14,8	26,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	38,5	40,5	36,8	,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	7,7	9,5	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	12,3	14,3	10,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,4	16,7	15,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	10,8	7,1	15,8	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	7,7	4,8	10,5	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
SOCIOECONOMICO	HOGAR	7,7	7,1	10,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NIVEL ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	10,8	12,8	4,2	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	44,6	44,7	45,8	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	43,2	42,6	45,8	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,4	,0	4,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
TABASCO

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=98	n=6	n=34	n=17	n=25	n=6	n=0	n=0	n=2	n=0	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	72,5	66,7	76,5	64,7	76,0	83,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	FEMENINO	27,5	33,3	23,5	35,3	24,0	16,7	,0	,0	50,0	,0	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	6,6	16,7	2,9	5,9	4,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	38,5	33,3	29,4	58,8	32,0	50,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	20-24	23,1	16,7	23,5	29,4	28,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	17,6	,0	20,6	,0	28,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	30-34	3,3	,0	5,9	,0	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	11,0	33,3	17,6	5,9	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	56,0	50,0	44,1	64,7	60,0	66,7	,0	,0	100,0	,0	,0	100,0
	CASADO	14,3	,0	26,5	11,8	8,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	14,3	16,7	14,7	17,6	16,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	8,8	33,3	5,9	,0	12,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	NO ESPECIFICA	6,6	,0	8,8	5,9	4,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,1	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	1,1	,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	10,0	16,7	5,9	18,8	4,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	34,4	33,3	29,4	25,0	48,0	33,3	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	5,6	33,3	2,9	6,3	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	28,9	,0	29,4	37,5	32,0	16,7	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	18,9	16,7	32,4	6,3	12,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	POSGRADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	33,3	33,3	42,1	42,9	15,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	8,3	,0	,0	7,1	15,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	13,3	33,3	15,8	21,4	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	16,7	,0	21,1	7,1	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	11,7	33,3	5,3	,0	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	8,3	,0	10,5	7,1	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	8,3	,0	5,3	14,3	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	11,4	,0	8,0	15,4	9,5	20,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	45,7	100,0	52,0	46,2	42,9	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	BAJO	41,4	,0	40,0	38,5	47,6	60,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	POBREZA EXTREMA	1,4	,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	65,9	83,3	47,1	82,4	72,0	83,3	,0	,0	50,0	,0	,0	100,0
	ALCOHOL	29,7	16,7	50,0	11,8	20,0	16,7	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
	MARIJUANA	2,2	,0	2,9	,0	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	2,2	,0	,0	5,9	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



TAMAULIPAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
TAMAULIPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=954	n=114	n=185	n=48	n=53	n=9	n=452	n=87	n=	n=1	n=2	n=1
SEXO	MASCULINO	91.1	93.9	88.1	87.5	77.4	77.8	93.6	92.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	8.9	6.1	11.9	12.5	22.6	22.2	6.4	8.0	.0	.0	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.2	4.4	1.1	8.3	5.7	.0	1.3	1.1	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	17.3	21.9	7.6	47.9	24.5	22.2	18.1	6.9	.0	.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	16.9	11.4	6.5	18.8	3.8	22.2	23.2	19.5	50.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	16.2	16.7	11.9	10.4	18.9	22.2	17.3	20.7	.0	.0	.0	100.0
	30-34 AÑOS	14.8	12.3	15.1	4.2	9.4	.0	15.7	23.0	50.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	32.6	33.3	57.8	10.4	37.7	33.3	24.3	28.7	.0	100.0	100.0	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.7	3.5	5.9	2.1	.0	.0	1.3	4.6	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	30.3	28.9	39.5	35.4	15.1	33.3	24.3	47.1	50.0	100.0	50.0	100.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	.0	.5	.0	5.7	.0	.7	1.1	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	37.3	42.1	27.0	45.8	37.7	11.1	40.5	35.6	50.0	.0	.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	3.4	3.5	3.2	2.1	13.2	.0	2.9	1.1	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	21.0	17.5	17.3	14.6	20.8	55.6	25.7	10.3	.0	.0	.0	.0
	LICENCIATURA	4.5	4.4	6.5	.0	7.5	.0	4.6	.0	.0	.0	50.0	.0
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CASADO	24.8	18.4	34.6	10.4	34.0	44.4	21.9	25.3	.0	100.0	100.0	100.0
	SOLTERO	45.1	45.6	30.8	72.9	39.6	33.3	48.2	49.4	50.0	.0	.0	.0
	DIVORCIADO	4.4	1.8	6.5	.0	9.4	.0	3.3	9.2	.0	.0	.0	.0
	SEPARADO	8.4	8.8	8.6	6.3	.0	11.1	10.2	4.6	.0	.0	.0	.0
	VIUDO	1.9	3.5	1.6	.0	3.8	11.1	1.8	.0	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	15.4	21.9	17.8	10.4	13.2	.0	14.6	11.5	50.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	9.4	14.9	7.6	18.8	22.6	22.2	7.7	1.1	.0	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	33.3	16.7	27.6	14.6	20.8	33.3	36.1	73.6	.0	.0	.0	.0
	DESOCUPADO	10.5	13.2	7.0	12.5	5.7	11.1	11.7	9.2	.0	.0	50.0	.0
	TRABAJO FIJO	21.6	21.9	28.6	6.3	20.8	22.2	23.5	5.7	.0	.0	.0	100.0
	TRABAJO OCASIONAL	22.9	30.7	26.5	45.8	24.5	11.1	19.2	8.0	100.0	100.0	50.0	.0
	AMA DE CASA	1.9	.9	2.2	2.1	5.7	.0	1.5	2.3	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.4	1.8	.5	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	61.1	36.0	69.2	47.9	67.9	33.3	59.7	89.7	100.0	.0	100.0	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	21.8	17.5	21.6	45.8	9.4	44.4	24.8	5.7	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	10.6	38.6	1.1	4.2	5.7	11.1	9.7	3.4	.0	100.0	.0	100.0
	POR INDICACION MEDICA	1.4	1.8	1.1	.0	13.2	11.1	.2	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	5.1	6.1	7.0	2.1	3.8	.0	5.5	1.1	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
 TAMAULIPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=954	n=114	n=185	n=48	n=53	n=9	n=452	n=87	n=2	n=1	n=2	n=1
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	69.7	64.9	63.2	66.0	84.9	77.8	68.0	90.8	50.0	100.0	50.0	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	17.2	19.3	18.4	21.3	7.5	11.1	19.3	6.9	.0	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	7.3	9.6	11.4	4.3	3.8	.0	7.3	.0	.0	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	5.7	6.1	7.0	8.5	3.8	11.1	5.3	2.3	.0	.0	50.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	4.3	1.8	2.7	14.6	1.9	11.1	4.0	8.0	.0	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	41.0	33.3	29.2	72.9	32.1	33.3	42.0	58.6	50.0	.0	100.0	.0
	15-19 AÑOS	36.8	43.9	42.2	8.3	39.6	44.4	37.6	25.3	50.0	100.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	8.6	12.3	12.4	.0	13.2	.0	7.3	4.6	.0	.0	.0	100.0
DROGA DE INICIO	25-29 AÑOS	4.2	3.5	5.4	4.2	9.4	.0	3.8	2.3	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	2.7	3.5	5.4	.0	3.8	.0	2.0	1.1	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	2.4	1.8	2.7	.0	.0	11.1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0
	ALCOHOL	25.2	11.4	68.1	2.1	26.4	33.3	16.8	5.7	.0	100.0	50.0	.0
	MARIGUANA	30.8	59.6	7.0	4.2	.0	.0	32.3	72.4	50.0	.0	50.0	.0
	INHALABLES	8.9	2.6	2.2	81.3	1.9	22.2	6.2	9.2	.0	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	1.1	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.8	.9	.0	.0	.0	.0	.2	6.9	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	9.3	.0	2.2	.0	.0	11.1	17.7	4.6	.0	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.6	.0	.5	.0	.0	22.2	.7	.0	.0	.0	.0	.0
BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
TABACO	20.6	25.4	20.0	10.4	71.7	11.1	19.0	.0	50.0	.0	.0	.0	
ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	100.0
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	3.1	.0	.0	2.1	.0	.0	6.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
TAMAULIPAS

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=943	n=294	n=85	n=240	n=119	n=8	n=197
SEXO	MASCULINO	91.4	95.9	91.8	89.6	93.3	50.0	87.3
	FEMENINO	8.6	4.1	8.2	10.4	6.7	50.0	12.7
EDAD	14 AÑOS O MENOS	2.2	2.0	4.7	1.7	.0	.0	3.6
	15-19 AÑOS	17.3	13.6	35.3	10.8	16.8	.0	23.9
	20-24 AÑOS	16.8	20.7	17.6	10.4	20.2	12.5	16.2
	25-29 AÑOS	16.2	17.0	18.8	12.5	22.7	37.5	13.7
	30-34 AÑOS	14.8	16.7	11.8	16.3	14.3	37.5	11.2
	35 AÑOS O MAS	32.7	29.9	11.8	48.3	26.1	12.5	31.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	2.8	1.4	4.7	3.8	2.5	.0	3.0
	PRIMARIA	30.5	31.3	44.7	35.8	19.3	62.5	22.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	.7	.0	.8	.8	.0	1.5
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	37.4	41.8	37.6	31.7	37.0	12.5	39.1
	TECNICO POST-SECUNDARIA	3.4	2.0	1.2	4.2	2.5	.0	6.1
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	20.8	19.4	10.6	19.6	32.8	25.0	21.3
ESTADO CIVIL	LICENCIATURA	4.2	3.4	1.2	4.2	5.0	.0	6.6
	POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	SOLTERO	45.0	50.0	64.7	36.7	34.5	12.5	46.7
	CASADO	24.9	21.4	15.3	32.5	24.4	25.0	25.4
	DIVORCIADO	4.3	4.4	1.2	5.8	3.4	12.5	4.1
	SEPARADO	8.5	8.5	4.7	9.6	10.9	.0	7.6
EDAD DE INICIO	VIUDO	1.8	2.4	2.4	.8	2.5	.0	1.5
	UNION LIBRE	15.5	13.3	11.8	14.6	24.4	50.0	14.7
	9 AÑOS O MENOS	4.3	4.1	17.6	2.9	1.7	.0	2.5
	10-14 AÑOS	41.0	53.7	67.1	27.1	10.9	.0	47.7
	15-19 AÑOS	37.0	32.3	11.8	47.5	40.3	37.5	40.1
	20-24 AÑOS	8.4	4.8	1.2	12.5	16.8	12.5	6.6
FRECUENCIA DE INICIO	25-29 AÑOS	4.2	2.7	2.4	4.2	10.1	37.5	2.5
	30-34 AÑOS	2.8	1.7	.0	3.8	8.4	12.5	.5
	35 AÑOS Y MAS	2.2	.7	.0	2.1	11.8	.0	.0
	DIARIO	68.7	79.9	65.9	55.4	58.8	87.5	74.6
	2 - 3 VECES POR SEMANA	18.9	13.9	25.9	26.7	21.0	12.5	12.7
	1 VEZ POR SEMANA	7.6	3.4	3.5	13.8	12.6	.0	5.6
FRECUENCIA DE INICIO	1 A 3 VECES POR MES	4.7	2.7	4.7	4.2	7.6	.0	6.6
	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.5

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
TAMAULIPAS



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
 TAMAULIPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	HEROINA	TABACO
		n=232	n=81	n=19	n=4	n=56	n=1	n=1
SEXO	MASCULINO	88.8	98.8	100.0	75.0	92.9	100.0	100.0
	FEMENINO	11.2	1.2	.0	25.0	7.1	.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	22.1	13.0	10.5	50.0	17.0	.0	.0
	15 - 18 AÑOS	77.9	87.0	89.5	50.0	83.0	100.0	100.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	46.1	51.9	57.9	50.0	60.7	100.0	100.0
	SECUNDARIA	44.8	38.3	26.3	25.0	32.1	.0	.0
	PREPA	2.2	2.5	5.3	.0	.0	.0	.0
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	6.9	7.4	10.5	25.0	7.1	.0	.0
	ESTUDIANTE	33.6	19.8	31.6	25.0	19.6	.0	.0
	EMPLEADO	12.5	14.8	5.3	25.0	19.6	.0	.0
	SUBEMPLEADO	10.3	11.1	26.3	.0	10.7	100.0	.0
HOGAR	HOGAR	12.5	12.3	10.5	25.0	17.9	.0	.0
	NINGUNA	31.0	42.0	26.3	25.0	32.1	.0	100.0
USA TATUAJES	SI	32.3	51.9	57.9	75.0	48.2	.0	100.0
	NO	67.7	48.1	42.1	25.0	51.8	100.0	.0
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	33.6	46.9	47.4	75.0	51.8	.0	100.0
	NO	66.4	53.1	52.6	25.0	48.2	100.0	.0
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	15.1	33.3	42.1	25.0	19.6	.0	.0
	NO	84.9	66.7	57.9	75.0	80.4	100.0	100.0
TIPO DE INFRACCION	ROBO	78.9	80.2	84.2	75.0	78.6	100.0	100.0
	VIOLACION	3.4	2.5	.0	.0	5.4	.0	.0
	HOMICIDIO	2.6	2.5	5.3	.0	1.8	.0	.0
	LESIONES A TERCEROS	7.3	4.9	5.3	.0	7.1	.0	.0
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	6.0	6.2	5.3	.0	7.1	.0	.0
	SECUESTRO	1.7	2.5	5.3	25.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	4.3	6.2	.0	.0	1.8	.0	.0
	CONSUMO DE DROGAS	1.7	3.7	.0	.0	.0	.0	.0
	PORTACION DE ARMA	13.8	19.8	5.3	25.0	17.9	.0	.0
	OTROS	9.1	6.2	10.5	.0	1.8	.0	.0
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	76.3	76.5	68.4	100.0	66.1	.0
HOGAR		12.5	4.9	5.3	.0	10.7	.0	.0
TRABAJO		1.3	1.2	.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
LUGAR DE RECREO		.4	1.2	.0	.0	1.8	100.0	.0
OTRO	9.5	16.0	26.3	.0	21.4	.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
TAMAULIPAS

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=5	MARIGUANA n=0	INHALABLES n=0	COCAINA * n=0	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=0	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=0	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=584 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007

TAMAULIPAS

PATOLOGIA (%)	DROGA										
	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=131	n=134	n=67	n=28	n=11	n=9	n=11	n=3	n=6	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	3.1	1.5	7.5	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	4.6	5.2	.0	.0	.0	11.1	9.1	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.8	.0	1.5	3.6	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	4.6	5.2	4.5	10.7	9.1	.0	9.1	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.8	.0	1.5	7.1	9.1	11.1	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.0	.0	.0	3.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	3.1	6.0	7.5	10.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	2.3	2.2	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	16.7	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	.8	1.5	9.0	3.6	9.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	.8	1.5	.0	.0	.0	.0	9.1	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	3.8	3.0	6.0	10.7	18.2	22.2	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	3.1	3.7	6.0	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.5	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	7.6	6.7	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	29.0	26.1	28.4	25.0	36.4	33.3	27.3	33.3	16.7	.0	.0
NINGUNA	3.8	4.5	.0	3.6	.0	.0	9.1	.0	.0	.0	.0

N= 584

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
TAMAULIPAS

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=357	n=220	n=87	n=15	n=9	n=20	n=0	n=0	n=0	n=2	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	74,3	70,0	83,9	80,0	77,8	80,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	FEMENINO	25,7	30,0	16,1	20,0	22,2	20,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	13,9	11,2	8,1	14,3	33,3	50,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	15-19	32,4	30,4	34,9	42,9	44,4	35,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	12,4	15,0	5,8	28,6	,0	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	8,4	6,5	15,1	7,1	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	8,1	7,5	9,3	7,1	11,1	5,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	35 Y MAS	24,9	29,4	26,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	53,7	50,5	48,3	73,3	77,8	80,0	,0	,0	,0	100,0	,0	100,0
	CASADO	25,7	29,1	28,7	,0	11,1	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	7,6	6,8	10,3	6,7	,0	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,5	4,5	4,6	13,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	2,8	2,7	4,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,6	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	5,1	5,5	3,4	6,7	11,1	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,6	,5	,0	,0	,0	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	,0	,0	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,1	12,9	11,6	20,0	11,1	15,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SECUNDARIA	41,1	40,0	34,9	46,7	66,7	65,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,4	6,2	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	26,5	26,7	33,7	13,3	22,2	5,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	LICENCIATURA	13,7	13,8	17,4	6,7	,0	10,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,3	,0	,0	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	28,1	27,5	21,1	36,4	16,7	60,0	,0	,0	,0	50,0	,0	100,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,5	2,2	8,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	29,2	25,8	46,5	,0	16,7	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	13,9	13,7	12,7	27,3	,0	13,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,6	6,6	4,2	18,2	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	6,3	6,0	2,8	18,2	33,3	6,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	8,3	12,1	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	4,2	6,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	3,2	3,5	4,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	31,7	33,8	31,9	27,3	22,2	18,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	54,5	52,2	56,9	45,5	55,6	68,8	,0	,0	,0	100,0	,0	100,0
	BAJO	9,0	9,5	6,9	,0	22,2	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,6	1,0	,0	27,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
TAMAULIPAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=357	n=90	n=70	n=52	n=68	n=38	n=1	n=0	n=0	n=3	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	75,8	61,1	80,0	90,4	80,9	73,7	100,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	FEMENINO	24,2	38,9	20,0	9,6	19,1	26,3	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	10,2	1,1	4,4	10,0	6,3	51,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	30,7	15,6	26,5	64,0	21,9	43,2	100,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	20-24	13,4	6,7	19,1	14,0	21,9	5,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	9,3	2,2	10,3	8,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	8,9	7,8	10,3	,0	18,8	,0	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	27,5	66,7	29,4	4,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SOLTERO	49,7	25,6	44,3	82,7	39,7	86,8	100,0	,0	,0	66,7	,0	,0
	CASADO	28,0	58,9	25,7	3,8	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	8,4	2,2	11,4	7,7	13,2	7,9	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	SEPARADO	5,3	5,6	7,1	3,8	7,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,1	5,6	4,3	,0	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	2,2	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	4,7	,0	5,7	1,9	11,8	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,6	,0	,0	,0	1,5	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,3	,0	,0	,0	,0	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,5	9,2	15,2	15,7	10,8	21,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	SECUNDARIA	37,9	27,6	33,3	45,1	36,9	63,2	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	4,8	12,6	3,0	,0	1,5	2,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	27,3	29,9	33,3	27,5	29,2	7,9	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
OCUPACION	LICENCIATURA	15,1	20,7	15,2	11,8	18,5	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	POSGRADO	,3	,0	,0	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	21,2	8,5	13,3	40,0	18,5	68,4	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	4,2	1,2	11,7	5,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	32,0	36,6	48,3	12,5	31,5	,0	100,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,4	8,5	10,0	25,0	24,1	15,8	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	DESEMPLEADO	6,6	3,7	8,3	7,5	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	6,6	2,4	5,0	10,0	9,3	15,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	9,3	24,4	3,3	,0	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	4,6	14,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	3,5	1,2	9,7	4,3	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	31,9	44,2	30,6	23,9	37,0	6,1	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	MEDIO BAJO	53,0	48,8	48,4	54,3	48,1	75,8	100,0	,0	,0	66,7	,0	,0
DROGA DE INICIO	BAJO	10,2	5,8	11,3	10,9	13,0	15,2	,0	,0	,0	15,2	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,4	,0	,0	6,5	,0	3,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TABACO	65,0	79,8	56,5	61,5	61,8	60,5	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	ALCOHOL	25,0	19,1	42,0	21,2	23,5	15,8	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	MARIGUANA	3,4	1,1	,0	9,6	4,4	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	2,2	,0	1,4	1,9	7,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	4,1	,0	,0	5,8	2,9	18,4	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



INFORME 2007

TLAXCALA



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
TLAXCALA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.ILEGALES ***	
		n=1090	n=35	n=884	n=82	n=4	n=1	n=76	n=4	n=1	n=1	n=2	
SEXO	MASCULINO	95.6	94.3	96.3	95.1	75.0	100.0	89.5	100.0	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	4.4	5.7	3.7	4.9	25.0	.0	10.5	.0	.0	.0	.0	
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	2.9	.8	3.7	.0	.0	3.9	.0	.0	.0	.0	
	15-19 AÑOS	6.6	2.9	4.1	25.6	25.0	.0	13.2	50.0	.0	100.0	.0	
	20-24 AÑOS	8.8	22.9	6.4	14.6	25.0	.0	22.4	.0	.0	.0	50.0	
	25-29 AÑOS	13.4	22.9	11.7	29.3	25.0	.0	11.8	25.0	.0	.0	.0	
	30-34 AÑOS	15.8	31.4	15.3	15.9	.0	.0	14.5	.0	100.0	.0	50.0	
	35 AÑOS O MAS	54.1	17.1	61.8	11.0	25.0	100.0	34.2	25.0	.0	.0	.0	
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	7.5	.0	8.4	6.1	.0	100.0	2.6	.0	.0	.0	.0	
	PRIMARIA	39.2	37.1	40.8	29.3	25.0	.0	34.2	25.0	.0	.0	50.0	
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	.0	.8	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	31.2	54.3	29.6	41.5	.0	.0	28.9	50.0	.0	100.0	.0	
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	.0	.9	3.7	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.6	8.6	14.8	17.1	50.0	.0	23.7	.0	100.0	.0	50.0	
	LICENCIATURA	4.2	.0	4.2	.0	25.0	.0	10.5	.0	.0	.0	.0	
	POSGRADO	.4	.0	.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTADO CIVIL	CASADO	38.8	11.4	43.3	14.6	.0	.0	28.9	50.0	.0	.0	.0
		SOLTERO	36.8	65.7	31.9	70.7	100.0	.0	36.8	50.0	100.0	100.0	100.0
DIVORCIADO		4.0	.0	4.1	2.4	.0	100.0	6.6	.0	.0	.0	.0	
SEPARADO		7.3	5.7	7.4	7.3	.0	.0	9.2	.0	.0	.0	.0	
VIUDO		2.3	.0	2.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	10.7	17.1	10.5	4.9	.0	.0	18.4	.0	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	2.1	2.9	1.2	6.3	.0	.0	6.6	25.0	.0	.0	.0	
	DESEMPLEADO	40.2	42.9	38.9	56.3	50.0	100.0	35.5	25.0	100.0	.0	50.0	
	DESOCUPADO	5.0	.0	5.3	6.3	.0	.0	2.6	.0	.0	.0	.0	
	TRABAJO FIJO	27.8	28.6	29.2	16.3	25.0	.0	22.4	50.0	.0	.0	50.0	
	TRABAJO OCASIONAL	22.0	25.7	21.9	13.8	.0	.0	31.6	.0	.0	100.0	.0	
	AMA DE CASA	1.1	.0	1.2	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	
	JUBILADO	1.9	.0	2.1	1.3	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	VOLUNTARIO	5.2	8.6	5.0	3.7	.0	.0	6.6	25.0	100.0	.0	.0	
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	93.8	91.4	93.9	96.3	100.0	100.0	92.1	75.0	.0	100.0	100.0	
	POR INDICACION LEGAL	.2	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	POR INDICACION MEDICA	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	.6	.0	.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
TLAXCALA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.ILEGALES ***
		n=1090	n=35	n=884	n=82	n=4	n=1	n=76	n=4	n=1	n=1	n=2
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	42.3	54.3	42.4	39.0	25.0	100.0	40.8	.0	100.0	.0	50.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	30.0	31.4	29.4	34.1	25.0	.0	34.2	25.0	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	12.5	11.4	12.9	12.2	.0	.0	10.5	.0	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	15.1	2.9	15.3	14.6	50.0	.0	14.5	50.0	.0	100.0	50.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	25.0	.0	.0	.0
	9 AÑOS O MENOS	5.9	.0	5.0	12.2	.0	.0	7.9	50.0	100.0	.0	50.0
	10-14 AÑOS	32.8	45.7	29.0	51.2	25.0	.0	51.3	25.0	.0	100.0	50.0
	15-19 AÑOS	43.5	42.9	45.4	34.1	50.0	100.0	34.2	25.0	.0	.0	.0
	20-24 AÑOS	9.6	8.6	11.1	2.4	25.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	4.7	2.9	5.4	.0	.0	.0	2.6	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	30-34 AÑOS	1.5	.0	1.7	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	2.1	.0	2.5	.0	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	ALCOHOL	86.7	42.9	95.5	48.8	25.0	100.0	53.9	25.0	100.0	.0	50.0
	MARIGUANA	4.5	54.3	1.4	9.8	.0	.0	10.5	25.0	.0	.0	50.0
	INHALABLES	2.8	.0	.3	31.7	.0	.0	1.3	25.0	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	1.1	2.9	.1	.0	.0	.0	13.2	.0	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.2	.0	.0	1.2	.0	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	3.6	.0	2.7	7.3	75.0	.0	5.3	25.0	.0	100.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
CRACK	1.1	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	14.5	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
 TLAXCALA**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=1088	n=49	n=31	n=945	n=24	n=39
SEXO	MASCULINO	95.6	95.9	90.3	96.2	87.5	89.7
	FEMENINO	4.4	4.1	9.7	3.8	12.5	10.3
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.3	2.0	.0	.7	8.3	10.3
	15-19 AÑOS	6.6	2.0	32.3	4.8	20.8	28.2
	20-24 AÑOS	8.8	20.4	16.1	7.3	25.0	15.4
	25-29 AÑOS	13.3	28.6	25.8	12.6	8.3	5.1
	30-34 AÑOS	15.8	22.4	9.7	16.2	4.2	10.3
	35 AÑOS O MAS	54.1	24.5	16.1	58.4	33.3	30.8
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	7.5	.0	3.2	8.5	.0	2.6
	PRIMARIA	39.2	24.5	29.0	41.3	50.0	10.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	.8	2.0	6.5	.6	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	31.3	53.1	41.9	29.9	29.2	28.2
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	.0	3.2	1.1	.0	2.6
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	15.4	18.4	16.1	14.7	16.7	28.2
	LICENCIATURA	4.2	2.0	.0	3.5	4.2	28.2
	POSGRADO	.4	.0	.0	.4	.0	.0
	ESTADO CIVIL	SOLTERO	36.9	53.1	74.2	33.3	45.8
	CASADO	38.7	20.4	6.5	41.8	29.2	17.9
	DIVORCIADO	4.0	4.1	.0	4.1	4.2	5.1
	SEPARADO	7.4	6.1	9.7	7.6	8.3	.0
	VIUDO	2.3	.0	.0	2.6	.0	.0
	UNION LIBRE	10.8	16.3	9.7	10.5	12.5	10.3
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	5.9	8.2	6.5	5.4	8.3	12.8
	10-14 AÑOS	32.7	42.9	48.4	31.2	33.3	43.6
	15-19 AÑOS	43.5	36.7	41.9	44.3	41.7	33.3
	20-24 AÑOS	9.7	6.1	3.2	10.2	4.2	10.3
	25-29 AÑOS	4.7	6.1	.0	5.0	4.2	.0
	30-34 AÑOS	1.5	.0	.0	1.6	4.2	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	2.1	.0	.0	2.3	4.2	.0
	DIARIO	41.5	44.9	41.9	42.8	37.5	7.7
	2 - 3 VECES POR SEMANA	26.7	30.6	19.4	26.5	33.3	28.2
	1 VEZ POR SEMANA	13.1	8.2	16.1	13.5	12.5	7.7
	1 A 3 VECES POR MES	18.7	16.3	22.6	17.1	16.7	56.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	.1	.0	.0	.1	.0	.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
TLAXCALA



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
TLAXCALA

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	
		n=37	n=4	n=5	n=25	n=1	n=18	
SEXO	MASCULINO	97.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	5.4	.0	.0	4.0	.0	5.6	
	15 - 18 AÑOS	94.6	100.0	100.0	96.0	100.0	94.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	27.8	66.7	75.0	37.5	100.0	47.1	
	SECUNDARIA	61.1	33.3	25.0	50.0	.0	47.1	
	PREPA	8.3	.0	.0	8.3	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	2.8	.0	.0	4.2	.0	5.9	
	ESTUDIANTE	21.6	.0	.0	8.0	.0	.0	
	EMPLEADO	32.4	25.0	20.0	28.0	100.0	33.3	
HOGAR	SUBEMPLEADO	24.3	25.0	20.0	36.0	.0	27.8	
	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	NINGUNA	21.6	50.0	60.0	28.0	.0	38.9	
USA TATUAJES	SI	16.2	50.0	20.0	20.0	.0	16.7	
	NO	83.8	50.0	80.0	80.0	100.0	83.3	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	10.8	25.0	20.0	12.0	100.0	22.2	
	NO	89.2	75.0	80.0	88.0	.0	77.8	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	29.7	50.0	80.0	44.0	.0	44.4	
	NO	70.3	50.0	20.0	56.0	100.0	55.6	
TIPO DE INFRACCION	ROBO	67.6	75.0	60.0	64.0	100.0	66.7	
	VIOLACION	8.1	.0	20.0	8.0	.0	5.6	
	HOMICIDIO	2.7	.0	.0	4.0	.0	5.6	
	LESIONES A TERCEROS	18.9	25.0	20.0	24.0	.0	22.2	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	2.7	.0	.0	.0	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	91.9	75.0	80.0	96.0	.0	88.9
		HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0
		TRABAJO	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		2.7	.0	.0	4.0	.0	5.6	
AEROPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO	.0	.0	.0	.0	.0	.0		
OTRO	5.4	25.0	20.0	.0	100.0	5.6		



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
TLAXCALA

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	MARIJUANA	
		n=9	n=8	n=	
SEXO	MASCULINO	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	.0	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	.0	.0	.0	
	20 - 24 AÑOS	.0	.0	.0	
	25 - 29 AÑOS	.0	.0	.0	
	30 - 34 AÑOS	33.3	37.5	.0	
	35 - 39 AÑOS	33.3	25.0	100.0	
	40 AÑOS O MÁS	33.3	37.5	.0	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	11.1	12.5	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	22.2	25.0	.0	
	CAIDA	22.2	25.0	.0	
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	
	QUEMADO	.0	.0	.0	
	GOLPES	.0	.0	.0	
	ASFIXIA	.0	.0	.0	
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0	.0	
	VIOLACION	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	11.1	.0	100.0	
	ENVENENADO	.0	.0	.0	
	OTRAS	33.3	37.5	.0	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	37.5	37.5	.0
		CASA	12.5	12.5	.0
		CALLE	50.0	50.0	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		.0	.0	.0	
TRABAJO		.0	.0	.0	
ARES DE SERVICIO		.0	.0	.0	
OTROS		.0	.0	.0	

N=317 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
TLAXCALA

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=13	MARIGUANA n=0	INHALABLES n=0	COCAINA * n=3	TABACO n=0	TRANQUILIZANTES n=3	HEROINA n=0	CRISTAL** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=0	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	28.6	.0	.0	100.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	14.3	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=780 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 TLAXCALA**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=155	n=148	n=14	n=5	n=0	n=4	n=1	n=3	n=0	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	5.8	4.7	14.3	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	4.5	4.1	7.1	.0	.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.6	.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	1.9	1.4	.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	6.5	4.7	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.6	2.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	4.5	3.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	5.8	7.4	.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	1.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	6.5	2.7	7.1	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	1.3	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	3.9	3.4	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	38.1	45.3	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
NINGUNA	1.9	1.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=780

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



VERACRUZ



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL n=1937	MARIGUANA n=268	ALCOHOL n=979	INHALABLES n=83	TABACO n=14	TRANQUILIZANTES n=9	COCAINA* n=545	HEROINA n=6	CRISTAL n=13	ROHYPNOL n=4	D.MEDICAS ** n=6	D.ILEGALES *** n=10
SEXO	MASCULINO	92.4	95.1	92.0	85.5	85.7	88.9	93.4	66.7	92.3	75.0	100.0	90.0
	FEMENINO	7.6	4.9	8.0	14.5	14.3	11.1	6.6	33.3	7.7	25.0	.0	10.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.9	3.0	1.5	7.2	.0	.0	.9	.0	7.7	.0	.0	20.0
	15-19 AÑOS	16.7	28.0	12.4	38.6	21.4	11.1	16.1	.0	15.4	.0	.0	20.0
	20-24 AÑOS	18.9	26.1	12.0	21.7	14.3	11.1	27.5	.0	38.5	25.0	.0	20.0
	25-29 AÑOS	16.8	15.7	13.1	15.7	7.1	22.2	23.7	66.7	15.4	.0	50.0	10.0
	30-34 AÑOS	11.8	11.9	10.5	9.6	21.4	11.1	14.1	16.7	7.7	.0	16.7	10.0
	35 AÑOS O MAS	33.9	15.3	50.6	7.2	35.7	44.4	17.6	16.7	15.4	75.0	33.3	20.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.0	.7	6.7	4.8	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	25.8	17.5	32.4	42.2	21.4	11.1	16.0	33.3	7.7	25.0	.0	50.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.2	2.2	1.1	1.2	.0	.0	.7	.0	7.7	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAACIONAL	33.0	32.8	29.4	38.6	42.9	33.3	39.2	33.3	7.7	25.0	16.7	40.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	3.1	4.9	3.8	1.2	.0	.0	1.5	.0	.0	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	22.4	24.3	18.2	10.8	14.3	22.2	31.1	16.7	38.5	25.0	16.7	10.0
	LICENCIATURA	10.2	17.5	8.1	1.2	21.4	33.3	9.9	16.7	30.8	25.0	66.7	.0
	POSGRADO	.3	.0	.3	.0	.0	.0	.4	.0	7.7	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	22.8	10.4	28.5	11.0	42.9	11.1	20.7	.0	15.4	.0	.0	30.0
	SOLTERO	50.7	74.3	40.8	74.4	42.9	66.7	52.7	50.0	84.6	75.0	33.3	40.0
	DIVORCIADO	2.4	3.4	1.8	.0	.0	.0	3.3	.0	.0	25.0	16.7	.0
	SEPARADO	10.0	5.2	13.0	6.1	7.1	11.1	7.5	33.3	.0	.0	16.7	10.0
	VIUDO	2.1	1.1	2.8	1.2	.0	.0	1.7	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	12.0	5.6	13.0	7.3	7.1	11.1	14.1	16.7	.0	.0	33.3	20.0
	ESTUDIANTE	8.9	22.8	6.5	12.0	7.1	11.1	6.3	.0	7.7	.0	16.7	.0
	DESEMPLEADO	21.0	30.2	14.2	16.9	7.1	22.2	29.6	16.7	30.8	25.0	16.7	10.0
	DESOCUPADO	11.7	14.9	9.1	15.7	14.3	11.1	13.6	.0	7.7	25.0	.0	40.0
	TRABAJO FIJO	23.0	8.6	28.0	13.3	21.4	22.2	22.6	.0	30.8	25.0	50.0	20.0
	TRABAJO OCASIONAL	31.8	22.4	36.2	39.8	35.7	33.3	27.4	66.7	23.1	25.0	16.7	30.0
	AMA DE CASA	1.8	.7	2.7	2.4	14.3	.0	.4	16.7	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	1.8	.4	3.3	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	42.2	34.2	32.5	32.5	28.6	55.6	64.7	50.0	46.2	75.0	66.7	20.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	55.7	61.7	65.7	66.3	71.4	44.4	33.3	50.0	53.8	25.0	33.3	80.0
	POR INDICACION LEGAL	1.0	.8	1.1	.0	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.6	1.5	.4	.0	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.5	1.9	.3	1.2	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=1937	n=268	n=979	n=83	n=14	n=9	n=545	n=6	n=13	n=4	n=6	n=10
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	65.0	65.7	61.2	75.9	85.7	77.8	68.5	33.3	69.2	100.0	100.0	80.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	18.6	21.6	18.7	10.8	7.1	11.1	19.4	.0	15.4	.0	.0	20.0
	1 VEZ POR SEMANA	11.3	9.0	14.1	7.2	.0	.0	9.2	.0	7.7	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	4.4	2.6	5.7	6.0	.0	.0	2.6	50.0	7.7	.0	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.6	1.1	.3	.0	7.1	11.1	.4	16.7	.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	2.6	2.6	2.3	6.0	7.1	.0	2.4	.0	.0	.0	.0	10.0
	10-14 AÑOS	39.6	51.9	33.0	60.2	21.4	44.4	43.1	66.7	30.8	25.0	.0	40.0
	15-19 AÑOS	43.3	36.2	45.1	32.5	50.0	11.1	44.6	33.3	69.2	50.0	66.7	50.0
	20-24 AÑOS	8.3	1.1	12.1	.0	7.1	11.1	6.4	.0	.0	25.0	16.7	.0
	25-29 AÑOS	3.8	7.8	3.9	.0	.0	22.2	2.0	.0	.0	.0	16.7	.0
	30-34 AÑOS	1.2	.4	1.5	1.2	.0	.0	1.1	.0	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.3	.0	2.0	.0	14.3	11.1	.4	.0	.0	.0	.0	.0
	DROGA DE INICIO	ALCOHOL	72.9	47.4	92.2	36.1	21.4	55.6	60.7	50.0	23.1	25.0	16.7
	MARIGUANA	15.2	46.6	4.2	15.7	.0	11.1	18.9	33.3	38.5	50.0	.0	20.0
	INHALABLES	4.8	3.4	2.2	42.2	.0	.0	4.6	.0	.0	.0	33.3	.0
	ALUCINOGENOS	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	20.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	50.0	.0
	COCAINA	3.4	1.5	.5	3.6	.0	.0	9.4	16.7	15.4	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.3	.0	.1	.0	7.1	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	1.5	.7	.7	.0	71.4	.0	1.8	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	10.0
	BASUCO	.2	.0	.0	1.2	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	23.1	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.2	.4	.0	1.2	.0	.0	.2	.0	.0	25.0	.0	.0
	CRACK	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.7	.0	.0	.0	.0	.0
	REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=1918	n=294	n=93	n=1412	n=90	n=29
SEXO	MASCULINO	92.5	95.9	87.1	92.4	90.0	89.7
	FEMENINO	7.5	4.1	12.9	7.6	10.0	10.3
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.9	2.7	5.4	1.5	2.2	.0
	15-19 AÑOS	16.7	26.5	28.0	13.7	23.3	6.9
	20-24 AÑOS	19.0	23.5	24.7	16.6	32.2	31.0
	25-29 AÑOS	16.7	18.0	16.1	16.4	20.0	13.8
	30-34 AÑOS	11.8	11.6	8.6	12.0	11.1	13.8
	35 AÑOS O MAS	33.9	17.7	17.2	39.9	11.1	34.5
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	4.0	1.4	4.3	4.8	1.1	.0
	PRIMARIA	25.6	22.3	33.3	26.8	13.3	14.3
	TECNICO POST-PRIMARIA	1.2	2.1	3.2	.9	1.1	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	33.2	35.4	45.2	31.1	45.6	35.7
	TECNICO POST-SECUNDARIA	3.1	1.7	3.2	3.6	1.1	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	22.6	26.5	8.6	22.2	27.8	32.1
	LICENCIATURA	10.1	10.7	2.2	10.3	10.0	17.9
ESTADO CIVIL	POSGRADO	.3	.0	.0	.4	.0	.0
	SOLTERO	50.5	64.3	59.8	46.1	63.3	51.7
	CASADO	22.8	12.9	16.3	25.3	21.1	27.6
	DIVORCIADO	2.5	3.4	.0	2.5	1.1	3.4
	SEPARADO	10.0	7.8	12.0	10.6	6.7	10.3
	VIUDO	2.1	2.0	.0	2.3	1.1	.0
EDAD DE INICIO	UNION LIBRE	12.1	9.5	12.0	13.1	6.7	6.9
	9 AÑOS O MENOS	2.6	2.7	7.5	2.3	.0	6.9
	10-14 AÑOS	39.7	46.6	55.9	38.5	18.9	44.8
	15-19 AÑOS	43.4	40.5	32.3	44.2	55.6	31.0
	20-24 AÑOS	8.2	2.7	4.3	9.4	11.1	10.3
	25-29 AÑOS	3.7	7.1	.0	3.0	7.8	.0
	30-34 AÑOS	1.1	.3	.0	1.2	4.4	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.3	.0	.0	1.4	2.2	6.9
	DIARIO	53.4	61.9	67.4	49.4	62.2	86.2
	2 - 3 VECES POR SEMANA	20.5	18.7	15.2	21.7	17.8	6.9
	1 VEZ POR SEMANA	18.7	12.6	13.0	20.9	15.6	3.4
	1 A 3 VECES POR MES	6.8	5.8	4.3	7.4	4.4	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	.6	1.0	.0	.5	.0	3.4

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
VERACRUZ



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA
		n=30	n=16	n=7	n=20	n=12
SEXO	MASCULINO	96.7	93.8	100.0	95.0	100.0
	FEMENINO	3.3	6.3	.0	5.0	.0
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	16.7	31.3	28.6	5.0	25.0
	15 - 18 AÑOS	83.3	68.8	71.4	95.0	75.0
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	60.0	75.0	85.7	55.0	50.0
	SECUNDARIA	10.0	12.5	14.3	10.0	16.7
	PREPA	20.0	.0	.0	25.0	16.7
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0
OCUPACION	NO ESTUDIO	10.0	12.5	.0	10.0	16.7
	ESTUDIANTE	16.7	.0	.0	20.0	8.3
	EMPLEADO	33.3	37.5	.0	40.0	33.3
	SUBEMPLEADO	36.7	43.8	85.7	35.0	41.7
USA TATUAJES	HOGAR	.0	.0	.0	.0	.0
	NINGUNA	13.3	18.8	14.3	5.0	16.7
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	SI	36.7	43.8	42.9	40.0	58.3
	NO	63.3	56.3	57.1	60.0	41.7
INFRACCION BAJO INTOXICACION	SI	26.7	37.5	42.9	25.0	41.7
	NO	73.3	62.5	57.1	75.0	58.3
TIPO DE INFRACCION	SI	55.2	40.0	66.7	65.0	66.7
	NO	44.8	60.0	33.3	35.0	33.3
	ROBO	50.0	62.5	71.4	45.0	66.7
	VIOLACION	10.0	12.5	14.3	5.0	16.7
	HOMICIDIO	23.3	12.5	14.3	25.0	8.3
	LESIONES A TERCEROS	10.0	.0	.0	15.0	8.3
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	.0	.0	.0	.0	.0
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0
	DELITOS CONTRA LA SALUD	10.0	18.8	.0	10.0	.0
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0
	PORTACION DE ARMA	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	56.7	56.3	42.9	60.0
HOGAR		23.3	25.0	28.6	20.0	25.0
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	.0
ESCUELA		6.7	.0	.0	5.0	8.3
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0
LUGAR DE RECREO	6.7	12.5	.0	10.0	.0	
OTRO	6.7	6.3	28.6	5.0	.0	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL
		n=20	n=19
SEXO	MASCULINO	95.0	94.7
	FEMENINO	5.0	5.3
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	5.0	5.3
	15 - 19 AÑOS	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	10.0	10.5
	25 - 29 AÑOS	10.0	10.5
	30 - 34 AÑOS	20.0	21.1
	35 - 39 AÑOS	15.0	15.8
	40 AÑOS O MÁS	40.0	36.8
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	10.0	10.5
	ACCIDENTE DE TRANSITO	10.0	10.5
	CAIDA	10.0	10.5
	ELECTROCUTADO	.0	.0
	QUEMADO	5.0	5.3
	GOLPES	.0	.0
	ASFIXIA	15.0	15.8
	APLASTAMIENTO	10.0	10.5
	ARMA DE FUEGO	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0
	INTOXICADO	5.0	.0
	ENVENENADO	5.0	5.3
	OTRAS	30.0	31.6
LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	20.0	21.1
	CASA	5.0	5.3
	CALLE	40.0	42.1
	BAÑOS PUBLICOS	.0	.0
	AREAS ESCOLARES	.0	.0
	AREAS RECREATIVAS	20.0	21.1
	TRABAJO	.0	.0
	ARES DE SERVICIO	5.0	5.3
	OTROS	10.0	5.3

N= 195 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
VERACRUZ

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=424	n=242	n=125	n=22	n=7	n=18	n=1	n=0	n=0	n=2	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	72,7	71,9	70,4	86,4	85,7	72,2	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	FEMENINO	27,3	28,1	29,6	13,6	14,3	27,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	11,5	13,2	9,6	,0	14,3	16,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	35,5	33,1	32,0	59,1	42,9	61,1	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	15,3	14,9	17,6	9,1	14,3	11,1	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	25-29	11,3	11,6	11,2	18,2	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	8,2	9,1	9,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	18,2	18,2	20,0	13,6	14,3	11,1	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	57,8	54,5	61,6	77,3	28,6	66,7	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	CASADO	17,7	20,2	16,8	4,5	,0	11,1	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	U. LIBRE	8,4	7,9	8,0	9,1	28,6	5,6	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,4	7,4	9,6	4,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,7	,8	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,2	1,7	,0	,0	,0	5,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	6,7	7,4	4,0	4,5	28,6	11,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCR	2,0	2,1	2,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,4	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,4	14,5	8,3	4,8	,0	44,4	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	SECUNDARIA	34,5	35,9	31,7	28,6	42,9	38,9	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,7	4,3	2,5	,0	14,3	5,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	30,3	28,2	35,0	52,4	42,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	14,9	14,1	17,5	14,3	,0	11,1	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,7	,4	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	34,3	33,9	33,9	42,1	40,0	37,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,8	2,7	5,5	5,3	,0	,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	27,1	25,8	29,4	31,6	,0	31,3	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	11,8	9,0	16,5	10,5	40,0	6,3	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,0	8,1	4,6	,0	20,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,7	10,4	9,2	10,5	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,3	6,3	,9	,0	,0	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	2,1	3,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	4,0	4,3	4,3	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	18,2	18,5	20,5	14,3	14,3	6,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
MEDIO BAJO	44,2	50,0	32,5	38,1	57,1	50,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	
BAJO	32,8	26,3	41,9	47,6	28,6	43,8	,0	,0	,0	50,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	,8	,9	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
VERACRUZ**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=424	n=38	n=133	n=59	n=112	n=51	n=6	n=0	n=2	n=6	n=0	n=1
SEXO	MASCULINO	73,3	55,3	69,9	83,1	76,8	74,5	83,3	,0	100,0	83,3	,0	,0
	FEMENINO	26,7	44,7	30,1	16,9	23,2	25,5	16,7	,0	,0	16,7	,0	100,0
EDAD ACTUAL	9 O MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	11,5	10,5	13,5	3,4	3,6	31,4	33,3	,0	50,0	,0	,0	,0
	15-19	36,4	7,9	36,8	49,2	29,7	56,9	16,7	,0	,0	50,0	,0	100,0
	20-24	15,5	7,9	10,5	27,1	22,5	5,9	16,7	,0	,0	16,7	,0	,0
	25-29	11,3	2,6	11,3	8,5	21,6	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	30-34	7,6	13,2	9,8	,0	9,9	2,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	17,7	57,9	18,0	11,9	12,6	2,0	16,7	,0	50,0	33,3	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	58,6	23,7	60,9	72,9	50,9	74,5	66,7	,0	100,0	66,7	,0	100,0
	CASADO	17,4	50,0	15,8	6,8	20,5	2,0	33,3	,0	,0	16,7	,0	,0
	U. LIBRE	7,6	5,3	7,5	6,8	13,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	7,4	7,9	8,3	10,2	7,1	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	,7	5,3	,0	,0	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	1,2	5,3	1,5	,0	,0	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	7,1	2,6	6,0	3,4	7,1	17,6	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1,8	,0	,8	5,4	,9	4,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,0	1,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	13,5	18,9	11,7	8,9	13,9	16,3	33,3	,0	,0	16,7	,0	,0
	SECUNDARIA	34,9	16,2	33,6	26,8	32,4	65,3	33,3	,0	100,0	33,3	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,3	5,4	4,7	,0	2,8	2,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	BACHILLERATO	30,8	21,6	28,9	46,4	37,0	12,2	33,3	,0	,0	16,7	,0	100,0
	LICENCIATURA	14,5	32,4	18,0	12,5	13,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,8	5,4	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	34,9	19,4	36,6	40,4	24,5	60,9	20,0	,0	50,0	20,0	,0	100,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,6	,0	6,3	5,8	1,0	2,2	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	26,9	36,1	35,7	21,2	27,5	6,5	,0	,0	,0	40,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	11,4	2,8	9,8	15,4	14,7	8,7	40,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,5	,0	4,5	7,7	11,8	8,7	20,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	DESOCUPADO	9,4	,0	5,4	9,6	15,7	13,0	,0	,0	50,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,2	19,4	1,8	,0	4,9	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	2,2	22,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	4,1	24,3	3,2	,0	1,9	,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	18,3	29,7	16,8	12,3	24,3	4,2	33,3	,0	50,0	,0	,0	100,0
	MEDIO BAJO	44,1	27,0	44,8	43,9	50,5	43,8	33,3	,0	,0	60,0	,0	,0
	BAJO	32,7	16,2	35,2	42,1	23,4	16,7	,0	,0	50,0	40,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,8	2,7	,0	1,8	,0	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	58,9	78,9	56,9	44,8	61,8	60,0	33,3	,0	50,0	66,7	,0	100,0
	ALCOHOL	29,2	21,1	40,0	29,3	25,5	14,0	66,7	,0	50,0	,0	,0	,0
	MARIGUANA	5,5	,0	3,1	25,9	1,8	2,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	1,7	,0	,0	,0	6,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	4,0	,0	,0	,0	3,6	24,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,2	,0	,0	,0	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



YUCATAN



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		DROGA DE IMPACTO									
		GLOBAL n=744	MARIGUANA n=20	ALCOHOL n=668	INHALABLES n=7	TABACO n=101	COCAINA* n=136	HEROINA n=2	CRISTAL n=	D.MEDICAS ** n=1	D.ILEGALES *** n=4
SEXO	MASCULINO	85.0	90.0	79.6	100.0	99.0	98.5	100.0	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	15.0	10.0	20.4	.0	1.0	1.5	.0	.0	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	11.3	35.0	9.1	42.9	9.9	16.2	50.0	100.0	.0	25.0
	20-24 AÑOS	15.6	.0	12.1	28.6	6.9	41.9	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	10.9	20.0	10.0	14.3	7.9	14.0	50.0	.0	.0	50.0
	30-34 AÑOS	13.7	10.0	14.1	14.3	7.9	17.6	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	48.4	35.0	54.5	.0	67.3	10.3	.0	.0	100.0	25.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	8.9	20.0	9.0	14.3	12.9	3.7	50.0	.0	.0	.0
	PRIMARIA	49.3	20.0	54.3	57.1	56.4	25.0	.0	.0	.0	25.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	.9	10.0	.7	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0
	SECUNDARIA O PREVOCAIONAL	24.9	40.0	20.5	28.6	18.8	47.8	50.0	.0	.0	50.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	5.0	.4	.0	.0	2.9	.0	100.0	100.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	11.5	5.0	10.5	.0	10.9	18.4	.0	.0	.0	25.0
	LICENCIATURA	3.3	.0	4.2	.0	1.0	1.5	.0	.0	.0	.0
	POSGRADO	.2	.0	.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ESTADO CIVIL	CASADO	63.7	40.0	72.2	42.9	69.3	24.3	.0	.0	.0	75.0
	SOLTERO	27.2	40.0	22.2	42.9	23.8	50.7	100.0	100.0	100.0	.0
	DIVORCIADO	1.2	5.0	.4	14.3	.0	4.4	.0	.0	.0	.0
	SEPARADO	3.6	10.0	1.8	.0	.0	14.0	.0	.0	.0	25.0
	VIUDO	1.4	.0	1.6	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
	UNION LIBRE	2.9	5.0	1.8	.0	5.0	6.6	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	ESTUDIANTE	6.9	5.0	7.2	.0	9.9	4.4	.0	.0	.0	.0
	DESEMPLEADO	11.4	35.0	2.8	14.3	5.9	50.7	.0	100.0	100.0	75.0
	DESOCUPADO	4.8	15.0	2.7	28.6	1.0	15.4	.0	.0	.0	.0
	TRABAJO FIJO	35.2	15.0	36.8	.0	50.5	21.3	50.0	.0	.0	25.0
	TRABAJO OCASIONAL	32.2	20.0	37.9	57.1	29.7	8.1	50.0	.0	.0	.0
	AMA DE CASA	8.6	5.0	11.8	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.9	5.0	.7	.0	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	91.6	80.0	95.1	100.0	96.0	72.8	50.0	100.0	100.0	100.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	4.4	10.0	.9	.0	1.0	22.8	50.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	.6	10.0	.1	.0	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.3	.0	.0	.0	.0	2.2	.0	.0	.0	.0
	OTROS	3.1	.0	3.9	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=940	n=20	n=668	n=7	n=101	n=136	n=2	n=1	n=1	n=4
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	28.2	80.0	9.5	85.7	59.0	84.6	.0	100.0	.0	75.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.6	10.0	8.3	14.3	10.0	8.8	.0	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	18.9	10.0	22.9	.0	16.0	4.4	.0	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	19.1	.0	24.1	.0	14.0	2.2	100.0	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	1 A 11 VECES AL AÑO	25.2	.0	35.1	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	25.0
	9 AÑOS O MENOS	.7	5.0	.6	.0	.0	.7	50.0	.0	.0	.0
	10-14 AÑOS	15.5	60.0	7.5	71.4	13.9	44.9	50.0	100.0	100.0	25.0
	15-19 AÑOS	47.8	20.0	48.7	28.6	61.4	39.0	.0	.0	.0	75.0
	20-24 AÑOS	25.6	15.0	30.4	.0	21.8	9.6	.0	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	7.1	.0	8.7	.0	2.0	5.1	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	1.8	.0	2.4	.0	.0	.7	.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	1.8	.0	1.0	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	71.7	5.0	99.3	.0	1.0	5.9	.0	.0	.0	25.0
	MARIGUANA	6.6	65.0	.3	28.6	.0	31.6	50.0	.0	100.0	.0
	INHALABLES	4.0	20.0	.3	57.1	.0	19.1	50.0	.0	.0	25.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	3.8	5.0	.0	.0	.0	25.0	.0	100.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	10.9	.0	.1	.0	99.0	.7	.0	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.5	.0	.0	14.3	.0	2.2	.0	.0	.0	25.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	2.4	5.0	.0	.0	.0	15.4	.0	.0	.0	25.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio,
2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=935	n=62	n=38	n=674	n=59	n=102
SEXO	MASCULINO	84.9	96.8	100.0	79.8	96.6	99.0
	FEMENINO	15.1	3.2	.0	20.2	3.4	1.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	.1	.0	.0	.1	.0	.0
	15-19 AÑOS	11.2	21.0	28.9	8.9	18.6	9.8
	20-24 AÑOS	15.6	24.2	44.7	12.3	40.7	6.9
	25-29 AÑOS	10.9	12.9	21.1	10.1	16.9	7.8
	30-34 AÑOS	13.6	19.4	2.6	14.1	18.6	7.8
	35 AÑOS O MAS	48.6	22.6	2.6	54.5	5.1	67.6
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	9.0	9.7	13.2	8.9	.0	12.7
	PRIMARIA	49.2	24.2	34.2	53.9	20.3	55.9
	TECNICO POST-PRIMARIA	.9	3.2	.0	.7	1.7	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	24.9	45.2	47.4	20.8	47.5	18.6
	TECNICO POST-SECUNDARIA	1.1	4.8	2.6	.4	5.1	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	11.6	12.9	2.6	10.7	25.4	11.8
	LICENCIATURA	3.2	.0	.0	4.3	.0	1.0
	POSGRADO	.2	.0	.0	.3	.0	.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	27.3	51.6	47.4	22.3	49.2	25.5
	CASADO	63.7	29.0	28.9	71.7	25.4	67.6
	DIVORCIADO	1.1	3.2	2.6	.4	6.8	.0
	SEPARADO	3.6	11.3	15.8	2.2	10.2	.0
	VIUDO	1.4	.0	.0	1.6	.0	2.0
	UNION LIBRE	2.9	4.8	5.3	1.8	8.5	4.9
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	.7	3.2	2.6	.6	.0	.0
	10-14 AÑOS	15.4	54.8	68.4	8.2	23.7	14.7
	15-19 AÑOS	47.8	35.5	28.9	48.1	45.8	61.8
	20-24 AÑOS	25.7	4.8	.0	30.4	18.6	20.6
	25-29 AÑOS	7.2	1.6	.0	8.6	10.2	2.0
	30-34 AÑOS	1.8	.0	.0	2.4	1.7	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	.0	1.8	.0	1.0
	DIARIO	27.1	82.3	73.7	9.5	81.4	60.8
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.6	4.8	7.9	8.8	8.5	9.8
	1 VEZ POR SEMANA	19.3	9.7	2.6	23.0	5.1	14.7
	1 A 3 VECES POR MES	19.3	1.6	5.3	24.0	1.7	13.7
	1 A 11 VECES AL AÑO	25.9	1.6	10.5	34.7	3.4	1.0

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007 YUCATAN



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	
		n=142	n=28	n=6	n=34	
SEXO	MASCULINO	95.8	96.4	100.0	100.0	
	FEMENINO	4.2	3.6	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	15.6	7.1	.0	17.6	
	15 - 18 AÑOS	84.4	92.9	100.0	82.4	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	54.9	57.1	66.7	67.6	
	SECUNDARIA	38.0	35.7	33.3	32.4	
	PREPA	5.6	7.1	.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	1.4	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	14.8	3.6	.0	5.9	
	EMPLEADO	34.5	28.6	50.0	26.5	
	SUBEMPLEADO	41.5	57.1	50.0	50.0	
USA TATUAJES	HOGAR	.7	.0	.0	.0	
	NINGUNA	8.5	10.7	.0	17.6	
	SI	43.0	71.4	100.0	64.7	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	57.0	28.6	.0	35.3	
	SI	17.6	39.3	66.7	41.2	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	82.4	60.7	33.3	58.8	
	SI	35.2	50.0	83.3	61.8	
TIPO DE INFRACCION	NO	64.8	50.0	16.7	38.2	
	ROBO	89.4	89.3	100.0	94.1	
	VIOLACION	4.2	.0	.0	2.9	
	HOMICIDIO	2.8	3.6	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	14.1	17.9	16.7	11.8	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	15.5	10.7	.0	5.9	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	1.4	.0	.0	.0	
	OTROS	9.2	7.1	16.7	8.8	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	57.0	64.3	50.0	47.1
		HOGAR	26.1	28.6	.0	35.3
		TRABAJO	10.6	7.1	33.3	14.7
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		4.2	.0	.0	.0	
OTRO		2.1	.0	16.7	2.9	

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL	TRANQUILIZANTES	COCAINA	MARIJUANA	
		n=145	n=93	n=55	n=3	n=2	
SEXO	MASCULINO	91.7	92.5	89.1	100.0	100.0	
	FEMENINO	8.3	7.5	10.9	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.7	.0	1.8	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	1.4	.0	3.6	.0	.0	
	15 - 19 AÑOS	10.3	9.7	10.9	.0	50.0	
	20 - 24 AÑOS	16.6	15.1	16.4	33.3	.0	
	25 - 29 AÑOS	12.4	12.9	12.7	33.3	.0	
	30 - 34 AÑOS	12.4	10.8	14.5	.0	.0	
	35 - 39 AÑOS	5.5	6.5	5.5	.0	.0	
	40 AÑOS O MÁS	40.7	45.2	34.5	33.3	50.0	
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	6.2	4.3	9.1	.0	.0	
	ACCIDENTE DE TRANSITO	.7	1.1	.0	.0	.0	
	CAIDA	2.1	1.1	3.6	.0	.0	
	ELECTROCUTADO	.0	.0	.0	.0	.0	
	QUEMADO	2.8	.0	7.3	.0	.0	
	GOLPES	.0	.0	.0	.0	.0	
	ASFIXIA	21.4	31.2	1.8	33.3	50.0	
	APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	
	ARMA DE FUEGO	.7	1.1	.0	.0	.0	
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	4.1	5.4	1.8	33.3	.0	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	
	INTOXICADO	.7	.0	1.8	.0	.0	
	ENVENENADO	2.1	.0	5.5	.0	.0	
	OTRAS	59.3	55.9	69.1	33.3	50.0	
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	12.4	9.7	16.4	.0	.0
		CASA	33.8	48.4	9.1	33.3	100.0
CALLE		9.0	11.8	3.6	.0	.0	
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0	.0	.0	.0	
AREAS ESCOLARES		.0	.0	.0	.0	.0	
AREAS RECREATIVAS		.7	1.1	.0	.0	.0	
TRABAJO		.7	.0	1.8	.0	.0	
ARES DE SERVICIO		43.4	29.0	69.1	66.7	.0	
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0		

N=602 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
YUCATAN

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA *	TABACO	TRANQUILIZANTES	HEROINA	CRISTAL**	OTRAS DROGAS MEDICAS ***	OTRAS DROGAS ILEGALES ****
	n=4	n=1	n=0	n=0	n=1	n=0	n=0	n=0	n=0	n=1
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	66.7	.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	33.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=137 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
2007
YUCATAN**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=18	n=39	n=14	n=0	n=0	n=0	n=2	n=2	n=1	n=0	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	.0	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	5.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	.0	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION . NEUROLOGICA	.0	5.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	5.6	2.6	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	.0	2.6	7.1	.0	.0	.0	50.0	.0	100.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS	.0	7.7	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	5.6	2.6	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	5.6	2.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	5.6	7.7	7.1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	38.9	38.5	64.3	.0	.0	.0	.0	50.0	.0	.0	.0
NINGUNA	11.1	7.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

N=137

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
YUCATAN**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=374	n=228	n=100	n=24	n=7	n=5	n=1	n=0	n=0	n=6	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	82,0	84,6	78,0	84,0	71,4	100,0	100,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	FEMENINO	18,0	15,4	22,0	16,0	28,6	,0	,0	,0	,0	66,7	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,4	7,5	1,0	4,0	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	25,3	25,4	26,0	32,0	14,3	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	21,0	23,7	17,0	16,0	14,3	20,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	25-29	19,9	19,7	18,0	12,0	42,9	40,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	30-34	12,4	9,6	19,0	16,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	16,1	14,0	19,0	20,0	14,3	,0	100,0	,0	,0	33,3	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	54,3	56,6	51,0	56,0	42,9	40,0	,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	CASADO	22,6	19,7	27,0	20,0	28,6	20,0	100,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	U. LIBRE	9,4	8,8	12,0	4,0	14,3	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,6	5,3	3,0	4,0	,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	3,0	4,4	,0	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,3	,0	1,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	5,9	5,3	6,0	12,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,5	,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,0	1,0	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,6	13,6	10,3	12,0	,0	25,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	SECUNDARIA	45,6	49,6	35,1	52,0	83,3	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,8	3,1	6,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	16,7	,0	,0
	BACHILLERATO	26,8	23,7	36,1	24,0	16,7	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
	LICENCIATURA	9,6	9,2	9,3	12,0	,0	,0	,0	,0	,0	33,3	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,5	,0	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	15,0	15,8	13,6	23,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,6	4,3	1,1	,0	,0	20,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,4	27,8	36,4	14,3	,0	20,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,3	13,9	15,9	14,3	40,0	20,0	100,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	11,7	10,5	10,2	28,6	,0	20,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	DESOCUPADO	21,6	25,4	12,5	19,0	60,0	20,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	3,6	1,9	8,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	20,0	,0	,0
	PENSIONADO	,9	,5	2,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	1,5	,5	2,3	8,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	12,1	11,1	18,4	4,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
MEDIO BAJO	64,4	66,2	57,5	73,9	80,0	20,0	100,0	,0	,0	100,0	,0	,0	
BAJO	22,0	22,2	21,8	13,0	20,0	80,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	
POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
YUCATAN

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=374	n=14	n=97	n=48	n=178	n=17	n=4	n=0	n=0	n=14	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	82,0	57,1	75,3	83,3	91,0	88,2	75,0	,0	,0	28,6	,0	,0
	FEMENINO	18,0	42,9	24,7	16,7	9,0	11,8	25,0	,0	,0	71,4	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	5,6	,0	4,1	10,4	2,8	35,3	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	15-19	25,0	21,4	20,6	47,9	20,8	47,1	25,0	,0	,0	7,1	,0	,0
	20-24	21,0	14,3	20,6	16,7	24,7	5,9	,0	,0	,0	21,4	,0	,0
	25-29	19,9	14,3	19,6	6,3	25,3	5,9	25,0	,0	,0	21,4	,0	,0
	30-34	12,4	,0	15,5	10,4	14,0	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	16,1	50,0	19,6	8,3	12,4	,0	25,0	,0	,0	50,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	54,3	50,0	52,6	79,2	46,1	82,4	75,0	,0	,0	50,0	,0	,0
	CASADO	22,6	28,6	23,7	6,3	25,8	5,9	25,0	,0	,0	42,9	,0	,0
	U. LIBRE	9,7	7,1	9,3	6,3	12,4	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,6	,0	2,1	,0	7,9	,0	,0	,0	,0	7,1	,0	,0
	DIVORCIADO	3,0	,0	5,2	2,1	2,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,3	7,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	5,6	7,1	7,2	6,3	5,1	5,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,5	,0	,0	,0	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,0	2,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	12,6	7,7	11,6	10,4	12,4	37,5	,0	,0	,0	7,1	,0	,0
	SECUNDARIA	45,9	7,7	33,7	58,3	53,7	50,0	66,7	,0	,0	14,3	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,8	7,7	6,3	,0	2,8	,0	,0	,0	,0	14,3	,0	,0
	BACHILLERATO	26,5	53,8	32,6	22,9	22,6	12,5	33,3	,0	,0	35,7	,0	,0
	LICENCIATURA	9,6	23,1	12,6	8,3	6,8	,0	,0	,0	,0	28,6	,0	,0
	POSGRADO	,5	,0	1,1	,0	,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	ESTUDIANTE	15,0	33,3	17,2	35,6	5,0	43,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,6	,0	4,6	8,9	,6	6,3	,0	,0	,0	15,4	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	28,4	25,0	35,6	11,1	33,3	6,3	,0	,0	,0	15,4	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	15,6	,0	10,3	8,9	19,5	18,8	50,0	,0	,0	30,8	,0	,0
	DESEMPLEADO	11,7	,0	6,9	22,2	13,2	6,3	,0	,0	,0	7,7	,0	,0
	DESOCUPADO	21,3	,0	19,5	11,1	28,3	18,8	50,0	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	3,6	25,0	4,6	2,2	,0	,0	,0	,0	,0	30,8	,0	,0
	PENSIONADO	,9	16,7	1,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	1,6	,0	2,4	4,7	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	11,8	33,3	19,5	11,6	5,9	5,9	,0	,0	,0	23,1	,0	,0
	MEDIO BAJO	64,5	58,3	58,5	65,1	69,1	47,1	100,0	,0	,0	69,2	,0	,0
	BAJO	22,1	8,3	19,5	18,6	24,3	47,1	,0	,0	,0	7,7	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	TABACO	61,1	42,9	47,4	61,7	67,8	82,4	75,0	,0	,0	57,1	,0	,0
	ALCOHOL	27,0	35,7	47,4	21,3	20,9	5,9	,0	,0	,0	7,1	,0	,0
	MARIGUANA	6,8	21,4	4,1	17,0	5,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	COCAÍNA	1,9	,0	,0	,0	4,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	1,4	,0	1,0	,0	1,1	11,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,3	,0	,0	,0	,0	,0	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	1,6	,0	,0	,0	,6	,0	,0	,0	,0	35,7	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



ZACATECAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE TRATAMIENTO



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil sociodemográfico de la población que acude a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=744	n=53	n=410	n=29	n=2	n=4	n=164	n=16	n=61	n=1	n=3	n=1
SEXO	MASCULINO	96.1	100.0	96.3	89.7	100.0	100.0	95.1	100.0	95.1	100.0	100.0	100.0
	FEMENINO	3.9	.0	3.7	10.3	.0	.0	4.9	.0	4.9	.0	.0	.0
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.1	3.8	.5	6.9	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0
	15-19 AÑOS	10.6	28.3	4.1	31.0	.0	.0	15.9	.0	18.0	.0	.0	100.0
	20-24 AÑOS	15.3	17.0	9.0	27.6	50.0	50.0	22.6	.0	27.9	100.0	66.7	.0
	25-29 AÑOS	16.5	15.1	12.7	13.8	50.0	25.0	27.4	6.3	18.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	14.2	11.3	14.9	10.3	.0	.0	13.4	18.8	18.0	.0	.0	.0
	35 AÑOS O MAS	42.2	24.5	58.8	10.3	.0	25.0	19.5	75.0	18.0	.0	33.3	.0
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	7.6	5.7	10.1	10.3	.0	.0	4.4	6.7	1.6	.0	.0	.0
	PRIMARIA	46.7	58.5	48.8	62.1	.0	25.0	39.2	60.0	34.4	100.0	33.3	.0
	TECNICO POST-PRIMARIA	2.3	3.8	1.7	3.4	.0	.0	1.9	.0	4.9	.0	33.3	.0
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	26.1	22.6	22.4	20.7	100.0	50.0	32.3	26.7	37.7	.0	.0	.0
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	.0	.2	.0	.0	.0	1.9	.0	1.6	.0	.0	.0
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	13.0	9.4	12.3	3.4	.0	.0	16.5	6.7	16.4	.0	33.3	100.0
	LICENCIATURA	3.5	.0	4.2	.0	.0	25.0	3.8	.0	3.3	.0	.0	.0
POSGRADO	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ESTADO CIVIL	CASADO	34.4	17.3	44.6	3.4	50.0	.0	28.2	18.8	16.7	100.0	33.3	.0
	SOLTERO	45.1	69.2	35.3	75.9	50.0	75.0	46.6	50.0	68.3	.0	66.7	.0
	DIVORCIADO	5.4	5.8	5.6	3.4	.0	.0	6.1	12.5	1.7	.0	.0	.0
	SEPARADO	6.4	.0	6.1	6.9	.0	25.0	8.0	6.3	8.3	.0	.0	.0
	VIUDO	.7	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SITUACION LABORAL	UNION LIBRE	8.0	7.7	7.1	10.3	.0	.0	11.0	12.5	5.0	.0	.0	.0
	ESTUDIANTE	2.4	6.0	1.0	7.4	.0	25.0	1.3	.0	7.1	.0	33.3	.0
	DESEMPLEADO	21.3	24.0	17.5	25.9	.0	25.0	29.5	33.3	17.9	.0	33.3	.0
	DESOCUPADO	13.4	10.0	13.9	25.9	.0	.0	11.5	.0	14.3	.0	33.3	100.0
	TRABAJO FIJO	31.8	16.0	35.4	14.8	50.0	.0	30.8	40.0	32.1	100.0	.0	.0
	TRABAJO OCASIONAL	29.3	44.0	29.6	22.2	50.0	50.0	26.3	26.7	26.8	.0	.0	.0
	AMA DE CASA	1.0	.0	1.3	3.7	.0	.0	.6	.0	.0	.0	.0	.0
ACUDIO A ESTE CENTRO EN FORMA	JUBILADO	.8	.0	1.3	.0	.0	.0	.0	.0	1.8	.0	.0	.0
	VOLUNTARIO	37.0	30.2	33.9	37.9	.0	50.0	42.3	31.3	47.5	100.0	100.0	.0
	LO LLEVARON AMIGOS O FAMILIARES	55.2	47.2	58.8	58.6	.0	50.0	54.0	50.0	47.5	.0	.0	.0
	POR INDICACION LEGAL	3.4	15.1	2.4	.0	100.0	.0	1.8	12.5	.0	.0	.0	.0
	POR INDICACION MEDICA	.1	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	4.3	7.5	4.6	3.4	.0	.0	1.8	6.3	4.9	.0	.0	100.0	

*Cocaína, Basuco, Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Patrón de consumo de la población que acude a Centros de Tratamiento No Gubernamentales según Droga de Impacto, 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIGUANA	ALCOHOL	INHALABLES	TABACO	TRANQUILIZANTES	COCAINA*	HEROINA	CRISTAL	ROHYPNOL	D.MEDICAS **	D.ILEGALES ***
		n=744	n=53	n=410	n=29	n=2	n=4	n=164	n=16	n=61	n=1	n=3	n=1
FRECUENCIA ACTUAL	DIARIO	69.6	92.5	63.9	86.2	100.0	100.0	70.7	81.3	68.9	100.0	100.0	100.0
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.7	3.8	8.8	10.3	.0	.0	9.8	6.3	11.5	.0	.0	.0
	1 VEZ POR SEMANA	14.5	1.9	19.3	3.4	.0	.0	11.6	12.5	9.8	.0	.0	.0
	1 A 3 VECES POR MES	5.4	.0	6.1	.0	.0	.0	6.1	.0	8.2	.0	.0	.0
	1 A 11 VECES AL AÑO	1.7	1.9	2.0	.0	.0	.0	1.8	.0	1.6	.0	.0	.0
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	7.7	7.5	5.9	20.7	.0	25.0	10.4	12.5	1.6	.0	66.7	.0
	10-14 AÑOS	42.9	60.4	33.7	62.1	.0	50.0	48.8	68.8	59.0	100.0	33.3	.0
	15-19 AÑOS	37.0	24.5	43.7	17.2	100.0	25.0	31.1	18.8	32.8	.0	.0	100.0
	20-24 AÑOS	8.3	7.5	11.5	.0	.0	.0	4.9	.0	4.9	.0	.0	.0
	25-29 AÑOS	2.2	.0	2.7	.0	.0	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.0
	30-34 AÑOS	.7	.0	.7	.0	.0	.0	.6	.0	1.6	.0	.0	.0
	35 AÑOS Y MAS	1.3	.0	2.0	.0	.0	.0	1.2	.0	.0	.0	.0	.0
DROGA DE INICIO	ALCOHOL	59.7	26.4	75.9	27.6	50.0	25.0	41.5	50.0	49.2	100.0	33.3	100.0
	MARIGUANA	12.4	52.8	4.6	6.9	.0	.0	14.0	37.5	19.7	.0	66.7	.0
	INHALABLES	3.1	3.8	.7	34.5	.0	.0	4.9	.0	.0	.0	.0	.0
	ALUCINOGENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	HEROINA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OPIO/MORFINA Y DERIV	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	COCAINA	3.8	.0	.5	.0	.0	.0	12.8	.0	8.2	.0	.0	.0
	TRANQUILIZANTES	.7	.0	.0	3.4	.0	25.0	.6	.0	3.3	.0	.0	.0
	BARBITURICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANFETAMINAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	ANTICOLINERGICOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	TABACO	19.2	17.0	18.0	27.6	50.0	50.0	23.8	6.3	14.8	.0	.0	.0
	ANTIDEPRESIVOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	BASUCO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	CRISTAL	.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	4.9	.0	.0	.0
	ROHYPNOL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CRACK	.8	.0	.2	.0	.0	.0	2.4	6.3	.0	.0	.0	.0	
REFRACTIL OFTENOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

*Cocaína, Basuco , Crack

** Barbitúricos, Anfetaminas, Anticolinérgicos, Antidepresivos y Morfina.

*** Alucinógenos, Basuco y Otros psicotrópicos.

Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Características sociodemográficas de pacientes que acuden a Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) según Droga de Inicio, 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	* COCAINA	TABACO
		n=736	n=92	n=23	n=444	n=34	n=143
SEXO	MASCULINO	96.1	96.7	87.0	95.9	94.1	97.9
	FEMENINO	3.9	3.3	13.0	4.1	5.9	2.1
EDAD	14 AÑOS O MENOS	1.1	3.3	.0	1.1	.0	.0
	15-19 AÑOS	10.7	22.8	30.4	6.5	14.7	11.9
	20-24 AÑOS	14.8	21.7	30.4	8.8	20.6	25.2
	25-29 AÑOS	16.4	30.4	8.7	12.8	23.5	18.2
	30-34 AÑOS	14.4	5.4	13.0	15.8	20.6	14.7
	35 AÑOS O MAS	42.5	16.3	17.4	55.0	20.6	30.1
ESCOLARIDAD	NO FUE A LA ESCUELA	7.7	5.5	4.5	7.4	11.8	9.8
	PRIMARIA	46.8	50.5	59.1	48.7	20.6	42.7
	TECNICO POST-PRIMARIA	2.3	4.4	4.5	2.3	2.9	.7
	SECUNDARIA O PREVOCACIONAL	25.9	19.8	31.8	24.1	38.2	31.5
	TECNICO POST-SECUNDARIA	.7	.0	.0	.7	2.9	.7
	PREPARATORIA O VOCACIONAL	12.8	18.7	.0	12.2	17.6	11.9
	LICENCIATURA	3.6	1.1	.0	4.4	5.9	2.8
	POSGRADO	.1	.0	.0	.2	.0	.0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	44.9	69.6	65.2	39.0	38.2	45.8
	CASADO	34.8	16.3	8.7	42.1	41.2	26.8
	DIVORCIADO	5.5	4.3	8.7	4.3	8.8	8.5
	SEPARADO	6.2	.0	8.7	6.8	2.9	8.5
	VIUDO	.7	.0	.0	1.1	.0	.0
	UNION LIBRE	7.9	9.8	8.7	6.6	8.8	10.6
EDAD DE INICIO	9 AÑOS O MENOS	7.7	4.3	17.4	5.2	.0	18.2
	10-14 AÑOS	42.7	64.1	65.2	35.1	20.6	53.8
	15-19 AÑOS	37.1	25.0	17.4	44.8	44.1	22.4
	20-24 AÑOS	8.3	5.4	.0	10.4	8.8	4.9
	25-29 AÑOS	2.2	1.1	.0	2.0	14.7	.7
	30-34 AÑOS	.7	.0	.0	.7	5.9	.0
FRECUENCIA DE INICIO	35 AÑOS Y MAS	1.4	.0	.0	1.8	5.9	.0
	DIARIO	50.5	67.4	65.2	35.1	50.0	85.3
	2 - 3 VECES POR SEMANA	8.7	7.6	17.4	9.2	14.7	4.9
	1 VEZ POR SEMANA	25.4	16.3	4.3	34.7	20.6	7.0
	1 A 3 VECES POR MES	11.0	1.1	8.7	16.2	11.8	1.4
	1 A 11 VECES AL AÑO	4.3	7.6	4.3	4.7	2.9	1.4

* Cocaína, Basuco y Crack.


Fuente: SISVEA - Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Comparación entre la droga de inicio y la droga de impacto reportada por los pacientes que acuden a los Centros de Tratamiento No Gubernamentales (ONG's) 1994 - 2007
ZACATECAS



* Cocaína, Basuco, Crack

Fuente: SISVEA-Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CONSEJO TUTELAR DE MENORES



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Características sociales y tipo de infracción cometida por los menores infractores usuarios de drogas 2007
ZACATECAS

CARACTERISTICAS		GLOBAL	MARIJUANA	INHALABLES	ALCOHOL	COCAINA	TABACO	CRISTAL	
		n=27	n=4	n=2	n=9	n=5	n=4	n=2	
SEXO	MASCULINO	96.3	100.0	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0	
	FEMENINO	3.7	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	
EDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	10 - 14 AÑOS	14.8	25.0	50.0	22.2	.0	.0	.0	
	15 - 18 AÑOS	85.2	75.0	50.0	77.8	100.0	100.0	100.0	
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	63.0	100.0	100.0	55.6	80.0	50.0	50.0	
	SECUNDARIA	22.2	.0	.0	22.2	20.0	.0	50.0	
	PREPA	14.8	.0	.0	22.2	.0	50.0	.0	
	LICENCIATURA O POSGRADO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OCUPACION	NO ESTUDIO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	ESTUDIANTE	18.5	.0	.0	22.2	.0	50.0	.0	
	EMPLEADO	51.9	50.0	50.0	44.4	60.0	25.0	50.0	
	SUBEMPLEADO	7.4	.0	.0	11.1	20.0	25.0	.0	
USA TATUAJES	HOGAR	3.7	.0	.0	11.1	.0	.0	.0	
	NINGUNA	18.5	50.0	50.0	11.1	20.0	.0	50.0	
	SI	33.3	50.0	50.0	22.2	60.0	25.0	50.0	
HA PERTENECIDO A UNA BANDA	NO	66.7	50.0	50.0	77.8	40.0	75.0	50.0	
	SI	33.3	50.0	50.0	22.2	60.0	25.0	50.0	
INFRACCION BAJO INTOXICACION	NO	66.7	50.0	50.0	77.8	40.0	75.0	50.0	
	SI	22.2	.0	.0	55.6	60.0	50.0	50.0	
TIPO DE INFRACCION	NO	77.8	100.0	100.0	44.4	40.0	50.0	50.0	
	ROBO	59.3	100.0	100.0	33.3	60.0	25.0	100.0	
	VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	HOMICIDIO	11.1	.0	.0	11.1	20.0	.0	.0	
	LESIONES A TERCEROS	18.5	.0	.0	22.2	20.0	25.0	.0	
	DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA	14.8	.0	.0	33.3	.0	50.0	.0	
	SECUESTRO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	DELITOS CONTRA LA SALUD	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	CONSUMO DE DROGAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	PORTACION DE ARMA	3.7	25.0	.0	.0	20.0	.0	50.0	
	OTROS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
	LUGAR DE LA INFRACCION	VIA PUBLICA	77.8	50.0	50.0	77.8	100.0	100.0	100.0
		HOGAR	18.5	50.0	50.0	22.2	.0	.0	.0
TRABAJO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
ESCUELA		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
AEREOPUERTO INTERNACIONAL (ADUANA)		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
LUGAR DE RECREO		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
OTRO	3.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0		

Fuente: SISVEA, Consejo Tutelar de Menores, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



FORENSE



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Tipo de muerte bajo intoxicación según droga 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL (BAJO EFECTO)	ALCOHOL
		n=2	n=2
SEXO	MASCULINO	100.0	100.0
	FEMENINO	.0	.0
EEDAD	5 - 9 AÑOS	.0	.0
	10 - 14 AÑOS	.0	.0
	15 - 19 AÑOS	.0	.0
	20 - 24 AÑOS	50.0	50.0
	25 - 29 AÑOS	.0	.0
	30 - 34 AÑOS	.0	.0
	35 - 39 AÑOS	50.0	50.0
	40 AÑOS O MÁS	.0	.0
CAUSA DE MUERTE	ATROPELLADO	.0	.0
	ACCIDENTE DE TRANSITO	.0	.0
	CAIDA	.0	.0
	ELECTROCUTADO	.0	.0
	QUEMADO	.0	.0
	GOLPES	.0	.0
	ASFIXIA	50.0	50.0
	APLASTAMIENTO	.0	.0
	ARMA DE FUEGO	.0	.0
	OBJETO PUNZO-CORTANTE	.0	.0
	VIOLACION	.0	.0
	INTOXICADO	.0	.0
	ENVENENADO	.0	.0
	OTRAS	50.0	50.0
	LUGAR DONDE OCURRIO LA CAUSA DE MUERTE	ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	50.0
CASA		50.0	50.0
CALLE		.0	.0
BAÑOS PUBLICOS		.0	.0
AREAS ESCOLARES		.0	.0
AREAS RECREATIVAS		.0	.0
TRABAJO		.0	.0
ARES DE SERVICIO		.0	.0
OTROS		.0	.0

N=26 "MUERTES REGISTRADAS"

* Opio, morfina y heroína

Fuente: SISVEA, Servicios Médico Forense, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



SERVICIO DE URGENCIAS



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Proporción de pacientes atendidos debido a lesiones por causa externa bajo influjo de drogas en Servicios de Urgencias, según tipo de droga
2007
ZACATECAS

LESIONES POR CAUSA EXTERNA (%)	ALCOHOL n=11	MARIGUANA n=1	INHALABLES n=2	COCAINA * n=3	TABACO n=1	TRANQUILIZANTES n=1	HEROINA n=0	CRISTAL ** n=0	OTRAS DROGAS MEDICAS *** n=0	OTRAS DROGAS ILEGALES **** n=0
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ATROPELLAMIENTO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CAIDA	28.6	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENVENENAMIENTO O INTOXICACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CONTUSIONES	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA DE FUEGO	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HERIDA POR ARMA BLANCA	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
VIOLACION	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
QUEMADURAS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ASFIXIA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
APLASTAMIENTO	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ELECTROCUTADOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTROS	14.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

*Cocaína, Basuco, Crack

**Cristal, Anfetaminas

*** Barbitúricos, Anticolinérgicos, Antidepresivas, Morfina

**** Alucinógenos, Otros Psicotrópicos

N=516 SISVEA, Servicio Médico de Urgencias, 2007

Nota:La suma total por tipo de droga es mayor al número de pacientes debido al multiuso de drogas

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
 EPIDEMIOLOGIA

**Proporción de pacientes que solicitaron atención en los Servicios de Urgencias por Patología, según drogas consumidas en los últimos 30 días
 2007
 ZACATECAS**

PATOLOGIA (%)	TABACO	ALCOHOL	ANALGESICOS	TRANQUILIZANTES	ANTIDEPRESIVOS	ANFETAMINAS	MARIGUANA	INHALABLES	COCAINA	HEROINA	ALUCINOGENOS
	n=140	n=150	n=44	n=23	n=7	n=4	n=11	n=4	n=4	n=1	n=0
BRONQUITIS/ENFISEMA/ASMA	2.9	4.7	11.4	13.0	28.6	.0	.0	.0	.0	.0	.0
CA DE TRAQUEA/BRONQUIOS	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. ISQUEMICA DEL CORAZON	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
HIPERTENSION	8.6	9.3	13.6	17.4	14.3	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
ENF. CEREBRO-VASCULAR	.7	.0	2.3	4.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRA AFECCION NEUROLOGICA	.7	.7	2.3	.0	.0	25.0	9.1	.0	.0	.0	.0
CIRROSIS/GASTRITIS	4.3	4.7	4.5	8.7	14.3	.0	9.1	.0	.0	.0	.0
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO	1.4	2.0	.0	4.3	.0	.0	18.2	50.0	25.0	.0	.0
URGENCIAS QUIRURGICAS.	2.9	2.0	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
PSICOSIS ALCOHOLICA	5.7	6.0	.0	.0	.0	.0	18.2	50.0	25.0	100.0	.0
AFECCION GINECO-OBSTETRICA	2.1	2.0	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
AFECCION OSTEO-MUSCULAR	9.3	5.3	4.5	.0	.0	25.0	9.1	.0	.0	.0	.0
AFECCION DERMATOLOGICA	3.6	3.3	2.3	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
DIABETES MELLITUS	5.0	3.3	6.8	13.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
SIDA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
OTRAS	28.6	27.3	25.0	21.7	42.9	.0	27.3	.0	25.0	.0	.0
NINGUNA	24.3	29.3	18.2	17.4	.0	25.0	9.1	.0	25.0	.0	.0

N=516

Nota:El total por tipo de droga y/o patología no suman el 100% ya que cada paciente pudo tener respuestas multiples

Fuente: SISVEA, Servicios de Urgencias, 2007



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones



CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Inicio, 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=233	n=146	n=69	n=8	n=1	n=7	n=0	n=0	n=1	n=1	n=0	n=0
SEXO	MASCULINO	70,8	67,8	72,5	100,0	100,0	85,7	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	FEMENINO	29,2	32,2	27,5	,0	,0	14,3	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	11,8	9,8	17,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	15-19	18,3	14,7	26,5	25,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	18,8	19,6	14,7	25,0	100,0	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	18,8	18,9	13,2	37,5	,0	42,9	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	30-34	9,2	9,1	10,3	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	35 Y MAS	23,1	28,0	17,6	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	SOLTERO	40,3	38,4	49,3	37,5	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	CASADO	27,0	27,4	23,2	50,0	,0	28,6	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	U. LIBRE	14,6	15,1	10,1	12,5	100,0	42,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,3	2,7	7,2	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	5,2	6,8	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	VIUDO	,9	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	7,7	8,2	7,2	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,9	,0	1,4	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,4	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,3	23,1	17,4	28,6	,0	42,9	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	SECUNDARIA	43,7	44,8	42,0	28,6	100,0	57,1	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TECNICO O COMERCIAL	3,1	3,5	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	20,1	18,9	24,6	28,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	9,2	9,1	11,6	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
OCUPACION	POSGRADO	,4	,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	16,7	11,4	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	2,9	3,0	3,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	LABORAL ESTABLE	39,2	37,1	40,0	57,1	100,0	42,9	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	LABORAL INESTABLE	12,4	12,9	5,0	42,9	,0	42,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,2	8,3	5,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	DESOCUPADO	15,8	19,7	10,0	,0	,0	14,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	HOGAR	4,3	6,1	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,4	1,5	1,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALTO	2,5	3,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	26,6	25,2	31,7	12,5	,0	16,7	,0	,0	100,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	55,7	57,5	53,3	75,0	,0	33,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BAJO	14,3	12,6	15,0	12,5	,0	50,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	POBREZA EXTREMA	1,0	,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.



SALUD

CENAVECE
EPIDEMIOLOGIA

**Perfil Sociodemográfico de la Población que acudió a Centros de Integración Juvenil según Droga de Impacto, 2007
ZACATECAS**

CARACTERISTICAS		GLOBAL	TABACO	ALCOHOL	MARIGUANA	COCAÍNA	INHALABLES	ESTIMULANTES	DE DISEÑO	ALUCINOGENOS	DEPRESORES	OPIACEOS	OTRAS
		N=233	n=35	n=52	n=27	n=76	n=10	n=12	n=2	n=0	n=2	n=1	n=0
SEXO	MASCULINO	70,5	31,4	71,2	96,3	81,6	70,0	66,7	50,0	,0	,0	100,0	,0
	FEMENINO	29,5	68,6	28,8	3,7	18,4	30,0	33,3	50,0	,0	100,0	,0	,0
EDAD ACTUAL	9 Ó MENOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	10-14	10,8	9,1	11,8	18,5	2,6	50,0	,0	,0	,0	100,0	,0	,0
	15-19	18,8	6,1	23,5	33,3	18,4	20,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	20-24	19,7	12,1	9,8	14,8	27,6	30,0	36,4	50,0	,0	,0	,0	,0
	25-29	18,8	12,1	9,8	18,5	28,9	,0	27,3	,0	,0	,0	100,0	,0
	30-34	9,4	9,1	15,7	,0	10,5	,0	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
ESTADO CIVIL	35 Y MAS	22,5	51,5	29,4	14,8	11,8	,0	27,3	,0	,0	,0	,0	,0
	SOLTERO	39,2	34,3	46,2	63,0	28,9	60,0	8,3	50,0	,0	100,0	,0	,0
	CASADO	25,8	31,4	21,2	18,5	32,9	,0	25,0	,0	,0	,0	100,0	,0
	U. LIBRE	15,7	14,3	11,5	11,1	19,7	10,0	25,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	SEPARADO	4,6	2,9	5,8	,0	3,9	10,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0
	DIVORCIADO	5,5	8,6	5,8	,0	5,3	10,0	8,3	,0	,0	,0	,0	,0
ESCOLARIDAD	VIUDO	,9	5,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	NO ESPECIFICA	8,3	2,9	9,6	7,4	9,2	10,0	16,7	,0	,0	,0	,0	,0
	SIN ESTUDIOS NO SABE LEER NI ESCRIBIR	,9	,0	1,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0
	SIN ESTUDIOS SABE LEER Y ESCRIBIR	,5	,0	,0	,0	,0	,0	8,3	,0	,0	,0	,0	,0
	PRIMARIA	22,1	32,4	25,0	11,1	17,6	44,4	25,0	,0	,0	,0	,0	,0
	SECUNDARIA	43,7	23,5	40,4	63,0	51,4	33,3	33,3	,0	,0	100,0	,0	,0
OCUPACION	TECNICO O COMERCIAL	2,3	8,8	1,9	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BACHILLERATO	20,7	14,7	23,1	14,8	21,6	22,2	33,3	50,0	,0	,0	,0	,0
	LICENCIATURA	9,4	17,6	7,7	11,1	8,1	,0	,0	50,0	,0	,0	,0	,0
	POSGRADO	,5	2,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTUDIANTE	15,5	13,3	25,0	34,6	2,8	14,3	,0	50,0	,0	100,0	,0	,0
	ESTUDIA Y TRABAJA	3,1	,0	2,3	7,7	4,2	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	LABORAL ESTABLE	38,7	26,7	29,5	34,6	53,5	,0	45,5	50,0	,0	,0	100,0	,0
	LABORAL INESTABLE	13,4	6,7	13,6	7,7	15,5	57,1	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
	DESEMPLEADO	7,7	6,7	6,8	11,5	7,0	14,3	9,1	,0	,0	,0	,0	,0
	DESOCUPADO	16,0	23,3	18,2	3,8	14,1	14,3	36,4	,0	,0	,0	,0	,0
	HOGAR	4,1	20,0	2,3	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	PENSIONADO	1,5	3,3	2,3	,0	1,4	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
NIVEL SOCIOECONOMICO	ALTO	2,6	10,3	2,1	,0	1,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO ALTO	27,4	44,8	23,4	26,9	19,4	37,5	44,4	50,0	,0	,0	,0	,0
	MEDIO BAJO	55,3	37,9	57,4	69,2	59,7	12,5	55,6	50,0	,0	100,0	100,0	,0
	BAJO	13,7	6,9	14,9	3,8	19,4	37,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
DROGA DE INICIO	POBREZA EXTREMA	1,1	,0	2,1	,0	,0	12,5	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	TABACO	63,6	82,9	59,6	59,3	60,5	50,0	75,0	50,0	,0	50,0	,0	,0
	ALCOHOL	28,6	17,1	40,4	33,3	25,0	20,0	25,0	50,0	,0	50,0	,0	,0
	MARIGUANA	3,7	,0	,0	3,7	5,3	20,0	,0	,0	,0	,0	100,0	,0
	COCAÍNA	,5	,0	,0	3,7	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	INHALABLES	2,8	,0	,0	,0	7,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ESTIMULANTES	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DE DISEÑO	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	ALUCINOGENAS	,5	,0	,0	,0	1,3	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	DEPRESORES	,5	,0	,0	,0	,0	,0	10,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OPIACEOS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	OTRAS	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0

Nota: El número total es mayor a la suma por tipo de droga, debido a la falta de registro.
Fuente: SISVEA - Centros de Integración Juvenil, 2007.